

امراض،اسباب امراض اورمعالجات کی شهرهٔ آفاق تالیف" الحاوی الکبیر فی الطب" کاارد و ترجمه

كتاب الحاوي

موسوم بــه

حاوی کبیر

حصہ چہارم امراض ریہ (بھیچرے کی بیاریاں) تالسیف ابوبکر محمد بن زکر بیارازی رودوء

شائع کسسرده سینٹرل کونسل فارر پسرچ اِن بونانی میڈیس (وزارت ِصحت و خاندانی بہبود، حکومت ہند) ٹی دہلی

ناشــر

سنفرل کونسل فار ریسرچان یونانی میڈیس ۱۵-۱۲-انسٹی ٹیوشنل ایریا پکھاروڈ، جنک پوری نئی دہلی ۱۱۰۰۵۸

جمله حقوق محفوظ ہیں

تعداداشاعت : ایک بزار

الناعت : ١٩٩٨

قيت : حرساروك

على كار يوريش اعرياء وبلى ٢٠٠٠١

정바

# فهرست مضامين

5

يبيش لفظ

9

يهلا باب

ر بو، ضیق النفس، تنفس کی خرابی، تنفس میں سہولت پیدا کرنے اور پھیپھڑے سے اخلاط غلیظہ و پیپ وغیرہ کوختم کرنے والی چیزیں۔

40

دوسراباب

نقث الدم، قے الدم اور منہ سے خارج ہونے والے خون کی تمام قسمیں۔

65

تيسراباب

سینہ اور پھیپھرٹ سے پیپ تھو کنا، سل، رید کا ورم حار، رید، قصبۃ الرید اور سینہ کے تمام مقامات میں قرحول کے اندر پیپ پڑناو جمع ہو جانا، سینہ کی فضا اور اور ام کے اندر پیپ پڑناو جمع ہو جانا، سینہ کی فضا اور اور ام کے اندر پیپ کا جمع ہونا۔ سینہ، پھیپھرٹ اور آلات تنفس سے نفث الدم، پھیپھرٹ کا نکل آنااور اس کا سوء مزاج۔

چو تھا باب ذات الربیہ اور ذات الجنب کا فرق۔

يانچوال باب مانچوال باب

ذات الجنب، ذات الجنب اور ورم حمد ميں فرق اور ورم ربيہ نيز ورم حجاب ميں فرق۔

چھاباب 113

سینہ کی فضاہے پھیپراے کے اندر پیپ داخل ہونے کا سبب۔

ساتوال باب ساتوال باب

ذات الجنب كے مريض كى فصد كھولنے كامناسب وفت۔

The same of the household in the Third that the the the

# پیش لفظ

طب یونانی کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ ہندوستان میں بھی اس فن کی تاریخ کم و بیش ایک ہزار سال پر محیط ہے۔ اس دوران اس فن نے مختلف نشیب و فراز دیکھے ہیں لیکن عوام کی بے لوث خدمات کے باعث بیر رور میں مقبول و محبوب رہا ہے۔ اس فن کے حاملین نے اس کو زندہ رکھنے اور مزید تر قیال دینے کے لئے جو کو ششیں کیس ان کو بھلایا نہیں جاسکتا۔ تغلق اور لودی دور کے اطباء ضیاء محمد مسعو در شید فر گئی محلی اور بہوہ بن خواص خال ہوں یا مغلیہ زمانہ کے ملیم علی گیلانی اور اکبرارزانی وغیرہ، گذشتہ صدی کے علیم عبدالعزیز لکھنوی اور حکیم محمد اعظم خال ہوں یا معلیہ زمانہ کے خال ہوں یا موجودہ صدی کے مسے الملک علیم محمد اجمل خال اور حکیم محمد الملک علیم محمد اجمل خال اور حکیم محمد الملک علیم فی ایس بندوستان کی آزادی کے بعد کے بچاس مالہ دور میں طب یونانی کو دوسر کے طریقہ ہائے علاج کی طرح حکومت کی سر پر ستی کے باعث سالہ دور میں طب یونانی کو دوسر کے طریقہ ہائے علاج کی طرح حکومت کی سر پر ستی کے باعث ترقی کے مواقع ملے ہیں خاص طور پر تصنیف و تالیف کے میدان میں شخصی خدمات کے علاوہ لیفس اداروں نے بھی بہت کام کیا ہے۔ ان اداروں میں سر فہرت و زارت صحت و خانلانی بہود کے تحت قائم شدہ سنٹرل کونسل فارر یسرج ان ایونانی میڈ این ہے جس نے اس میدان میں نمایاں گئیں رفت کی اور اپنے لٹریری راسرج پر وگرام کے تحت قدیم اور نادر مخطوطات و کتب کی جوت قدیم اور تر سے اور تراج مے کام کیے ہیں مثلاً کتاب الکاتیات (ابن رشد)، کتاب الجامح کمفردات کی دور تیب اور تراج مے کام کے ہیں مثلاً کتاب الکاتیات (ابن رشد)، کتاب الجامح کمفردات

الادویہ والاغذیہ (ابن بیطار)، کتاب العمدہ فی الجراحة (ابن الفت مسیحی) وغیرہ ہوں تو مختلف مختیق موضوعات پر کونسل کی مطبوعات کی تعداد بہتر تک پہنچ گئے ہے گرفد یم کتابوں کی تدوین وتراجم پر مشمل کتابوں کی تعداد آئیس ہے۔ یہ کام اور آگے بڑھ رہا ہے۔ طبی کتابوں کی الشاعت میں ترقی اردو بیورو(اب قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان) وزارت فروغ انسانی وسائل، حکومت بہندنے بھی خاطر خواہ کام کیا ہے اور بعض اچھی کتابیں اس کونسل کے ذریعے منظر عام پر آئی ہیں۔ بعض ریاستوں کی اردوا کیڈ میوں کے مالی تعاون سے بھی پچھ کتابیں شائع موئی ہیں۔ جامعہ ہمدرد، نئی و بلی کے اشاعتی پروگر اموں میں خاص اہمیت شخ الرئیس بوعلی سیناکی مشہور زمانہ تصنیف القانون فی الطب کی از سر نو تدوین اور اس کے اگریزی ترجے کو حاصل ہے۔ وائرۃ المعارف العثانیہ، عثانیہ یو نیورٹی، حیدر آباد نے عربی زبان میں قدیم طبتی مخطوطات کی دائرۃ المعارف العثانیہ، عثانیہ یو نیورٹی، حیدر آباد نے عربی زبان میں قدیم طبتی مخطوطات کی حضیم کتاب الحاوی الکبیر فی الطب، ہے جوعظیم المرتب طبیب محمد ابن ابو بکر ذکریا رازی طبی منظم کتاب الحاوی الکبیر فی الطب، ہے جوعظیم المرتب طبیب محمد ابن ابو بکر ذکریا رازی طبت طبیب محمد ابن ابو بکر ذکریا رازی طبتی کیا گیا ہے۔

سنٹرل کونسل فارریسر چان یونانی میڈیسن کی زیر تگرانی اس عظیم کام کے اردوتر جے کا منصوبہ روبہ عمل ہے۔اب تک تین جلدیں چھاپی جا پچکی ہیں۔ پہلی جلد امر اض راس (سرک بیاریاں)، دوسری جلد امراض عین (آنکھ کی بیاریاں) اور تیسری جلد امر اض اذن، انف وطلق (کان، ناک اور گلے کی بیاریاں) پرمشممل ہے۔ چوتھی جلد آپ کے پیش نظر ہے جس میں امراض

ریہ (پھیچرے کے امراض) کابیان ہے۔

پھیپورے کی بیاریوں کے بارے میں اتنی تفصیلی معلومات کسی قدیم طبتی کتاب میں نہیں ملتیں۔ بید زکریارازی کے تبحر علمی، معالجانہ تجربات اور فنی حذافت کانا قابل تر دید شبوت ہے۔ اس نے جن فتی باریکیوں کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ہر معالج کے لئے نشان راہ ہے۔ اس نے نہ صرف ربو، ضیق النفس اور نفث الدم کی تفصیلات بیان کی ہیں بلکہ پھیپھرا ہے کے زخم، سل، ذات، الربہ اور ذات الجنب کی تشخیص فارقہ ،اان کے اسباب، علامات اور علاج نیز سل کے بارے میں الربہ اور ذات الجنب کی تشخیص فارقہ ،اان کے اسباب، علامات اور علاج نیز سل کے بارے میں

جیر تناک معلومات اور اس کا علاج تحریر کیا ہے۔ اس نے اپنے تجربات کے ساتھ ساتھ دیگر قدیم اطباء مثلاً بقر اط، جالینوس، سرابیون، ابن ماسویہ، دیاسقو ریدوس وغیرہ کے معالجانہ تجربات کا تذکرہ بھی کیاہے۔

کتاب الحاوی کی ان چار جلدوں کے اردو ترجمہ کی اشاعت ہندوستان کی آزادی کے پیاس سال پورے ہونے بعنی جشن زریں سال کے موقع پر ہوئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس اہم کتاب کی تمام جلدوں کاتر جمہ حتی الامکان جلد مکمل کر لیاجائے گا۔ان تراجم کی اشاعت ہے، معالجین ،اسا تذہ طب اور طلبائے طب کو یقیناً فائدہ پہنچے گا۔اس کتاب کا گہر ائی سے مطالعہ کیا جائے تو شخقیق کی نئی نئی راہیں سامنے آسکتی ہیں۔

امید ہے کتاب الحاوی الکبیر فی الطب کی چوتھی جلد کے ترجے کو ارباب نظر کے حلقوں میں مقبولیت حاصل ہوگی۔

Mia

(عيم محد خالدصديق)

سنشرل كونسل فارريسرچ ان يوناني ميديس نئي دېلي

9

# بسے لاہ الرحس الرحیے پہلا با ب

# ر ہو ، ضیق النفس، تنفس کی خرابی ، تنفس میں سہولت پیدا کرنے اور پھیچر سے اخلاط غلیظہ و پیپ وغیرہ کوئم کرنے والی چیزیں۔

الأعضاء الآلمہ کے چوتھے مقام میں جہاں امراض سش کا تذکرہ ہاس کا مطالعہ کریں۔
شفس میں اچانک شکی پیدا ہو جائے ، ساتھ میں سینہ کے اندرورم بھی ہو توالی کیفیت میں سینہ کی
جانب اچانک بہ کثرت نزلول کا انصاب ہوتا ہے یا قرب وجوار سے مادہ سینہ کی جانب اتر نے لگتا
ہے۔ علاوہ ازیں خیت شفس کا ایک سب یہ بھی ہے کہ قصبۃ الرئے کے شعبے اخلاط سے پر ہو جاتے
ہیں۔ نیز ایک سب یہ بھی کہ پھیچھڑے کے اردگرد پیپ یا خون جمع ہو کر پھیچھڑے کو انبساطی
حرکت سے روک دیتا ہے۔ نہ کورہ بالادونوں اسباب میں فرق یہ ہے کہ مؤخر الذکر میں چیش ترذات
الجنب یانفٹ الدم کی بیاری ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی چیز موجود نہ رہی ہو تو ضیق شفس اور ربوکا
سب اخلاط بلغی ہول گے۔

كى چيز كويمشكل تھو كئے كے اسباب حسب ذيل ہوتے ہيں۔

ا۔ شے کا غلیظ ہوتا۔

۲\_ شے کار تیل ہونا۔

۳۔ ضعف توت۔

#### اس مقاله میں ان مقامات کا مطالعہ کریں جہال تنفس کی خرابی پر استدلال پیش کیا گیا ہے۔

دوا:

، پھیپھڑے سے پیپ، قرحول کی پر تول اور جھلیوں کا از الہ اور مؤثر طور پر سطیہ کرتی ہے۔ سل کے لئے بھی مفید ہے۔

سیجیج، وگرام، مر وگرام، قردمانا و گرام، حرف و گرام، آس ساڑھے چارگرام، شراب شیری میں کوندھا ہوا جند بیدستر، کولیاں بنالیں۔ ڈھائی گرام نیم گرم پانی کے ہمراہ لیں۔ (جالینوس)

# نہایت عمدہ تنقیہ کرنے والے قرص:

سیمنج، مختم انجرہ، حرف، قردمانا ، فلفل، ترمس، سلیخ انجیر میں گوندھیں۔ مقدار خوراک ساڑھے جارگرام ہمراہ ماءالعسل ۱۳اگرام جے فود نج میں جوش دے لیا گیاہو۔

۰۰ ہم گرام شہد کو جوش دیں۔ گاڑھا ہو جائے تو او پر سے فلفل ۱۳ آگرام پیس کر چھڑکیں اور دو نوں کوا چھی طرح آمیز کرلیں۔ای مقدار میں مُر (داخل کریں)روزانہ ساڑھے چارگرام استعال کریں۔ سے منقب کردانہ ک

بیحد منقی ہے۔(مؤلف)

نقل و حرکت کے بغیر اور بخار کی عدم موجود گی ہیں جے متواز تنفس کا عارضہ ہوا ہے رہو کی بیاری ہوتی ہے اسے نفس الانتقاب کہتے ہیں کیونکہ ایس کیفیت میں مریض ایستاد گی کے لئے مجبور ہو جاتا ہے۔ (انتقاب ایستادہ ہونا، کھڑا ہونا) ہوفت خواب کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ سینہ بہت زیادہ انجر آتا ہے کیونکہ اس وقت تنفس زیادہ سہل ہوتا ہے۔ سینہ تمام کا تمام پھیلتا ہے۔ البتہ قصبۃ الرئ یا پھیپھڑے کے ارد گر دپیپ یا غلیظ رطوبت ہوتی ہے لہذا جو ہوا جذب ہوتی ہو وہ کافی نہیں ہوتی۔ پھیپھڑے کے اندراز قتم دبیلہ ورم اور قصب الرئ میں ورم پیدا ہوجانے ہے بھی راست کے پھیپھڑے کے اندراز قتم دبیلہ وہ اتا ہے۔ الن دونوں میں قصبۃ الرئ کے اندرمادہ کی وجہ ہو جی تنفس ہو جاتا ہے۔ الن موتی ہو جاتا ہے فرق یہ ہو جاتا ہے فرق یہ ہوتی تنفس عارض ہوتا ہے اس میں فرق کرنا ضروری ہے کیونکہ علاج مختلف ہو جاتا ہے فرق یہ ہو کہ قصبۃ الرئ کی وجہ ہے جو شیق المرن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے بہت جلد ہوادا خل نہیں ہوپاتی۔ لہذا ہوا تھینچنے کہ وقت سانس گہری ہو جاتی ہاور جس میں پھوڑا ہواس کے ساتھ تخور ہوتا ہے۔ اگر یہ بارد ہو تو شدیر پھوٹل ہوگا اور جو ضیق تنفس قصبۃ الرئ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ تھوک خارج ہوتا ہے۔ اگر یہ بارد ہو تو شدیر پھوٹل ہوگا اور جو ضیق تنفس قصبۃ الرئ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ تھوک خارج ہوتا ہے۔ اگر یہ بارد ہو تو

آرام ہوتا ہے مریض کھانسنا چاہتا ہے۔ سینہ کے پھوڑے کی وجہ سے جو ضیق تنفس ہوتا ہے اس میں

سینہ کو دبانے سے تکلیف ہوگ۔ پھیپھرٹ کے اردگر داخلاط کی وجہ سے جو ضیق تنفس ہو تا ہے اس میں ایک مدت کے بعد نفث ہو گامریض پہلوبد لے گانو تفل اور انصباب کی کیفیت محسوس کرے گا۔

تصبة الرئد خلط غلیظ کاعلاج میہ ہے کہ مقطع ادویات کے ذریعہ لطافت پیدا کریں۔ دبیلہ کاعلاج میہ ہے کہ ملطف ادویہ کوکام میں لائیں۔ لطیف اور بتلی شراب پینا موافق ہے۔ البتہ پھیپھر سے کے اندر پھوڑا ہو تو کم لی جائے۔ قصبة الرئد میں خلط غلیظ ہو تو بہ کثرت لی جائے کیونکہ جو دوائیں اس طرح کی رطوبتوں کو جھیے کرتی ہے وہ لاز ماکھانی پیدا کرتی ہیں۔ کیونکہ شد غلیظ اپنی لزوجت کے باعث آسانی سے اوپر نہیں چھڑھتی۔ اس طرح مریض کوزائد رطوبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ خلط کا اوپر چڑھنا آسان ہوجائے۔ (جالینوس)

# سينه كاتنقيد حسب ذيل وجوه يوشوار موتاب:

ا۔ سینہ کے اندر موجود شے کا غلیظ ہونا۔ اس میں تلطیف کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ادویات مقطعہ سے پوری ہو علق ہے یا وہ بہت زیادہ غلیظ اور خشک ہوتو رطوبات لطیفہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

۲۔ سینہ نے اندر موجود شنے کارتی ہونا کیونکہ یہ ہوا ہے نکل کر آتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ نشاستہ اور کتیر اکے ذریعہ اے غلیظ کیا جائے۔

۳۔ موجود شئے کی کثرت۔ غذا کم کی جائے زیادہ نہ لی جائے۔روزہ رکھیں، تئے کریں، مسہل لیں اور مختم انجرہ،بسبائج، قناءالحمار، شخم حنطل اور بڈھے مرغ کا شور بہ استعمال کریں۔ ۳۔ ضعف قوت۔عطاس ہے مددلی جائے۔(مؤلف)

تصبۃ الرئے کی خلط غلیظ ہے جو رپولاحق ہو تا ہاس میں خلط لزج کو توڑنے والی ادویات دی جائیں۔ بایں ہمہ دواؤں اور غذاؤں کے ذریعہ اس خلط کی رطوبت میں اضافہ کیا جائے۔ پھوڑوں میں ملطف اور محفف ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے مفید دوائیں وہ ہوتی ہیں جو از فتم افاویہ (مصالحہ جات) ہوتی ہیں کیونکہ یہ سب ملطف اور پچھ منحن بھی ہوتی ہیں۔ ربوکے اندروہی دوائیں سب سے زیادہ مفید ہوتی ہیں جو ملطف ہوں اور طاقتور منحن نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سر کہ محصل، خود عصل اور سخین عنصلی اس میں سب سے زیادہ مفید ہے۔ طاقتور منحن ت اجتناب کریں کیونکہ خلط کو غلیظ کرتی ہیں۔ اس کا تھو کناد شوار ہوجاتا ہے۔ ای طرح ان دواؤں سے پر ہین کریں جو سخت برودت پیدا کرتی ہیں کیونکہ یہ خلط کے اندر خمار پیدا کرتی ہیں اور اسے گاڑھا کرتی

جذب ہونے اور تبطئے میں د شوار بنادی ہیں اور تھو کنا مشکل ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربو کے لئے ان ادویات کے وہی مرکبات عدہ ہوتے ہیں جن کے اندر نہ افیون نہ یبر وج وغیر ہاور نہ اسپغول حتی کہ اور زیادہ یہ مرکبات عمدہ ہوتے ہیں جب ان میں کوئی بھی قابض دواشامل نہ کی جائے کیونکہ اس طرح کی دوائیں اس بیاری میں نہایت برعکس اثری حامل ہوتی ہیں۔ (جالینوس)

جالینوس نے واضح کر دیا ہے کہ ضرورت ہو تو خلط رقیق کو کیسے غلیظ کیا جاتا ہے۔ای طرح اس امرکی بھی وضاحت کر دی ہے کہ ان داویات میں وہ دوائیں پلائیں جو طاقتور مجفّف ہوتی ہیں۔تلطیف پیدا کرنا چاہیں تو بہ کثرت لطیف رطوبات شامل کریں۔ نیم گرم پانی کے ذریعہ جمام، ماء العسل، اور رقیق شراب لطیف کے ذریعہ جسم کی ترطیب کریں۔اس کے بعد ان ادویات کا اعادہ کریں جو نفث کے ذریعہ استیصال کرتی ہیں حتی کہ تمام خلط کا صفایا ہو جائے، فلفل، قرد مانا اور خردل کا استعال صرف شہد ہی کے ساتھ کریں۔یانی اور شہدر ہوکے لئے موزوں ہیں۔(مؤلف)

#### ربوكے لئے:

بصل عنصلی (جنگلی پیاز) کو نچوژ لیس، پھر عصارہ پر اتنا ہی شہد ڈال کر کو ئلہ کی آگ پر گاڑھا کرلیں اور استعمال کریں۔ ۵۲ گرام قبل از طعام و ۵۲ گرام بعد از طعام۔

#### ویگر:

فودنج، حاشا، ایر سا، فلفل، دار فلفل، انیسون، شهد میں گوندھ کر ساڑھے چارگرام صبح وشام استعال کریں۔ یا زیب وحلبہ مغسول اتناجوش دیں کہ پھٹ جائیں۔ پھر صاف کر کے گئی بار استعال کریں۔ یا شیخ، سداب کی شاخیس، جوش دیں اور شہد کے ساتھ گاڑھاکرلیں۔ مقدار خوراک سااگرام ہمراہ سجنہین۔

#### ر ہو کے مریضوں کے لئے حب بل:

یادرہے کہ ربونام ہے قصبۃ الرئد میں خلط غلیظ کا۔ شخم حنظل ۲۰۲۵ گرام، انیسون ۷۵. گرام پانی میں گوندھ لیں اور گولیال بنالیں۔استعمال سے ایک روز پہلے سادے حقنہ دیں اور دوسرے دن تمام دوا ماء العسل کے ہمراہ پلادیں۔

#### ریگر:

حنظل، شیح ہم وزن۔ بورنصف جزء اصل اسوس دو جزء، جو شیر دو جزء گولیس بنالیس مقدار خوارک ۵۰۰ ساگرام ہے ۵۰۲۵ گرام تک۔ایک گھنٹہ کے بعد ماءالعسل ۷۵ اگرام دیں۔ پہلی دواء کے ساتھ بھی یبی طریقہ اختیار کریں۔

#### و یگر:

خرول۵. ۴ گرام ، ملح العجین ۲۵. ۴ گرام ، عصارهٔ قثاء الحمار ۲۵. ۴ گرام \_ آٹھ قرص بنالیں اور روزانہ پلائیں \_ساتھ میں ماءالعسل نہ دیں \_(جالینوس)

#### ربوكے ليمسبل:

شحم حنظل اگرام، تخم انجر ۵۰ ساگرام، بور ۵۵ اگرام، افیتمون ۵۵ اگرام ماءالعسل میں گوندھ بطور شربت لیں اور تین گھنٹوں کے بعد ۵۰ ساگرام یا ۵۰ اگرام ماءالعسل نوش کریں۔

#### معجون:

تربد، مخم انجرہ، اب قرطم، افتیون، سباتج، خردل، عصارہ عصل اور شہد میں گوندھ کر۵ تا ۱۰ گرام کردیں مسبل ہے۔ بیحد سقیہ کرتا ہے۔ اسبال مقصود نہ ہو تو۵. ساگر ام دیں۔

#### حب بل نفث غيرسبل:

مُر ،فلفل، تخمُ انجر ہ، سیجنج ، خر دل ، عصار ہُ عمصل اور شہد میں گو ندھ کر صبح اور پوفت خواب دیں۔(مؤلف)

پھیچرے کی صفائی کھانسی کے ذریعہ ہوتی ہے کیونکہ وہ تمام چیزیں جومائی اور حد درجہ رقیق ہوتی ہیں ہوا کے اردگر د بہتی ہیں۔ ہوا کھانسی کے ذریعہ خارج ہوتی ہے۔ ند کورہ اشیاء کا انصباب اس جہت کے مخالف ہو تا ہے جس جہت میں ہوا چلتی ہے کیونکہ کھانسی کے اندر خارج ہونے والی ہوا کے ساتھ یہ اخلاط موجود ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اخلاط کی غلظت اسی مقد ارمیں ہوگی جس مقد ارمیں ہوا کود فع کرنا ممکن ہو۔ یہ اس کیچڑ کے ماندنہ ہوگی جو قصبة الرئہ کے اندر بیٹھ جاتی ہے یا اس رقیق پانی کی

#### 14

طرح نہ ہوگی جو ہوا کے اڑے متفرق ہوجاتا ہے بلکہ غلیظ اور رقیق ہونے میں معتدل ہوگی۔لہذا
لیسد ارخلط کو ترطیب ہی کی نہیں بلکہ تجلیہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔جلاء کاکام میشی چیزیں کرتی ہیں۔
اسی طرح تقطیع کاکام بھی میشی چیزوں کے ذریعہ ہوتا ہے۔ کشی چیزوں ہے ہوشیار ہیں یہی وجہ ہے
کہ ماءالعسل اخلاط غلیظہ کے اخراج کے لئے بیحد موافق ہے۔ سنجبین لیسد ارخلطوں کے لئے ہے۔ماء
العسل کے بعد دوسر انمبر ماءالشعیر کا ہے۔اس کے بعد شراب شیریں کا درجہ ہے بشر طیکہ سینہ کے
اندرکی چیز پختہ ہو چکی ہواور اخراج کی ضرورت ہو۔

ر بو اور سعال بوژهول کو عارض ہو تو تقریباً شفا نہیں ہوتی کیونکہ ان بیاریوں کا پختہ ہونا نوجوانوں میں د شوار ہو تاہے چہ جائے کہ بوژهوں میں۔ ریور کے مصدل کا بارج السی جزیراں میں کریں جہ کشریں۔

ر بو کے مریضوں کاعلاج ایسی چیزوں سے کریں جو کثرت سے بلغم کا اخراج کرتی ہو ا۔

#### تدبيرملطف:

شیریں شراب ملطف اشیاء کے ساتھ استعال کی جائے تو سینہ کے مادوں کا اخراج کرنے کے لئے عمدہ ہے کیونکہ منحن محلل اور مرفق ہوتی ہے۔ سینہ کے مادے سخت ہول تو سہولت اخراج کے لئے ترطیب کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سخت چیز کا اخراج مشکل ہوتا ہے۔ یہ زیادہ طاقت ورشے کی مختاج ہوتی ہے۔ اس میں شدید کھانسی سے ہیجان پیدا ہواور بیحد خشک اور زیادہ بھی ہو تو شدت سعال سے مرگوں کا پیعٹ جانا یقینی ہے۔ لہذا خلط کورقیق کریں، تھوڑی لطافت پیدا کریں تاکہ اخراج آسان ہو سکے۔ کی مجتاب کی جی چو بیف ایسر۔

(جالینوس)

اس لحاظ سے ضیق تنفس میں سب سے پہلے بائیں پہلو کی فصد کھولی جاتی ہے کیونکہ دل کیاسی

تجویف سے شریا نیس ثکلتی ہیں اور اس سے قلب کو ہوا کے ذریعہ راحت پہو پختی ہے۔ اس پہلو میں

خون ہلکا ہو جائے گا تو جگر کشادہ ہو جائے گا اور انبساطی حرکت زیادہ سے زیادہ آسان ہو جائے گی۔ قلب
کی داہنی تجویف اس خون کے لئے خاص ہے جو جگر سے دل کی جانب سے آتا ہے۔ اس لئے خفقان

قلب اور امتلاء د موی میں اس جانب کی فصد کھولنااولی ہو تا ہے۔ (مؤلف)

ضیق النفس کا ایک قشم سرسے سینہ کی جانب اتر نے والے دائمی نزلوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کاعلاج سے ہے کہ ادویہ موصوفہ جن کے اندر پنج اور افیون ہوتی ہے کے ذریعہ نزلوں کوروک دیا جائے۔ سب سے عمدہ دواگل ارمنی ہے کیونکہ یہ نزلوں کو قطعی طور پر روک دیتی ہے۔ پھیپر کے اندر کوئی چیز نکل جانے کے محتاج ہو توالی صورت میں کھانسی مفید ہے۔اہے حسب ضرورت پیدا کریں۔ طبیخ زو فلاخراج کو آسان کرتی اور شکم کو چلادیتی ہے۔انجیر سفید ۵ ۔ کاگرام، زو فائے ختک ۵ ۔ کاگرام، منتی ۵ ۔ کاگرام، نیخ سوسن ۵ ۔ کاگرام، نیخ کرفس ۵ ۔ کاگرام، کشینر بٹر، ۵ ۔ کاگرام، بربر مقشر ۵ ۔ کاگرام، جوش دیں۔ پانی ایک چو تھائی رہ جائے تو چھان کر فوش کریں۔

بلا بخار سینہ کے مزمن در دول میں حلبہ فر بہ کہور کے ساتھ جوش دیں اور اس میں زیادہ شہد شامل کریں اور انگاروں پر گاڑھا کرلیں۔ حتی کہ اعتدال کے ساتھ گاڑھاپن آ جائے۔ کھانے ہے بہت پہلے استعال کریں۔(جالنیوس)

ربوکی کچھ فتمیں سینہ کے اندر مجوس ریاح ہے انجرتی ہیں جو سینہ کے اندر نفخ پیدا کردیتی ایس۔ ان کاعلاج ان ادویات ہے کریں جو مفتح سد دہوتی ہیں۔ شبث، بابونہ، مرزنجوش، جوش دے کر اس کے ذریعہ سینہ اور پہلوؤں کی تکمید کریں، پہلوؤں پر روغن نار دیں، روغن غار، روغن سداب اور گرم روغنیات کی تمریخ کریں۔ شخذ نایا(۱) اور امروسیا(۲) پلائیں۔ قئے کرائیں اور ۵، ساگرام شجینج یا جاؤ شیر پلائیں۔

#### ر بورطوبی کے لتے:

فلفل سفید • • ۴ گرام ، نانخواه ۵ • اگرام ، فود نج ۵ • اگرام ، نیخ کر فس ۵ ۳ گرام ، حاشا۵ ۳ گرام \_ شهد میں گوندھ کر گولیاں بنالیں \_

مقدار خوراك:

۵۰ ۴ گرام جمراه ماءالعسل نوش کریں۔

سینہ کے اندر محبوس ریاح سے پیداشدہ ربو کے لئے:

جند بيدستريك جزءاشق يك جزءباجم ملاكر ٥٥. اگرام جمراه ماءالعسل بلائيس

ويكر

حبق، حاشا، ایر سا، فلفل سفید، انیسون، ہم وزن شہد میں گو ندھ کر مریض کو ۵۷. اگرام ہمراہ ماء (۱) غالبًا بحرنیا، بمعنی دواء حاد۔(۲) ارمر اض مهر میں مفید ایک معون ہے۔

#### العسل بلائيں۔

# قے آور، مخرج فضول اورسکن ربو، بے نظیر دوا:

خردل 8. ساگرام، نمک 8. ساگرام، بوره ار منی نصف، نظر ون ۵۰۰ ملی گرام مقدار خوراک ۸. ساگرام بمراه آب تازه و شهد ۵۰ اگرام مشهد ۵ ساگرام بمونی چاہئے۔ ربو کے ساتھ غلظت بحد بھی ہو تو دواؤل کے اندر غافث، افسنتین، فوہ اور زراو ندوغیرہ شامل کریں پھیپیرٹ اور سینہ کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ربو عارض ہو تو انبساط پر اکتفانہ کریں اس کے لئے تنفس کا تدراک کریں۔ جیسا کہ چھوٹے معدہ میں حالت ہواکرتی ہے۔ (اھرن)

# بلغم غليظ كے لئے:

اسقولو قندریون۵. ۳گرام نوش کریں۔ملطف اور مخرج بلغم ہے۔اس باب میں عجیب الاثر ہے۔ پھیپھڑے کی شدت بیوست و حرارت سے پیداشدہ ربو کے لئے جس میں اخراج نہ ہورہا ہو تو گرھی اور بکری کادودھ استعال کریں۔بتدر سج تین ہفتے۔(طبری)

ضیق تنفس کے ساتھ سینہ میں حرارت بھی ہو تو مبر دملین مر ھم اور قروطیوں کو استعال کریں۔ مثلاً روغن بنفشہ، لعاب رجلہ اور اسپغول وغیرہ سے تیار کردہ قیر وطیاں۔ غالب برودت بھی ساتھ ہو توگرم روغنیات اور شمعیات مثلاً روغن نرگس، روغن سوس، بابونہ و ناخونہ وغیرہ استعال کریں۔ ضعف عضلات تنفس جس میں مریض ایستادہ ہوئے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ روغن سوس من سوس

مفید ہے۔ (اهر ن)

یہ سو تنفس کی ایک ایس فتم ہے جو فقط ضعف عضلات سے لاحق ہوتی ہے۔ علامت ہیہ کہ سرخی ہوگی نہ کھانی، صرف سانس میں تنگی ہوگی۔ ضیق النفس کبھی بیوست کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ اس میں جسم کمزور اور سخت ہوتا ہے۔ مقدم تدبر سے بھی اس کا پیتہ چل سکتا ہے۔ گرم پانی سے علاج کریں۔ بیسہ بط اور روغن کدو کے ذریعہ تمریح کریں۔ دودھ اور پانی ہم وزن میں تھوڑ ا بنفشہ اور فائیذ جوش دے کر پلائیں، مفید ہوگا۔ شدید حرارت سے ضیق شغس عارض ہو عرق کاسی، عنب المعطب، سکر اور بنفشہ سے علاج کریں۔ رطوبت غلیظ سے بیداشدہ منگی شغس میں شخد نایا اور عرق المعالی میں شخد نایا اور عرق

سداب دیں۔ رطوبت غلیظہ کا اخراج مطلوب ہو تو حلبہ اور مفتی بارش کے پانی میں جوش دے کر پلائیں۔ مفتی ۴۰ گرام ، حلب مغلولہ ۴۰ گرام بارش کے ایک کوزے ( تقریباً ۱۰۰ ملی لٹر) پانی میں خوب انجی طرح جوش دے کر صاف کریں اور صح وشام روزانہ نیم گرم استعال کریں۔ نفث الدم کی کی قتم کے ایک طرح جوش دے کر صاف کریں اور صح وشام روزانہ نیم گرم استعال کریں۔ نفث الدم کی کی قتم کچھ الدی چیزیں دیں جو خوان کو پھھلادیں۔ یہ ملطف ہوتی ہیں۔ اخراج خوان تک قابض ادویہ سے پر ہیز کریں۔ سید تنگ اور پھیچو اچھو کا ہوتو آدمی طبعی طور پر جتلائے ضیق التفس ہوتا ہے۔ (مؤلف) ربوجو انتقاب نفس کا نام ہے کا علاج ہے کہ لیسد ارکیموس کو لطیف بنادیا جائے ، اس کے لئے ایک دوائیں استعال کریں جو خلط لزج (لیسد ار) کورقیق کردیتی ہیں۔ بجی وجہ ہے کہ مریض کو سرکہ عنصل سیخین عصلی ایارج فیقر امسلسل اسہال، طاقتور دواؤں اور مولی کے ذریعہ نے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دواؤں میں زراو ندید جرح، قنطوریون کبیر، ختم فود خ، زوفاء اور شونیز استعال کی جاتی ہیں۔ فصد کی ضرورت ہوتو ان ان دواؤں کے استعال سے پہلے فصد کھولیں۔ سید کو حرکت دیں، مرقی فصد کی صرورت ہوتو ان دواؤں کے استعال سے پہلے فصد کھولیں۔ سید کو حرکت دیں، مرقی وصلطف ادویہ مثلاً روغن سداب، روغن شہٹ وغیرہ ہے تم سی کریں۔ روغنیات میں صحب ذیل نسخہ منامل کریں۔

#### نسخه:

انیسون، در دی شراب سوختہ، کلی نورسۃ اذخر، زریخ ، بورہ، روغن میں شامل کریں اور سینہ سے متصل اعضاء پر مالش کریں۔ وہ ضاد بھی مستعمل ہے جو مائی قتم کے فضلات کو جذب کر لیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے استیقاء کے لئے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ بھی شربت عسل کے ساتھ بورہ بطور مشروب استعمال کرتے ہیں۔

ديكر:

بوره ۵. ۴۴ گرام، فلفل ۵. ۳ گرام \_ زیخ انجد ان ۲۱ گرام \_ مقد ار خور اک:

ایک چچد (وگرام) همراه آب تازه۔

ر بو کے مریضوں کے لئے تئے کی دوا:

خرول ۵. ساگرام، بورہ ۲۲.۵ گرام، عصار و تاء الحمار ۷۵. سطی گرام۔ ای وزن کے برابر

روغن بادام \_ بکثرت فضلات کااخراج ہو گااور کسی تکلیف کے بغیر جسم کا سقیہ ہو جائے گا۔ شدت ر بو میں اگر اختناتی کیفیت پیدا ہو جائے تو ۱۳ گرام بورہ، پانی اور شہد ۷۵ اگر ام اور حرف کے گرام کے ہمراہ فوری افاقہ ہو گا۔ یہ عرق النساء میں بھی مفید ہے۔ (بولس)

کثرت بول پیدا کرنے والی ہر چیز سینہ کی محتاج تنقیہ غلظت کے لیے خراب ہے کیونکہ اس سے رقیق بلغم نونکل جائے گالیکن سینے کے اندر باقی رہ جائے گا۔ایسی صورت میں مرطوب رقیق غذائیں استعمال کریں۔(اسکندر)

# حرارت کی موجودگی میں ربو کاعلاج:

دودھ کے ساتھ بودینہ بکا کر پلائیں۔مریض بچہ ہے اور بلغم خارج نہیں کر سکتا تو پو دینہ مال کے دودھ کے ساتھ بکا کر حلق میں ٹپکائیں یا دودھ میں عرق بادیان شامل کرکے بکائیں اور بچے کو پلائیں (ابن ماسوبیہ)

# ربوكاسب سے اعلىٰ علاج:

زراوندمد جرج،اورتخم پودیند-(اریباسیوس)

بحت الصوت (گلا بیٹھنا) کی عدم موجودگی میں بلغم کااخراج مشکل ہے ہورہا ہو تواس کی وجہ یوست ہوتی ہے۔اور بحت الصوت کی موجودگی میں یہ کیفیت رطوبت کا متیجہ ہوتی ہے۔(لجلاح) یوست ہوتی ہے۔اور بحت الصوت کی موجودگی میں یہ کیفیت رطوبت کا متیجہ ہوتی ہے۔(لجلاح) خربق سفید، پودینہ کوہی، تخم انجرہ، فلفل بقد رقلیل گوندھ کر گولیاں بنالیں اور مریض کودیں۔
(ابن ماسویہ)

<sup>(</sup>١) بالشت كرابر جيوني مجمل، آذر بائجان من يائي جاتى - يراني كوپينے عق آتى -

صعتر ، انیسون ، نعناع ، چقندر ، اور خردل مفید ہے ، خرگوشت ، ہر ن اور بارہ سنگھوں کے گوشت بھی مفید ہیں کیونکہ خشک ہوتے ہیں ، لومزیوں کے گوشت خاص طور پر مفید ہیں۔

موٹااور نفخ پیداکر نے والااناج مفتر ہے کیو نکہ اس سے ضیق تنفس پیدا ہوتا ہے۔ شراب ریحانی پرانی اور ماء العسل استعال کریں۔ شراب ہرقتم کی کم استعال کریں۔ شنڈی شراب استعال نہ کریں۔ کھانے کے بعد شراب نہ پریجیں۔ یکبارگی بھی نہ پریجی بلکہ ممکن حد تک مؤخر کریں اور تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھیں، کم سوئیں کیونکہ زیادہ سونے سے مریض تو کیا تندر ستوں کو ضیق تنفس ہوجاتا ہے۔ کھانے کے بعد اور دن میں نہ سونے سے مرابی نہ سونے سے کمزوری اور حمارت اور تکان لاحق ہوجاتی ہو۔ ایسی صورت میں دن کے اندر تھوڑا سولیں۔ روزانہ ایک یا دو دست غذاؤں یا ملین اشیاء کے ذریعہ آجانا جیا ہے۔ کھانے سے جائے۔ بڑھے مرغ کا شور با، مغز قرطم، لبلاب، چقندر، کرنمکین، طریخ عتیق موزوں ہے۔ کھانے سے قبل استعال کریں۔

ماءالشعير ميں تھوڑى فربيون ملاكر پلائيں يہ بيحد مفيد ہے۔افتيون كى بيحد تعريف كى گئى ہے۔

2گرام طلاء(۱) كے ساتھ پلائيں۔ يہ تدبير تلييں طبع كے لئے كانى بين، سينہ پرروغن سوس، روغن غار، روغن شبث، سداب اور خوشبو دارگرم روغنيات كى تمر يخ (مالش كركے فرم كرنا) كريں۔ان روغنوں كے ساتھ تھوڑى موم بھى حل كرليں۔ تاكہ وہ سرعت سے تحليل نہ ہوكيس۔ روزانہ ڈھائى گرام زراو ندمد جرح عرق سداب تربيس ساڑھ تين گرام كرام رابرگولى بناكر پلائيں۔ سركہ بين تخم قريص بھوديں اور يہ سركہ پلائيں۔ عرف على المائيں۔ شروع بين قديد ہور اللہ تعرب ساتھ پلائيں۔ شروع بين گولى بناكر پلائيں۔ شروع بين گولى بناكر پلائيں۔ شروع بين گولى بناكر وئي بناكر ہلائيں۔ شروع بين گولى بناكر ہيں تعدہ مفيد ہے۔اے شہد بين گولى بناكر دين نہايت عمدہ ہے۔اس سے بھی زيادہ مفيد حسب ذيل جوشاندہ ہے:

#### جوشانده:

زوفائے ختک، فراسیون، اصل السوس، ایر سا، کماذر یوس، جعدہ، حاشا، فوذنج، اسپر روغن بادام تلخ یا روغن حب صنوبر پڑکا کر پلائیں۔ حب الفار، عنصل، بناست، (صمغ بطم) اور عاقرقرحا، موزول ہیں۔ جاوشیر، سب سے زیادہ مؤثر ہے، گر احتیاط سے دی جائے۔ کیونکہ اعصاب کو متاثر کردیتی ہے۔ ایک دواسے دوسری دواکی جانب نتقل ہوتے رہیں تاکہ طبیعت کی ایک دواکی عادی نہ ہوسکے۔ زیادہ مؤثر دواہا تھ لگ جائے تواسے یابندی سے استعال کریں۔ رہو ہیں سب سے بہتر نمک،

<sup>(</sup>١) پکایا ہوا عصار وا گور عجم عناے ميفخنج كتے ہيں۔

مولیاور سیجبین عنصلی کے ذریعہ بالخصوص غذا کے بعد قے کرادینا ہے۔ خربق پر انحصار کریں توبیہ اور زیادہ مؤثر ہے۔ بایں ہمہ یہ ناپسندیدہ بھی نہیں ہے۔ نیز سینہ کے امر اض میں اس سے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ چاہیں تو خربق کو مولی میں گڑو کر سیجبین کے اندر بھگودیں، اس کے بعد مولی کھالیں۔ اس میں کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔

مریض سینہ کا کمزور ہوتو تے کرانا قطعاً ترک کردیں،اس کی جگہ قناءالحمار، فراسیون، غاریقون اور افیتمون کے ذریعہ مسلسل اسہال لائیں۔اسہال کے ساتھ بیہ دوائیں بالخاصہ مفید ہیں لہذا مہینہ ہیں چار بار استعال کریں۔ میں نے اس کے ذریعہ ایک کثیر مخلوق کو صحتیاب کیا ہے۔ یہ مہیانہ ہو تو قعطوریون اور حنظل وغیرہ کے ذریعہ حقنہ استعال کریں۔

#### ربو کے لئے عمرہ سفوف:

رشاده واگرام، ممم (عل) 20 گرام، قریص ۵ سگرام، زوفائے خلک ۵ سگرام، فانیده سگرام۔

# منقى صدر گولى كانسخه:

غاریقون ۱۳، اصل السوس مقشر ساڑھے تین گرام ، فراسیون ساڑھے تین گرام ، تربد ۵، ایار ج ۱۲، شخم حنظل ۲، عنز روت ۲، مُر ساڑھے تین گرام ، میخنج کے ساتھ گولیاں بنالیں۔ ۱۳۰۰ مشر بر

عگرام بمراه آب ينم كرم-

بخارنہ ہو تولعوق حلبہ اور انجیر بیجد مفید ہے۔ ربو کے ساتھ بخار بھی ہو تو علاج بیجد و شوار ہے۔ ضرورت ہوتی ہے کہ حرارت کی مقدار میں نرمی برتی جائے۔ اس بیاری میں باری طویل ہونے ہے گھبرائیں نہیں کہ اس میں باری طویل ہوتی ہی ہے۔

ر بواور برانی کھانسی کیلئے بخور کانسخہ:

زریج، کبریت، ہم وزن پیے گردہ میں گوندھ کرایک قیف کے ذریعہ بخور (دھونی) دیں۔

# ندكوره بيارى اورسل كيلية ويكرنسخه:

پھیپرے کو خشک کر تاہے۔ مر ،سلید، زعفران ہم وزن، شراب میں گو ندھیں اور ساڑھے تین

#### گرام لے کر بخوردیں۔

# ويكرسعال مزمن كے لئے:

اس شیخس میں فوری کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ زریخ زر دزراد ندطویل پیس کرگائے کے گھی میں گوندھیں اور گولیال بنالیس۔ ساڑھے تین گرام کی مقدار لے کر دھونی دیں۔ عجیب الاثرہے۔ روزانہ تین بار وس دن تک بیاس کے لگ بھگ صبر سقوطری کے ذریعہ دھونی دیں۔ یا دھونی کے لئے لبنی سائلہ ، بارزد ، اورزر شخ استعمال کریں۔ یہ سب عمدہ ہیں۔ (ابن سر ابیون)

# حب منقی خصوصیت سے آلہ تنفس کے لئے:

غاریقون ۱۰۰ ایر ساا، فراسیون، تربد ۱۳ ایارج فیقر اء ۱۳ ، شخم حنظل ۱۰ انزوت ۲ مقدار خوراک کرام ہے ۱۰ گرام سے ۱۰ گرام تک (حنین) مدر بول ادویات سینہ کے مادہ کو خارج کرنے کے لئے موزوں نہیں ہے کیونکہ بیہ اس سے بھی زیادہ گرم ہوتی ہیں۔ لہذا ہمیشہ خشکی پیدا کریں گی۔ ان دواؤں کو قاطع ہونا چاہئے۔ اور وہ بھی اس حد تک گرم نہ ہوں کہ شدید خشکی پیدا کریں۔ نیز انہیں مرطب چننیوں اور مشروبات کے ساتھ استعال کرنالازم ہے۔ (جالینوس)

جالینوس نے پھیپھڑے کے امراض پر جہاں الاعضاء الآلمہ میں لکھا ہو ہاں ہد لکھا ہے کہ ربو جو تھوڑا تھوڑا تھوڑا کرکے شروع ہوتا ہے اور پھر مریض کوگرفت میں لے لیتا ہے سوء مزاح بارد کا بھیجہ ہوتا ہے اور ایک زمانہ کے بعد پھیپھڑے کورطوبتوں سے پُر کردیتا ہے۔ یہ کیفیت زیادہ تر بوڑھوں کو پیش ہوتی ہے۔ اس کاعلاج ممکن حد تک سینہ کوگر می پہونچانا ہے۔ ضرورت پر خردل اور انجرہ کاگر م ضاد بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ نیز علک، مر، اور جاؤشیر سے بنی ہوئی گولیاں رات کو منہ میں رکھی جاسکتی ہیں۔ (مؤلف)

# ربوكے لئے ایک عده دوا:

خردل انجیرے ساتھ کوٹ کر گولیاں بنالیں اور استعال کریں۔ یہ انتہائی علاج ہے۔

#### ملطف تدبير:

مسلسل لطافت پیدا کرنے والی تدبیر ہے ربو کااز الہ ہو جاتا ہے۔ (مؤلف) ربواور بہت زیادہ مرطوب کھانسی کے مادہ کو توڑنے کے لئے اس سے زیادہ مؤثر تدبیر اور کوئی نظر نہیں آئی کہ مریض کوقئے کرائی جائے اور اسے ہدایت کی جائے کہ بآواز بلند طویل قراءت کرے ۔اس سے بلغم کا بیحد افراج ہوتا ہے۔ (مؤلف)

پرسیاوُشاں سینہ سے لیسد ار غلیظ اخلاط کا اخراج برزور کردیتی ہے۔ یہی اثر بادام تلعُ کا بھی ہے۔ زراو ندید حرج کی بھی یہی شان ہے۔(جالینوس)

قیاس آرائی میں یہ بات آنچکی ہو کہ مادہ زیادہ ہے اس کی وجہ سے اخراج رکا ہوا ہے تو ایس حالت میں دواء مسہل کے ذریعہ جسم کااستفراغ کریں۔(جالینوس)

مخرج بلغم لعوقول کے اندرراس شامل کردی جائے تواس کاعمدہ اثر ہوتا ہے۔ (جالینوس)
حاشا بلغم کے اخراج میں سہولت پیدا کرتی ہے۔ پودینہ نہری خلط سینہ کے باعث پیداشدہ
ضیق النفس میں مفید ہے۔ پودینہ کو ہی اس ہے بھی زیادہ طاقتور اور بیحد مفید ہے۔ حرف اور خردل
ر بوکے لئے عمدہ ہیں۔ قنطور یول کبیر کی جڑ ضیق النفس اور پرانی کھانمی میں مفید ہے۔ شونیز ر بوکے
لئے عمدہ ہے۔ زفت رطب ر بوکے لئے بیحد عمدہ ہے۔ قضم قریش اخراج بلغم میں معاون ہے۔
فراسیون اخراج کے ذریعہ سینہ کوصاف کردیتی ہے۔ زراو ندے اخراج میں سہولت ہوتی ہے۔ بایں
ہمہ نفث الدم کے لئے عمدہ ہے۔

ساسالیوس انتشاب النفس میں مفید ہے۔ مُر ربو اور پر انی کھانسی کے لئے عمدہ ہے۔ ربو کے لئے سب سے زیادہ مفید دواسقولو قندریون ہے۔ رئۃ التحلب (لومڑی کا پھیپیروا) خٹک کر کے پینار بو میں مفید ہے۔ (دیاسقوریدوس)

رئة الشحلب تركونصف وزن راكھ كے ساتھ كوٹ كر دھوپ ميں خنگ كرليں۔ پھر شہد كے ساتھ گوندھ كر محفوظ كرليں۔ روزانہ ١٨ گرام ١٨٠٠ ملى ليٹر خالص شر اب كے ساتھ استعال كريں۔ نہايت عجيب الأثر ہے۔ چار دن استعال كريں۔ (اطہور سقس)

ایر سااخراج میں بیحد سہولت پیدا کرتی ہے۔ سینہ کی غلیظ رطوبتوں میں لطافت پیدا کرتی ہے۔ قردمانا سینہ کی غلیظ رطوبتوں کے لئے عمدہ ہے۔ حب بلسال ربواور ضیق النفس کے لئے عمدہ ہے۔ ربو اور ضیق النفس کے لئے مُر کا مشروب بقدر نصف گرام استعمال کیا جاتا ہے۔ حب الغار ربو اور ضیق

النفس كے لئے عمرہ ب- انجيرربوكے لئے عمرہ ب-

مولی ربواور ضین النفس کے لئے عمرہ ہے۔ کراث شامی سینہ کے غلیظ اخلاط کا اخراج کرتی ہے۔
فلفل کو لعوقوں میں شامل کرنے سے خلط غلیظ کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ سعال مزمن میں مفید ہے۔
عنصل، ربو، سعال مزمن، اور سینہ کے کھر درے پن میں عمرہ ہے۔ قرحہ شکم ہو تواس سے اجتناب
کریں۔ غاریقون ربو میں مفید ہے۔ زراو ند مدحرج ربوکے لئے عمرہ ہے۔ قنطوریون کبیر ربو سعال
مزمن اورنفٹ الدم کے لئے عمرہ ہے۔ (دیا سقوریدوس)

نفث الدم كے ہمراہ ربوہو تويہ مفيد ب\_ (مؤلف)

ماء العسل کے ساتھ زوفار ہو، سعال مزمن اور عسر تنفس میں مفید ہے۔ پودینہ ربواور ضیق النفس کے عمدہ ہے۔ حاشار بواور ضیق النفس کے لئے عمدہ ہے۔ ساسالیوس سعال مزمن کی شافی دوا ہے اور عشر نفس میں بیحد مفید ہے۔ عشر نفس جس میں مریض کھڑے ہونے پر مجبور ہوجاتا ہے، کے لئے زیرہ سرکہ میں ملاکر پانی کے ہمراہ استعمال کرتے ہیں۔ نظر ون کے ساتھ شونیز استعمال کرنے سے عشر نفس جس میں مریض کھڑے ہونے پر مجبور ہوجاتا ہے، کو تسکین ہوتی ہے۔ سیجنج در دسینہ اور سعال مزمن کیلئے عمدہ ہے۔ یہ سینہ کے غلیظ فضلات کا قلع قمع کر دیتا ہے۔ قنہ سعال مزمن، عشر ساور ربو میں ستعمل ہے۔ (دیاستوریدوس)

جس مریض کے سینہ میں بخار کے بغیر مز من در دہواس کے لئے حلبہ، فربہ تھجور، کے ساتھ پکاکراس کاشیر ج (عصارہ) لے لیس اور ہم وزن شہد کے ساتھ ملاکر آگ پراس قدر پکائیں کہ معتدل طور پر گاڑھا ہو جائے۔اس گاڑھے عصارہ کو کھانے ہے بہت پہلے استعال کریں۔ (جالینوس)

طبه سینه کوصاف کرتی ہے۔ (خوز)

زیرہ سر کہ کے ساتھ پینار بوہیں مفید ہے۔(ابن ماسویہ) گرم پانی پینار بواور سعال میں عمدہ ہے(سندھشار)

# میرے اپنے تجربہ کے مطابق معجون قنہ کانسخہ:

زوفا، قردمانا، ایرسا، تخم انجرہ، غاریقون، افیتمون وزن سب کے وزن کے برابر شہدیں مجون بنائیں۔ مقدار خوراک ہفتہ وار، ۱۸گرام ۔ حتی کہ درد کا ازالہ ہوجائے۔ عجیب الأثر ہے۔ روزانہ ساڑھے تین گرام ماءالعسل کے ساتھ استعال کیاجاسکتا ہے۔ (مؤلف)

# امراض سینہ کے علاج کے لئے عمدہ مرکب:

کف دریا ، مُر ، نظرون ، روغن بلسال ، فربیون ، میعه سائلہ ، ہم وزن (۳۳ ـ ۳۳ گرام ) یکجا کر کے سینہ کی تمریخ کریں۔ بیرحسب ذیل بیاریوں کے لئے مفید ہے :

ا۔ قصبۃ الرید کی تینگی، جس کی وجہ ہے ہوا جلد داخل نہ ہوتی ہواور ہوا داخل کرتے وقت صاف طور پر گہری سانس لینا پڑتا ہو۔

۲۔ سینہ میں بخار کے ساتھ پھوڑا ہو تو ٹھنڈک کی موجود گی میں شدید ثقل محسوس ہو تا ہو۔ ۳۔ قصبۃ الرئد میں پھوڑے کے ساتھ اخراج بلغم بھی موجود ہو اور کھانسی کی تحریک ہو۔ اخراج سے سکون محسوس ہو تا ہو۔

سم ۔ سینہ میں پھوڑا ہواور دبانے پر در دمحسوس ہو تاہو۔

ے پیدیں پور ابواور ربائے پر رروسوں اور ہوتے کے بعد اخراج ہوتا ہو۔ ثقل ۵۔ پھیپیرٹ کے اور گرد اخلاط موجود ہونے سے ایک مدت کے بعد اخراج ہوتا ہو۔ ثقل محسوس ہوتا ہے۔ پہلوبد لنے پر انتقاب النفس پیدا ہوجاتا ہو۔ (جالینوس)

افیتمون کی طرح اقحوان خشک حالت میں بغیر پھول کے استعال کرنار بومیں مفید ہے۔ اطہور سقس کے مطابق انسان کا پُر انا پیشاب سانس کی شکی اور انتصاب النفس میں مفید ہے۔ (جالینوس)

تخم انجرہ کوٹ کر شہد کے ساتھ چائے ہے عشف جس میں مریض انتصاب (سینہ بھلانے)

کے لئے مجبور ہوجاتا ہے، رک جاتا ہے، یہ فضلات سینہ کا اخراج کر دیتا ہے۔ برگ انجرہ ماء الشعیر کے
ساتھ پکا کر استعمال کرنے سے سینہ کے اخلاط غلیظ کا اخراج ہوتا ہے۔ ( دیا سقور یدوس)
ختم انجرہ کا مشروب سینہ اور پھیپھوٹ سے اخلاط غلیظہ کا اخراج کی متاب (جالینوس)
انجرہ سینہ اور پھیپھوٹ سے غلیظ رطوبتوں کے اخراج میں معاون ہے۔ (اریباسیوس)
ر بو میں برگ ارغوان ہ گرام میضج کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اشقیل ۳ عدد۔ شہد کے
ساتھ استعمال سے ر بو میں فائدہ ہوتا ہے۔ کیایا بھون کر کھانا بھی مفید ہے۔ ابالے ہوئے کا بھی بہی اثر
ہے۔ شہد کے ساتھ چائے ہیں۔ (دیا سقور یدوس)

ربو میں مفید ہوتا ہے اشقیل کا خاصہ ہے۔ اشق شہد کے ساتھ استعال کرنے سے یاماء الشعیر کے ساتھ ویا شخے سے دبو عر تنفس جس میں مریض سینہ کھڑا کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور سینہ کی

رطوبت میں فائدہ ہو تا ہے۔ (دیا سقور بدوس)

روغن بلمال چونکہ فضلات کو پختہ کردیتا ہے اس لئے عشرتفس کو موافق ہے۔ حب بلمال کا مشر دب انتقاب النفس میں مفید ہے۔ تابالغ بچوں کا پیشاب چاٹنا عمر تنفس کے لئے موافق ہے۔ مشر دب انتقاب النفس میں مفید ہے۔ تابالغ بچوں کا پیشاب چاٹنا عمر تنفس کے لئے موافق ہے۔ (دیاستوریدوس)

ضیق النفس میں بچوں کا پیشاب مجر ب ہے۔ مگر اس کا فائدہ دیگر مفید ادویہ کے مقابلہ میں زیادہ نہیں ہے۔(دیاسقور دیدوس و جالینوس)

با قلی سینہ اور پھیپیوٹ کے اخلاط کے اخراج میں مد دگار ہے۔(دیاسقوریدوس) بلبوس (بصل الزیر) ایک بار ابال کر استعال کرنا سینہ سے تھوڑے اخراج مادہ کی ضرورت کو پوراکر دیتا ہے۔دوبار ابالئے سے اثر کم ہو جاتا ہے۔(دیاسقوریدوس و جالینوس)

پرسیاوشال کاجوشاندہ سینہ اور پھیپھڑے سے لیسدار اخلاط غلیظہ کے اخراج میں معاون ہے۔ باب التو کنج جیسا کہ تذکرہ ہو چکا ہے پرانے مرغ کا شور بہ سفائج اور قرطم کے ساتھ استعال کرنے سے ربو میں بیحد نفع ہو تاہے۔بشرطیکہ اس کے ذریعہ بارباراسہال لایاجائے۔(دیاستوریدوس)

یا ابن ماسویہ کے مطابق اے پکایا جائے۔ کراث ربو میں بیحد عمدہ ہے۔ زراوند مدحرج کا مشروب مفید ہے۔انجیر، شہد اور سداب کے ساتھ زوفا کا جوشاندہ ربواور انتصاب النفس میں نافع ہے۔(دیاسقوریدوس)

سی مریض کے سینہ سے پیپ کے اخراج کی ضرورت ہو تو زریٹے ماءالعسل کے ساتھ پلاتے ہیں۔ بھی اے راتیج میں گولیاں بنالیتے ہیں جو ربو میں بیحد مفید ہوتی ہیں، (دیاسقوریدوس)

بیاری کو پختہ کرنا چاہیں تو سینہ اور پھیپیرٹ سے اخراج مادہ کے لئے گھی کا استعمال بیحد مفید ہے۔ تنہا چائے ہے بیاری زیادہ پختہ ہوتی ہے۔ گرشہداور بادام تلخ کے ساتھ چائے ہے اثر کم ہوجاتا ہے۔ بایں ہمداخراج زیادہ ہوتا ہے۔ صمع حبہ حضراء شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنا سینہ سے اخراج کے لئے موافق ہو۔ حلبہ کاجوشا ندہ انجیر کے عصارہ کے ساتھ گاڑھا کر لیا جائے تو سینہ سے اخراج بلغم کے لئے بیحد مفید ہے۔ (دیا سقوریدوس)

چنیوں میں حرف شامل کر دیا جائے اور جانا جائے توسینہ سے فضلات کا اخراج کر دیتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

ربو کی ادویات میں حرف شامل کرتے ہیں کیونکہ خردل کی طرح میہ بھی اخلاط غلیظہ کا ازالہ کردیتی ہے۔(دیاسقوریدوس و جالینوس)

حرف سینہ کے مادوں کے لئے جالی اور پھیپھڑے سے لیسد ار خلط کا اخراج کردیتی ہے۔ (حالينوس) شہد کے ساتھ حاشاکاجو شاندہ اس عرشف میں مفید ہے جس میں مریض سائس لینے کے لئے سینہ پھلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ (ابن ماسویہ) سینہ اور پھیچیزے سے اخراج میں حاشامعاون ہے (دیاسقوریدوس و جالینوس) پھیپھڑے کی جانب انصباب نزلہ کے باعث بار بار پیش آنے والے عسر تنفس میں گل ار منی مفيد - (جالينوس) تخم کتال شہد کے ساتھ ملا کر جائے ہے سینہ کے فضلات خارج ہوجاتے ہیں اور کھانسی میں تسكين ہوتی ہے۔ آر د كرسنہ شہد كے ساتھ سينہ سے اخراج مادہ ميں معاون ہے۔ (جالينوس) كبريت كى دهونى ربوميں مفيد ہے۔ بيضہ كے ساتھ اسے چانا جائے توسينہ كى پيپ كاسر عت اخراج كرديق ب(جالينوس) زیرہ کوسرکہ میں ملاکر عشر انتهاب میں استعمال کرنا مفید ہے۔ مخم کرفس مسمی بہ سمرنیون عسر تنفس میں مفیدہے۔ کراث شامی ماءالشعیر کے ساتھ لکا کر پینے سے سینہ کی رطوبتوں کا اخراج ہوجاتا ے-(دیاسقوریدوس) ماء الشعير كے ساتھ اس كاجوشاندہ سينہ كے اندر پيدا ہونے والے غليظ بلغم كو تخليل كرديتا ے\_(ابن ماسوبی) روغن بادام تلخ ربومیں مفید ہے۔ بادام تلخ سینہ اور پھھیرے سے اخلاط غلیظہ کو خارج کرتا ب-(دیاستوریدوس) بار تنگ ربو کے مریضوں کو کھانا موزوں ہے (جالینوس) بخلوف الحيه انتفاب النفس ميس مفيد إ دياسقوريدوس) اے بھون کر شہد کے ساتھ استعال کرنے سے سینہ کی مزمن رطوبت کا اخراج بہ آسانی ہوتا ہے۔ مرکو کوٹ کر اور شہد کے ساتھ گوندھ کر استعال کرنے سے ایس حالت میں نفع ہوتا ہے جب كه مواد كانصاب سينه ير موتامو-(دياسقوريدوس)

انتهاب النفس میں باقلہ کے برابر مُر استعال کریں۔ (دیاستوریدوس)

ساھناہ ایک معروف دواہے جوربواور عرشف کے لئے مفیدے (دیاسقوریدوس)

ر بومیں سندروس کھلائی جاتی ہے۔ (دیاسقوریدوس)

عصار ہُسفر جل (بہی) ربو میں مفید ہے۔ بیخ سوس آسا بخونی، اخلاط کے اخراج میں معاون ہے۔ جو زالسر تازہ کوٹ کرشر اب کے ساتھ استعال کر تاربو میں مفید ہے۔ (دیاستوریدوس) سجنج سینہ کے غلیظ فضلات کااز الہ کردیتی ہے۔ ساسالیوس کا تخم اور جڑدونوں انتصاب النفس

میں مفیدے۔(دیاسقوریدوس)

نیخ ساسالیوس اقر یطشی شہد کے ساتھ بطور لعوق استعال کرنے سے سینہ کے فضلات نہایت تیزی سے خارج ہوجاتے ہیں۔(دیاسقوریدوس)

ساسالیوس انتصاب النفس میں مفید ہے اور سعلہ کی دھونی ربو میں مفید ہے۔ سعد ربو میں مفید ہے۔ (دیاسقوریدوس)

سداب تازہ اور سویا خشک کا جو شاندہ در دسینہ اور عسر تنفس کے لئے عدہ ہے۔ (بولس) عناب ربو میں مفید ہے (دیاسقوریدوس)

مولی ابال کر کھانار ہو اور سینہ کے اخلاط غلیظہ کے لئے عمدہ ہے۔ نتخ فاشر اشہد کے ساتھ ملاکر لعوق تیار کرتے ہیں۔ بیہ ر ہو میں مفید ہے فراسیون اخراج مادہ کے ذریعہ سینہ اور پھیپھڑے کا تنقیہ کردیتی ہے۔(دیاسقوریدوس)

بیخ نبات، بخور مریم ربو کے مریضوں کاشافی علاج ہے۔ پودینہ کاجوشاندہ ربو میں مفید ہے۔ پودینہ کھانسی لاکر پھیپھرمے اور سینہ ہے اخلاظ غلیظہ کو خارج کر دیتا ہے۔ عصارہ کپودینہ خنیق النفس میں صحت بخش ہے۔ (جالینوس)

قیسوم کامشروب اور اے کوٹ کر استعمال کرنے سے انتصاب النفس میں فائدہ ہو تاہے۔ (دیاستوریدوس و جالینوس)

تنطور یون کبیر کے گرام شراب کے ساتھ پینا کمزروی میں مفید ہے۔اس کی جڑ ضیق النفس میں نافع ہے۔قنہ ضیق النفس کے لئے عمدہ ہے۔(دیاسقور بیروس) سات شرب کریہ احمد لطور لعد قریاستوال کہ دعمہ سنفس میں مفرسید کردیاستوں کا ساتھ میں دیاستا

راس شہدے ساتھ بطور لعوق استعال کرناعس منف میں مفید ہے۔ (دیاسقوریدوس)

اخلاط غلیظہ کے اخراج کے لئے مفید لعو قات میں راس شامل کر دینا مفید ہے۔ (جالینوس) زفت ترربو میں مفید ہے (دیاسقوریدوس)

اس کے لعوق کی مقدار ہمراہ شہد ۵۰ گرام ہے۔ (دیاستوریدوس و جالینوس)
قضم قرایش سینہ کے اخراج مادہ کے لئے مفید ہے۔ ذنب الحیل ضیق النفس میں مفید ہے۔
تافیا فضلات کے اخراج میں مددگار ہے۔ انجیر خشک اخراج فضلات کے لئے عمدہ ہے۔ زوفا کے
ساتھ پکا کر پیتے ہیں تو فضلات صاف ہو جاتے ہیں۔ زبیب الجیل، ضیق النفس میں مفید ہے۔ رئة
الشعلب (لومڑی کا پھیپھوا) خشک کر کے پینے سے ربو میں فائدہ ہو تا ہے۔ شہد کے ساتھ اس کا
لعوق ربواور عرشفس میں مفید ہے۔ فاریقون کے گرام کامشر وب ربو میں مفید ہے۔ سرکہ چا ٹنا ایے
عرشفس کے لئے موافق ہے جس میں مریض سینہ کھڑ اکر نے پر مجبور ہو جا تا ہے۔
(دیاستوریدوس)

#### سینہ اور پھیپھرسے کو صاف کرنے والی ادویات:

تخم انجرہ، تخم گذر جنگلی، تخم خشخاش سیاہ، تخم کتان، حاشا، تخم مولی، ملی کا کھانا، خردل، انیسون، قردمانا، تخم قثاء، تخم فریزہ، شونیز، برگ سداب، جعدہ، حب الغار، برگ غار، پوست سلجے، دار چینی، قسط تلخ، قسط شیری، جماما، سنبل الطیب، پوست بیج کبر، بصل الفار، بادام تلخ، شراب شری، بیج سوس، جند بید ستر، رشنه، ثمر طرفاء، ثمر صنوبر، ماءالعسل، رشج، قبصوم، مقل یهود، صمغ انجدان، فراسیون، جاوشیر، زبیب شیری گھٹلی نکالا ہوا، پودینہ نبری، زراو ند طویل، زراو ند مدحرج، قند، عصارہ فراسیون، نخ پودینہ، قنطور یون، موم، علک الا نباط، حب عرعر، اسطوخودوس، انجیر خشک، اصل السوس، کراث شامی، کوٹے ہوئے جو کے ساتھ بچا ہوا۔ قردمانا۔ عصارہ چقندر، انڈے کا مغز۔ ان سب دواؤل کو چاٹنا سید بچھپھرہ نے پرانی کھانی، سینہ اور تجاب کے بچوڑوں کیلئے مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

### عشفس کے لئے مفیدادویات:

روغن بلسال ساڑھے تین گرام ، عرق انجیر ۱۰۰ گرام کے ساتھ استعال کریں۔ حب بلسال ، یا عود بلسال یاہر ایک ڈھائی گرام کھولائے ہوئے شکر کے پانی کے ساتھ لیں۔ ر بو میں رئة الفحلب خشک کر کے اور چھان کر ساڑھے تین گرام انجیر کے جوشاندہ میں پلائیں۔ اورای کازیر باجہ (۱) بڑھے مرغ کے گوشت کے ساتھ جیسے سویا، پودینہ اور آب لبلاب ہمراہ لباب قرهم يكاليا كيابو، كحلائيں-

# ر بو، بہر، اور سینہ کی لیسدار رطوبت کے لئے:

رئة المعلب 2گرام ختك، عرق انجير مين كوث كراستعال كريں\_(ابن ماسويه) بحت الصوت کے بغیر عشنفس ہو تو یہ بیوست کی علامت ہے۔اور بحت الصوت موجود ہو تو ر طوبت کا نتیجہ ہو تا ہے۔ ساتھ میں بخار بھی ہو تو پھیپھرایا بعض آلات تنفس کے قریب کوئی ورم حار موجود ہو گا۔(ابن کجلاح)

مر دار سنگ، زریج سرخ اچھی طرح کوٹ کر انڈے کی زردی کے ساتھ ایک نے کتانی مکڑے پر طلاء کریں اور اسے بھگو کر محفوظ کرلیں پھر اس میں ہے ایک مکڑا کاٹ کر مریتان اور قیف کے ذریعہ و هونی دیں اور مریض کے منہ میں اے گھماتے رہیں۔ ۲۱ دن میں اس سے مکمل صحت ہوجائے گی۔

# تنفس اور سخت باننے میں:

عصارہ ٔ اشقیل ، شہد ہم وزن ، شہد کا جھاگ ا تارلیں ، حتی کم جم جائے پھر استعال کریں۔ (طبيب نامعلوم)

تنفس جو د باؤڈ ال کر اور سخت جد و جہدے ہو تاہے وہ یا تو سخت کام کرنے کی وجہ ہے ہو تاہے یا اس وفت ہوتا ہے جب دل کے اوپر آتشی سوزش ہوتی ہے ، پاراستہ میں کوئی سدہ حائل ہو جاتا ہے یا ورم کے باعث یاعضلاتی طاقت کے کمزور ہوجانے سے ایس حالت پیش آتی ہے۔

# ضیق تنفس سے تین بیار یوں کا پتہ چلتا ہے:

ورم حارد موی\_ ہوائی نالیوں کا تنگ ہو جانا۔

(1)زیر باجید-سرکہ اور خٹک کھلول سے تیار کروہ شور باجے زعفران کے ذریعہ خوشبودار کرلیا گیا ہوادراس میں زیرہ جیسی چز ڈال دی تی ہو نیر کھ شریں چزوں کے ذریعہ میضا کرلیا گیا ہو۔ سے قوت تنفس کی کمزوری۔ ورم کی علامت نبض سے پیچانی جائے گا۔ تنفس عظیم ہو گا۔ سینہ اور چپرہ پر سر خی ہو گا، پیاس ہو گی،مریض سر د ہواکی خواہش کرے گا۔

آلات تنفس کی تنگی میں اگر کیفیت حلق کے اندر ہے تو مقامات کی حرارت معلوم ہوگ۔ خبر ہ کے اندر ہے تو خلکے جلکے درد ہے اس کا اندازہ ہوگا۔ بینہ کے اندر ہے تو خلکے جلکے درد ہے اس کا اندازہ ہوگا۔ پھیپھڑے کے اندر ہے تو پھیپھڑے کے گوشت میں ہونے کی صورت میں ضیق تنفس کے ساتھ ثقل اور تناؤ ہوگااور پھیپھڑے کے غضر وفول میں ہے تواس سے ایک در داشھے گاجس سے کھانسی آئے گی۔

ضیق تنفس بھی ایسی چوٹ سے پیدا ہو جاتا ہے جو چٹے مہرے پر پڑتی ہے کیونکہ تنفس کا عصبہ برین

یبیں سے تکلتا ہے۔

ضیق تنفس اگر حجزہ کی وجہ ہے ہے تو اس کے ساتھ خناق ہوگا۔ پھیچر ہے کے اندراگر ہو تو سے الرک کے شعبوں میں ہونے کی صورت میں کھانسی کی تحریک ہوگ۔ بالکل اسی طرح جس طرح انتصاب نفس ہوتا ہے۔ پھیپے مرے کی شریانوں میں ہونے کی صورت میں جیسا کہ ربوکی حالت میں پیش آتا ہے اسے آپ نبض مختلف ہے پیچان سکیس کے ۔نفس پھیپے مرے کے اندر ہے تو سانس میں گرم ہوا خارج ہوگی اور تنفس سر لیع متواتر ہوگا۔

# ضيق تنفس كى قتمين جارين:

ا۔ ایساعظیم متوارجواختلاط ذہن کی علامت ہے۔ ۲۔ ایساعظیم متوارجو در دکی علامت ہے۔ (جالینوس)

ضیق تنفس کبھی سینہ کی تنگی اور سینہ کے کم پھیلنے یا پھیپھڑوے کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ پیدائش ہو تاہے اس کا دوائی علاج تا ممکن ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ مریض ہمیشہ ٹھنڈی ہواکھینچے۔ تاکہ تھوڑی ہوازیادہ ہوا کے قائم مقام ہوسکے۔ اس طرح دل کوروح بہو پچ سکے گی۔ورنہ دل کامزاج گرم ہوجائے گااور نتیجہ میں اختلاج ہونے گئے گا۔ (مؤلف)

#### ملطف تدبير:

گرم شیریں ریحانی شراب، امراض سینه و پھیپر سے لئے بیحد افادیت کی حامل ہے۔ بشر طیکہ

بخار اور دروس نہ ہو۔ بالخصوص جب کہ تے اور اسہال کے ذریعہ سطیہ کی ضرورت ہو کیونکہ جس رطوبت کا اخراج مطلوب ہو تاہے اس کے لئے صرف بہی ضروری نہیں کہ اسے توڑ دیا جائے بلکہ اعتدال کے ساتھ ترطیب (ترکرنا) اور سخین (گری بہونچانا) کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ نہ کورہ شراب کے اندر بیا اثر موجود ہے کیونکہ خشک حالت میں زیادہ مقدار کے اندر جو چیز خارجی ہوگی اس میں شدید بیجان ہوگا جس کا سرایت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایس حالت میں بعض اعضاء کا بھٹ جانا ممکن ہے بلکہ بھٹے بغیر نہیں رہ سے اس بیاری کے اندر شراب ایسی نہ ہوجو اصلاً تا بفن ہو۔ ملطف ادویات کے ساتھ استعال کی گئی تو میرے خیال میں نہ کورہ شراب سینہ کو صاف کردے گی۔ (جالینوس) نے ایک اس میں در ہو جو ایک اس سے در ہو بھی ہوتا ہے جو ایک ساتھ اعضاء میں ورم پیدا ہوجائے ہے۔ رہو تحلیل ہوجائے گا۔ اس سے در ہو بھی ہوتا ہے جو ایک

نجلے اعضاء میں ورم پیدا ہوجانے ہے ربو تحلیل ہوجائے گا۔ای ہے ربو بھی ہوتا ہے جوایک تیفن کانام ہے۔وبیابی جیساحالت نزع میں مرنے والے کا تنفس ہوتا ہے۔انتقاب النفس میہ ہے کہ مریض سوئے توگلا گھٹ جانے کااندیشہ ہے۔لہذاوہ بعجلت کھڑا ہوجاتا ہے۔ بخار ربو کوشفادیتا ہے۔
(جالینوس)

سینہ اور پھپچروے اعتدال کے ساتھ اخلاط کا استفراغ مطلوب ہو تو مریض کو مضطکی کے ساتھ مرچ دیں جسے وہ چبالے۔(جالینوس)

ند کورہ مریضوں کے لئے رقیق لطیف شراب مفید ہے۔اسے وہ کثیر مقدار میں لیس کیو نکہ اس طرح کی شراب کثرت سے پینے ہے جس چیز کواو پر چڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ او پر چڑھ جاتی ہے ۔ اس میں عصارہ عصل مفید ہے۔اس پر ہم وزن شہد ڈال کر پکائیں حتی کہ قوام حاصل ہو جائے اور ایک خوراک بقدر ۴ مگرام قبل از طعام اور بعد از طعام دیں یااسی ترکیب کے مطابق پو دینہ اور ایر سا ایک خوراک بقدر ۴ مگرام قبل از طعام اور بعد از طعام دیں یااسی ترکیب کے مطابق ہوتی ہے اس سے رب تیار کرلیس یہ بیاری بالجملہ گرمی پہونچائے بغیر اخلاط غلیظ کے از الہ کی مختاج ہوتی ہے اس لئے عصل اور سینجین محتصلی، موافق ہوگ۔ مگر قابض ادویات بیحد مخالف ہوں گی۔ شیم حنظل، عصار کا قائد المحار اس بیاری کی دواؤں میں داخل ہیں۔ شیم حنظل کاگرام ، اصل السوس ۹ گرام ، نیخ جاؤشیر ۹گرام ، شیخ ساڑھے چارگرام ، بورہ کاگرام ، بیانی کے ساتھ با قلی کے ماند گولیاں بنالیس۔اور چار گولیاں بنالیس۔اور چار گولیاں بنالیس۔اور چار گولیاں بلائیس۔ آدھے گھنٹہ کے بعد ماءالعسل ۲۵ ساتھ با قلی کے ماند گولیاں بنالیس۔اور چار گولیاں بلائیس۔

ویکر:

خردل۵. ۴گرام، نمک ۲.۲۵ گرام، قناء الحمار ۲۵ گرام، سات قرص بنائیں۔ ماء العسل کے ہمراہ ایک روز کاناغہ دے کر پلائیں۔ (جالینوس)

رئة النعلب تازہ را كہ ميں گوندھ كردھوپ ميں ركھ ديں۔ ١٨ گرام شہد كے ساتھ ہيں كراس ميں خالص شراب ١٣٠ گرام شامل كرليں۔ اور ربو كے مريض كو چاردن تك پلائيں۔ صحتياب ہو جائے گا۔ (اطہور سقس)

#### سينه سے غليظ فضلات خارج كرنے والا لعوق:

لعاب خردل سفید پر ہم وزن شہد ڈال کراس قدر پکائیں کہ لعوق ہو جائے اور استعمال کریں۔

# ورم حار صدر كى وجه سے لاحق شده سوء تنفس كيلئے:

ماءالشعير، شكر سفيد،اور آب كدووغيره كے ذريعه علاج كريں۔

# ضعف عضلات کی وجہ ہے جس میں سینہ پھیل جاتا ہے،

پیش آنے والے سوء تنفس کیلئے:

روغن نرگس، روغن سوس، رازقی جیسے روغنیات اور سلیجہ و سنبل جیسے مصالحہ جات کے ذریعہ علاج کریں۔ ند کورہ روغنیات کی قروطی بناکراس پر یہ مصالحہ جات چیزک دیں۔ اور اسے پہلو، سینہ، پشت کے مہرول اور گردن پر استعمال کریں۔ یہ اس طرح کا تنفس زیادہ تر ہو تا ہے۔ تاک کے دونوں سوراخ صرف حرکت کرتے ہیں۔ آب بابونہ، اور مر زنجوش سے تہمید بھی کریں۔ ورم حاریس سینہ پر برف کے پانی کی قروطی رکھیں۔ بیاری سر دہو تو روغن سوس کی قروطی استعمال کریں۔ سوء تنفس بیوست کا جیجہ ہو تو پہلے گرم پانی پھر بیبہ بط، موم اور روغن حل کے ذریعہ تہمید کریں اور رطوبت کے بوست کا جیجہ ہو تو پہلے گرم پانی پھر بیبہ بط، موم اور روغن حل کے ذریعہ تہمید کریں اور رطوبت کے باعث ہو تو ایسی دورھ اور فائیذ باعث ہو تو ایسی دورہ سوء تنفس بیو گرم پانی کے بحر نیا مفید ہے۔ سوء تنفس رطوبی مفید ہے۔ بردودت سے بیداشدہ سوء تنفس میں نیم گرم پانی کے بحر نیا مفید ہے۔ سوء تنفس رطوبی مفید ہے۔ اب سویا ۱۰ گرام ربو میں مفید ہے۔

# ادويات جو سخت گرمي پهونياتي بين:

کل عمصل ، بصل عمصل ، سلخبین عنصلی ، قیثور یعنی فینک ہمراہ بورہ بمکرالشراب (شراب کی اللہ عصل ) سوختہ ہمراہ نورستہ کلی اذخر اور زریخ ہمراہ فربیون بیحد مفید ہیں۔یا حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔ قیثور ۲ جزء ، بورہ یک جزء ، کوٹ مجھان کر روغن پر چھڑ کیس اور اتنا آمیز کریں کہ خون کی

طرح سرخ ہوجائے۔استعال کریں یا پیمیں بشر طیکہ اس سے کھانسی اور پیپ میں تسکین ہوگی۔اس سے بھی زیادہ مفید سے کہ طاقتور ادویات کے ذریعہ دائمی فائدہ حاصل کریں۔ مولی کے ذریعہ قئے کرائیں ایسے مر ہم رتھیں جو سینہ کوسرخ کردیں اور بیپ کوجذب کریں۔

ر بومیں مفید زراو ندمد حرج کامشروب ہمراہ آب، پیخ قنطور یون اکبر، حب سقولو قندر یون، بیخ سقولو قندر یون، بیخ سقولو قندر یون، بیخ سقولو قندر یون، بیخ سقولو قندر یون، شونیز، پانی کے گھڑول کے بیدا ہونے والے کیڑے، ان کیڑول کو مٹی کے برتن میں رکھ دیں حتی کہ انڈے دے دیں، پھران کے ساتھ شہد ملاکر یکا ئیں اور قبل از طعام و بعد از طعام ۲-۲ جمجے دیں۔ (جالینوس)

تخ قطور ایون کبیز ماء العمل کے ساتھ پکاکر بینایا ایر سایا فراسیون کا مشروب بیحد مفید ہے۔ رابو نام ہے تفس کے کھڑے ہونے کا۔ مریف اس بیاری میں (تنفس کو) کھڑا کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ بستر سے سینہ کے جو مقامات ملے ہوتے ہیں مریف انہیں بلند رکھتا ہے۔ رابو کے مریفوں کو جو سوء تنفس لاحق ہوتا ہوتا ہی بیپ ہوتی ہا اور تنفس لاحق ہوتا ہوتا ہی بیپ ہوتی ہا اور جن کے سینوں میں بیپ ہوتی ہا اور جن کے بیپیوٹرے متورم ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح کا سوء تنفس، آلات تنفس میں تنگی پیدا ہوجانے ہوتی کے لاحق ہوا کرتا ہے۔ ربو در حقیقت وہ حالت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیپیوٹرے کے شعبوں میں بیٹرت لیسدار رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی وجہ بیپیوٹرے کے اندر ہوا کا بیر ہوتا رک جاتا ہے بیٹر کا ایک ملطف اور قاطح او ویات کے ذریعہ ہوتا ہے جو نمایاں طور پر گری نہ پیدا کرتی ہوں۔ ربو کے مائے در اوند مد حرج کا مشروب ہے۔ نخ قنطور یوں اور عصارہ قنطور یون کا مشروب مفید ہے۔ زفت ساتھ زراو ندمد حرج کا مشروب ہے۔ نخ قنطور یوں اور عصارہ قنطور یون کا مشروب مفید ہے۔ زفت تر مفید ہے۔ رونا، سوس، بیانی کے گھڑوں کے گئر دوں کے گئرے در بو میں مفید ہیں۔ مناسب سے ہے کہ ان کیڑوں کو آگ پر اتنا بھون دیں کہ سفید ہیں جو جائیں بیر انہیں ہیں کر شہد میں ملائیں اور جوش دے کہ ان کیڑوں کو آگ پر اتنا بھون دیں کہ سفید ہو جائیں بیر انہیں ہیں کر شہد میں ملائیں اور جوش دے کہ ان کیڑوں کو آگ پر اتنا بھون دیں کہ سفید ہو جائیں بیر انہیں ہیں کر شہد میں ملائیں اور جوش دے کہ ان کیڑوں کو آگ پر اتنا بھون دیں کہ سفید

#### ربو کے لئے:

عصارہ عصل، شہد ہم وزن، انگارے پر جوش دے کر گاڑھا کرلیں قبل از طعام وبعد از طعام استعال کریں۔(دیاسقوریدوس) بہر کاعلاج ہے ہے کہ قاطع ادویات کے ذریعہ لیسد ار خلط کو فنا کر دیاجائے۔سرے عصل، سیجبین عنصلی، عصل مشوی، شہد کے ساتھ استعال کرنا مفید ہے ایارج اور ادویہ مسہلہ کے ذریعہ مسلسل اسہال، مولی اور سخبین کے ذریعہ سے کرانا مفید ہے۔ زراو ندید حرج، قنطور یون کبیر، تخم پو دینہ، زوفا ایر سا، شونیز، پانے کے گھڑوں کے بنچ کا کیڑا، ان سب کامشروب بھی مفید ہے فصد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے فصد کھولیں۔ حقنہ دیں، خارج سینہ پر انجیر آر داصل السوس، آر د جو، اور علک بطم کا صادر کھیں، ضاد کے اوپر آر د سوس، روغن سد اب اور روغن شبث چھڑک بھی دیں۔

#### روغنیات کے ساتھ استعال کی جانے والی دوا:

قیشور ۱۳ اگرام، در دشر اب کے سوختہ ۱۳ گرام، زریج کی جزء، نورستہ کلی اذخر ۲ جزء، فریون کی جزء، بورہ ۲ جزء کوٹ کرروغن میں پیسیں اور سینہ کے متصل مالش کریں وہ صادات بھی مستعمل ہیں جو آئی فضلات کو جذب کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

#### ربو کے لئے:

جعدہ، شیح ارمنی، کما فیطوس، اشق، جند بیدستر، ہم وزن، جھاگ اتارے ہوئے شہد میں گوندھ کراستعال کریں۔شربت شہد ۹۰اگرام کے ساتھ ایک چمچے بورہ بھی مریضوں کو دیاجا تاہے۔ دیگر،بورہ ۳۲سگرام، فلفل ڈھائی گرام، محروث ۲۱گرام، پانی کے ساتھ ایک چمچے دیں۔

#### , گير

خردل ساڑھے تین گرام ، بورہ ۲۰۲۰ گرام ، قناء الحمار ، ۲۵ ملی گرام سب کی آٹھ نکیال بنالیس۔ دو نکیال دن کے شروع میں استعال کریں ، اس سے فضلات اوپر سے خارج ہوجائیں گے اور بغیر کسی تکلیف سے تنقیہ ہوجائے گا۔ مرض اس حد تک بڑھ چکا ہو کہ اختتاق کی حالت پیدا ہوگئی ہو تو ۱۳ گرام بورہ ساڑھے تین گرام حرف ، پانی اور شہد ۱۹۰ گرام کے استعال کریں ، فوری افاقہ ہوگا۔ (بولس) حرارت ، التہاب اور پیاس کی موجود گی میں خیش شخص ہو تو بنفشہ مربی ، جھاگ اسپغول اور ماء الشعیر استعال کریں ، روغن بنفشہ اور موم سفید سے سینہ کی تمریخ (نری سے مالش) کریں ۔ خیش تنفس برودت کے ساتھ ہو تو تخم کتال ، حلبہ ، بادیان ، نیچ کرفس ، اور انجیر کوجوش دے کر پکائیں اور پلائیس بیاری زیادہ یبوست کے ساتھ ہو تو سب سے عمدہ علاج ہے کہ تھوڑے شہد کے ساتھ دودھ استعال کریں اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں لیں۔ روغن نرگس وبابونہ سے سینہ کی تمریخ کریں ، اور استعال کریں اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں لیں۔ روغن نرگس وبابونہ سے سینہ کی تمریخ کریں ، اور

35

حسب ذیل جو شانده نوش کریں۔ بیحد مفید ہے۔ حلبہ ،اور مویز منقی کو آب بارال میں جو ش دیں اور ۵۰ اگر ام نیم گرم استعمال کریں۔ (طبیب نا معلوم)

#### مفروات:

پچھ لوگ ضیق تنفس میں الو کاخون پلاتے ہیں پچھ اطباء الو کو اسفید باخ کھلاتے ہیں۔ پھراس کا خون شراب میں پڑکا کر پلاتے ہیں گر ضیق تنفس کی کوئی بھی قتم ہواس میں خون نہیں پلایا جاتا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ اس خون سے ضیق تنفس کا از الہ نہیں ہوتا۔ ربود راصل ایسی خلط غلیظ سے پیدا ہوتا ہے جو کھانی جو قصبة الرئے کے شعبول کو مسدود کر دیتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ اس خلط کا اخراج کیا جائے۔ جو کھانی کے ذریعہ ممکن ہے۔ اس کے لئے گرم دواکوئی بھی ہو ۱۰ گرام شہد کے ساتھ بار بار دی جائے ریاح کی وجہ سے جو ربو پیدا ہوتا ہے اس میں بابونہ اور مرز نجوش جیسی لطیف ادویہ کے جو شاندہ اور روغن کی وجہ سے جو ربو پیدا ہوتا ہے اس میں بابونہ اور مرز نجوش جیسی لطیف ادویہ کے جو شاندہ اور روغن شرہ روغن غار ، روغن غار ، روغن سار وغن سداب سے سینہ کی تھمید کریں، مریض کو شجر بنااور قفر دیں، سیمنے بیجو شیر ، ساڑھ چارگرام پلا میں قصبہ الریہ میں غلیظ رطوبت کے باعث ربو ہو تو مخرج اور منقی دوائیں استعال کریں۔ سوء تنفس اور ربوکی یہی قسمیں ہیں، یعنی یہ حالت حرار سے ، برود سے ، رطوبت ، بیوست ریاح، ضعف عضلات ، یا قصبة الرئے کی امتلائی کیفیت سے پیدا ہواکرتی ہے۔

#### ربوكے لئے بحرب جوشاندہ:

مویز منقی، طبہ مغول، بارش کے پانی میں جوش دیں، نرم آنج پراس حد تک جوش دیں کہ سرخ ہو جائے بعداز آل چھان کرروزانہ ۸۰ گرام پلائیں۔ کرشمہ نظر آئے گا۔

بخار کے ساتھ تنفی مسلسل اور تیز ہو تواس بات کی علامت ہے کہ پھیپوٹ کے اندرورم حار موجو دہ ہو تواس کا مطلب بیہ ہے کہ سینہ قصبۃ الربیہ کے شعبوں میں غیر طبعی سرد غلاظت، یالیسد اررطوبت موجو دہ۔ قصبۃ الربیہ ہا ہم اس کی فضاء محیط میں بیہ کیفیت ہو تو کھائسی کی عدم موجو دگی میں پھیپوٹ کے اندر تجھی جائے گی۔

کی عدم موجو دگی میں پھیپوٹ سے باہر اور موجو دگی میں پھیپوٹ کے اندر تجھی جائے گی۔

کی عدم موجو دگی میں بھیپوٹ سے باہر اور موجو دگی میں پھیپوٹ سے اندر تجھی جائے گی۔

ہمیپوٹ اور اس کے اردگر دکی فضاء میں جورطوبت بہتی ہو وہیا توسر سے آتی ہے یاسینہ سے سرے آر ہی ہو تواسے سینہ کی کارروائی سرے آر ہی ہو تواسے سینہ کی کارروائی تصور کی جائے گی۔ طبق کے اندر آواز در حقیقت ایک ایسی ریاح سے پیدا ہوتی ہو جورطوبت کوڈھکیلتی تصور کی جائے گی۔ طبق کے اندر آواز در حقیقت ایک ایسی ریاح سے پیدا ہوتی ہے جورطوبت کوڈھکیلتی

ہے رطوبت ہنتی ہے توریاح خارج ہوتی ہے اور رطوبت کے اندر سے ہو کر گزرتی ہے۔ رطوبت شدت کے ساتھ اے روکتی ہے چنانچہ آواز پیداہو جاتی ہے۔ (جالینوس)

سخت نزع کی حالت میں جس طرح کانفس ہوتا ہے ای طرح کانفس ہوتو یہ ربو ہے۔انتهاب النفس اس کی ایک قتم ہے۔ پھیپھڑے سے فضلات غلیظہ کو متحلیل کرنے والی ادویات کے ذریعہ علاج کیا جاتا ہے۔ یہ دوائیں وہ ہوتی ہیں جو اعتدال کے ساتھ سینہ کے اندر گرمی پہونچاتی ہیں ملطف تدبیر، ریاضت اور مالش کی دواؤل سے کام لیا جاسکتا ہے۔ کھر درے رومالول سے مالش کریں۔ روغن کے قریب نہ جائیں حمام کے اندر نظر ون وغیرہ ہے مالش کریں۔شروع میں ہلکی اور آخر میں سخت ورزش کرائیں سخت ریاضت شروع میں ربو کی تحریک پیدا کردیتی ہے۔ ریاضت کے بعد غذادیں۔ حمام ہے بالخصوص سر مامیں روک دیں۔ نیزتمام مرطوبت غذاؤں سے خواہ گرم کیوں نہ ہوں بھی پر ہیز کرائیں۔روٹی کے اندر شونیز،زیرہ، نانخواہ اورر شاد جیسے ملطقت بیج ڈال دیں۔ پر انی تمکین مجھلی، مولی، صعتر ، پودینہ جنگلی اور خشک اور دیلے جانوروں کے گوشت دیں۔ دانوں سے پر ہیز کرائیں کیونکہ بیہ نفاخ ہوتے ہیں اور ربو کی تحریک کرتے ہیں۔ یرانی ریحانی شراب، اور ماء العسل پلائیں۔ سب سے بہتریہ ہے کہ کھانے کے بعد نہ پیئیں، کچھ دیر رکیں، پیاس برداشت کریں اور تھوڑا تھوڑا کی بار میں اپنے تھوڑی تھوڑی لینی جائے کیونکہ لمبی نیند مریض تو کا صحتندوں کے اندر بھی ضیق تنفس پیدا کرتی ہے۔ کھانے کے بعد اور دن میں ہر گز سونے نہ دیں۔ دن میں غذانہ لی ہواور مریض تھا ہو تو غذاہے پیشتر تھوڑاسو لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔خیال رہے کہ دن میں ایک یاد وبار مریضوں کو اجابت ضرور ہو تاکٹ عم میں اعتدال کے ساتھ نرمی آجائے۔ تلتین طبع کے لئے موزوں یہ ہے کہ بدِ ہے مرغ، قرطم، چقندر، کبرنمکین،اور پرانی طریخ (ایک قتم کی مچھلی) کاجو شاندہ دیا جائے۔اس سے شکم میں اعتدال کے ساتھ اور کسی تکلیف کے بغیر نرمی پیدا ہو جائے گی۔ان چیز وں کو قبل از غذادیں۔ ان سے شکم نرم نہ ہوسکے تو ماء الشعیر میں تھوڑی فربیوں شامل کر کے دیں۔ حرارت کے پہلو سے مریضوں کو فائدہ ہو گا۔افتیون 2 گرام کااستعال مٹنج کے ساتھ اس بیاری کے اندر عجیب الاثر ہے۔ سینہ پر روغن سوسن، روغن غار، تھوڑی موم کے ساتھ ملکی مالش کریں۔ موم اس لئے تاکہ سینہ پر باقی رہے۔روزانہ ۲گرام زراو ندید حرج ہمراہ آب تازہ یا سکینیج ۳گرام ہمراہ آب سداب معصور دیں۔ انگور سیاہ اور نورستہ کلی تیصوم مفید ہیں۔ یا تخم انجرہ کوسر کہ میں ایک دن بھگو کر استعمال کریں۔ حب رشاد ساڑھے تین گرام ہمراہ روغن بادام پلائیں۔لعوق عنصل دیں، حب الغار ہمراہ آب یافیثون یا

تنطور یون غلیظ کا جوشاندہ بیاری کے شروع میں دیں۔ آخر میں تنطور یون رقیق دیں جاہیں تو تنطوریون شہد کے ساتھ چٹائیں۔ ند کورہ داؤل سے زیادہ مفیدیہ ہے کہ زوفائے خٹک، فراسیون، ا ریسا، کماذ ریوس، جعدہ، حاشا، یو دینہ جنگلی کاجو شاندہ روغن حب صنوبر ، یار وغن بادام تلخ کے ساتھ دیں۔اس پر بھروسہ رتھیں، نہایت جیرت انگیز ہے۔ نباسبت (علک انبطم) تنہایا تھوڑی عاقر قرحا، بادروج اورائج کے ساتھ لگانامفید ہے جاوشیر اس بیاری میں سب سے زیادہ مفید ہے مگر احتیاط لازم ہے کیونکہ اعصاب کو ہرباد کر دیتی ہے دیگر ادویات بھی جو و قثاً فو قثاً دی جائیں۔اس کے دو فائدے ہیں ایک سے کہ طبیعت ایک دواکی عادی ہو جاتی ہے تو دوسری دواہے اسے فائدہ نہیں ہو تا کیونکہ سے دوا غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جڑی بوٹیاں در جات ہیں مختلف ہوتی ہیں چنانچہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دوازیادہ موافق اور مؤثر ثابت ہوجاتی ہے۔انتساب النفس میں سب سے زیادہ مفید خاص کر کھانے کے بعد مولی کے ذریعہ تئے کرنا ہے۔ مولی کے دریعہ تئے کرناعام دستور ہے اس کے ساتھ خربق بھی شامل کرلی جائے تواور زیادہ مفید ہوگا۔البتہ سینہ کے دردول میں سے خربق كاستعال مامحموب-اس سے محفوظ رہنا جا ہيں توجڑكے بجائے اوپرى حصہ لے كر پيس ليس اور پلائيس-مولی کے اندر خربق گرو کر شب وروز چھوڑ دیں۔ بعد از ال مولی کو استعال کریں۔ ضعف جسم کے باعث مریض نے کا متحمل نہ ہو تو تیز حقنہ استعال کریں۔ بیاری کے اندر سب ہے اچھی چیز یہ ہے کہ تثاء الحمار اور فربیون کے ذریعہ تنقیہ کریں فیثون اور غاریقون کو اس سلسلہ میں خصوصیت حاصل ہے۔ان کی گولیاں بنالیں اور مہینہ میں دویا تین بار اس کے ذریعہ ہمیشہ سھیہ کریں۔ غاریقون اورافیتمون کے ذریعہ ایک کثیر مخلوق صحتیاب ہو چکی ہے۔

#### ربو کے لئے حب کانسخہ:

غاریقون ساڑھے دس گرام ،ایر سا ساڑھے دس گرام ، فربیون ساڑھے دس گرام ، خخم انجرہ ساڑھے تین گرام ،تر بدمحکوک ۵،ایارج ۲۲، شخم حنظل کے گرام ،ازروت کے گرام ، بینج میں گولیاں بنالیس مقدار خوراک کے گرام ہمراہ آب نیم گرم۔

#### ربو کے لئے لعوق کا نسخہ:

عصل مشوی ساڑھے دس گرام ،ار ساساڑھے تین گرام ، فربیون ساڑھے تین گرام ، مر

ساڑھے تین گرام، زوفاء خشک کاگرام، زعفران ۷۵. اگرام شہد میں گوندہ کراستعال کریں۔ زعفران کواس میں سے بھینک دیناضروری ہے۔

#### ربوكے لئے:

حب الرشاد ساڑھے دس گرام بھسم (تل) + 2 گرام ، زوفائے خٹک ساڑھے ۲۴ گرام ، فانیند + 2 گرام ، کوٹ کراستعال کریں۔

#### لعوق طبه:

صلبہ کو تھوڑا جوش دے لیس پھر اسے چکنے انجیر کے ساتھ اس قدر جوش دیں کہ سب پختہ ہو جائیں، بعد ازال صاف کرکے شہد کے ساتھ گاڑھا بنالیں اور قبل از طعام دیں۔ بیاری کے اندر دوائے دواؤں کا اثر کم ہو تا ہے تو اس ہے گھبر ائیں نہیں کیونکہ ان کا اثر بکبارگی نہیں ہو تا۔ ایک دواہ دوسری دوائی جانب کشرت سے منتقل ہوتے رہیں، بشر طیکہ اسے مفید ترخیال کریں۔ زریخ اور کبریت ہم وزن کا بخور دیں انہیں پیہ گر دہ میں گوندھ کر قیف کے ذریعہ دھونی دیں، یامر، قسطا، سلجہ، زعفر ان اور لبنی ہم وزن کے کر گوندھ لیں اور اس کی دھونی دیں یا زریخ سرخ اور زراوند طویل کو تھی میں گوندھیں اور ایک گولی استعال کریں۔ (سر ابیون)

ر ہو گولمبی بیار یوں میں داخل ہے مگر صرع کی طرح اس کی بھی باریاں ہوتی ہیں اس بیاری کے اندر نبض کیسی ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہم نے باب النبض میں کر دیا ہے افتیون تنفس کو کھول دیتی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے اے باب المسبلہ میں دیجھیں۔

#### سخت ربو کے لئے:

تربد س، اصل السوس ۱۰، بنفشه ۵، ایر ساس، مختم انجره س، لب قرطم س، بیخ قناء الحمار س، حنظل س، غاریقون کے ساتھ جوش دیں ، اور حب منشااستعال کریں۔ (جالینوس)

#### بخور كانسخه:

زیتون سیاہ تخصلی سمیت، بمری کی چربی، خر گوش کی مینگنی،میعہ، زریخ، ہم وزن توت کے برابر۔ آر دجو، تخم سداب، زراو ند، زریخ ،انڈے کے گودے میں گوندھ کر بھی دھونی دیتے ہیں۔ (میح) زائد دواؤل کو بھی ضبط تحریر میں لاناضروری ہے۔ (مؤلف) لازم ہے کہ دھونی لینے والا ممکن حد تک دھونی کو برداشت کرسکے۔اس کی کوشش کریں۔ ایک ہفتہ دھونی دیں اور چکنے شور بہ کے ساتھ روٹی کھلا کیں،اس سے پرانی مز من کھانسی دور ہوجائے گی مریض اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لے۔ بھی روٹی شور بہ کے ساتھ ایک ہفتہ یا تھی اور شہد کے ساتھ حواری روٹی دیں۔

#### حسب ذيل ادويات بهي بين:

مر، قنطوریون، بڑگ نبق، پوست نبق، گائے کا گوبر، پوست صنوبر، پوست مر، قنه، پرانی کھانسی اور مز من بد بودار بلغم میں بیرسب مفید ہیں۔(مسیح)

زعفران ہے آلات خض کو تقویت اور خض میں بیجد سہولت ہوتی ہے۔عضلہ باسطہ صدر (سینہ کو پھیلانے والاعضلہ) کے اندر تشنج ہو جائے تو دوبار میں تنفس کو اندر لیجانا کمزور ہو جاتا ہے برعکس حالت میں برعکس صورت ہوتی ہے (حنین)

سو تنفس کی بیر ایک قتم ہے اس میں ماؤف عضلہ اور اس کی نالیوں کی تمریخ (ہلکی مالش) مفید ہوتی ہے۔(مؤلف)

ربوکی بیاری طویل ہوجاتی ہے تو مرگ کی طرح اس کی بھی تیز باریاں ہونے لگتی ہیں۔(جالینوس)

ضیق تنفس کی ایک قتم ر بونما ہوتی ہے جو عضلات صدر کے استر خاءیا تشخ کی وجہ ہے پیدا ہوتی ہے استر خائی صورت میں سوس، نرگس اور قبط جیسے گرم لطیف روغنیات اور ای طرح مرطوب اور خشک تشنج کی صورت میں روغنیات اور گرم پانی مفید ہیں۔ ر بوکی ایک صورت ریاحی ہوتی ہے اس میں جند بیدستر ، اشق ساڑھے تین گرام ماء العسل کے ساتھ پینا مفید ہے۔ بیحد مرطوب غلیظ ر بوکے اندر کبریت ، برگ سداب، مر ، افسنتین ، زراو ند ، شونیز ، خردل مفید ہیں۔ چنے کے برابر گولیال بنالیس اور صبح وشام ایک گولی استعال کریں۔

# دوسراباب

## نفث الدم، قئے الدم اور منہ سے خارج ہونے والے خون کی تمام قشمیں۔

باب المعدہ، باب السل، باب الدق، اور باب العلق میں جو پچھے بیان کیا جاچکا ہے اس کا اعادہ یہاں مناسب ہے۔ باب السل اور بالمعدہ کا مطالعہ کریں اور ضروری مباحث کو اس جگہ لائیں، نفث الدم اور سل کے بیانات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر انہیں الگ الگ بیان کرنا اس جگہ ہمارے پیش نظر ہے۔ عورت خون تھو کے اور دم طمثی میں بیجان پیدا ہو جائے تو خون کی تئے آجانے سے سکون

ہوجاتاہ۔

ینی وجہ ہے کہ ہم طبیعت کی پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ فصد کے ذریعہ خون کو مخالف جذب کرتے ہیں۔

پھیپھڑے ہے آنے والاخون تمام حالات میں زبدی (جھاگ دار) تہیں ہوتا، جھاگ دار تب ہی ہوتا ہے۔ تب ہی ہوتا ہے جب وہ پھیپھڑے کے جوہر سے بینی اس کے گوشت سے خارج ہوتا ہے۔ پھیپھڑے کی رگول سے خارج ہونے والاخون جھاگ دار نہیں ہوتا۔ بعض حالات کے اندر ذاب الجنب کے مریض بھی جھاگ دار خون نکالتے ہیں۔ پھیپھڑے کے مریض ان کے مقابلہ میں اس طرح کاخون کم تھوکتے ہیں، یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب ماؤف مقامات پر افراط کی حدت تک آتی حرارت موجود ہوجاتی ہے۔

جومریض بخار کی عدم موجودگی میں خون کی تئے کرے وہ محفوظ ہوتا ہے،اس کاعلاج قابض اشیاء ہے کردیں مگر جومریض بخار کی حالت میں خون کی تئے کرتا ہے وہ ردی ہوتا ہے۔ پچھ لوگوں کا قول ہے کہ یہاں مراد کھانسی کی تئے ہے مگریہ غلط ہے کیونکہ اس بات کا برحق ہوتا سیجے نہیں ہے کہ

جس مریض کو نفث الدم کی شکایت رہی ہو اور صحتیاب ہو گیا ہو اور سینہ کی بیر کیفیت ہو کہ اجتماع خون کی وجہ سے اس کی رگول کا برباد ہو جانا آسان ہو تو موسم بہار میں اس کی فصد بعجلت کھول دیں۔ خواہ امتلائی علامات موجود نہ ہوں ایسا کرنا مریض کی حفاظت صحت کے پیش نظر ضروری ہے۔ (جالینوس)

۔ امتلائی علامات کے ظاہر ہوتے ہی فصد کھولناہر گزنہ بھولیں۔ بیہ وہی مریض ہوتے ہیں جن کے سینے تنگ ہوتے ہیں۔(مؤلف)

جس مریض کا سینہ تنگ ہو اور معمولی بیاری سے نفث الدم تیزی سے ہونے گئے تو صافن کی فصد کھول کر جسم کے نچلے حصول کی جانب خون کا امالہ کر دیں۔اس طرح اس کی صحت کی حفاظت کریں اور باسلین کی فصد کھولیں۔لازم ہے کہ باسلین کی فصد پہلے پھر صافن کی کھولیں۔بعد از ال مانع اور سینہ کو خشک کرنے والی دوائیں پلائیں۔(مؤلف)

نفٹ الدم کے لئے مستعد اوروہ مریض جن کے سینوں اور پھیپر وں سے خون آچکا ہو اور صحتیاب ہو بھیے طاہری اسباب سے محفوظ صحتیاب ہو بچے ہوں انہیں مزلوں، امتلاء دموی اور شوروہنگامہ جیسے ظاہری اسباب سے محفوظ رکھیں۔ان تینوں باتوں سے ان کی صحت کی حفاظت ہوگی۔(مؤلف)

اگر کسی مریض کے بعض اعضاء کاجوڑ خاص کر سینہ خراب ہو تو فور اُفصد کھول دیں۔ کوئی شخص خون تھو کتا ہو تو دراصل وہ پیپ تھو کتا ہو تا ہے۔ پیپ کا تھو کناا چانک بند ہو جائے تو مریض مرجائے گا۔

مجھی آدمی کے مقعد میں بواسر ہوتی ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً خون تھو کتار ہتا ہے، اس سے اس فائدہ

ہوتا ہے۔اس طرح کے مریض ہمیشہ زر دہوتے ہیں۔

نفث الدم ریوی میں بھی اس فصدے نفع ہوتا ہے جس کے ذریعہ خون تھوڑا تھوڑا کی بار نکال دیا جائے۔ مریض کیے بعد دیگرے سرکہ جرعہ جرعہ لے۔ دیگر تمام تدبیریں بازواور پیروں کو باندھ کراور ماکش کرکے اختیار کریں۔ (جالینوس)

نفث الدم میں جوش دیا ہوادودھ مفید ہے کیونکہ یہ مفری ہو تاہے اور چیکتا ہے۔ گائے کا مکھن بھی مفید ہے کیونکہ قابض اور مبر دہو تاہے۔ای طرح سینہ قابض صادوں کا استعال بھی مفید ہے۔

## نفث الدم كے لئے ضاد:

اے سینہ پر رکھیں۔

صبر ، مر ، کندر ، قاقیا، دم الاخوین ، شیاف مامیثا ، جفت بلوط ، مازو نا پخته ، رامک ، عرق آس میں پیس کر سینه پر صاد کریں۔یاپوست انار خشک پیس کر سر که میں گوند حیس اور استعال کریں۔(اھر ن) قدرتی چیز ول میں ایک چیز میہ ہے کہ رجلہ چباکر نگل لیس تو نفث الدم فور أبند ہو جاتا ہے۔ (کندی)

سی رگ کے کٹ جانے سے نفٹ الدم ہو تو ایس صورت میں خون گاڑھاہوگا۔ بھی کی رگ کے کئے سے اور سقط، شور وہنگامہ اور ہوائے سر دکی وجہ سے نفٹ الدم ہو جایا کر تا ہے۔ بھی عروتی امتلاء، عروتی فساداور رگول کے کھل جانے سے نفٹ الدم ہو تا ہے۔ فساد عروق سے پیشتر چرپی چیز ول کا استعال، تیز نزلہ، اور رگول کے کھلنے سے پہلے امتلاء دموی اور مرطب تدبیر موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ نہ بخار ہوگانہ در د جیسا کہ فساد عروق میں ہو تا ہے بلکہ مریض یہال خون کے نکل جات ہے ساتھ میں ہو تا ہے بلکہ مریض یہال خون کے نکل جانے سے داور لذت محسوس کرتے ہیں، مائل بہ سفیدی جھاگ دار خون پھیچرہ سے جوخون سے اور غلیظ سیاہ خون سینہ ہے آتا ہے۔ بشر طیکہ ساتھ میں در دسینہ موجود ہو، پھیچرہ سے جوخون آتا ہے۔ وہ خون سینہ سے اور غلیظ سیاہ خون سینہ ہو تا ہے۔ اس طرح کے نفٹ الدم میں پہلے رشا پھر بخار مفید ہو تا ہے۔ اس طرح کے نفٹ الدم میں پہلے رشا پھر بخار مفید ہو تا ہو گئی ہو گئی اس کے بعدوہ سل کی وجہ سے فوت ہو گیا۔

جس مریض کو تھوڑی کھانسی اور ملکے جھاگ کے ساتھ بلغم آتا ہو تو ایسا قصبۃ الریہ ہے ہوتا ہے اور خون اگر ٹھوس اور سیاہ خارج ہور ہا ہو نیز سینہ کے اندر در دیجھی ہو تو بیاری کا تعلق سینہ ہے ہوتا ہے۔ 43

#### سينه كى جانب سرے انصباب نزله كاعلاج:

زلہ کی وجہ سے نفٹ الدم عارض ہو تورگ کی فصد فور اُکھول دیں البتہ بیحد تیز ہو توہا تھوں اور پیروں کو ہاند ھیں اور گرم روغن یاروغن قثاء الحمار کی الش کریں۔ کسیلی غذا کمیں دیں، قرص کہرہاء پلا میں، سر مونڈ دیں اور بیٹ کو ترصحر الّی سے تیار شدہ ضاد اسر تین گھنٹہ تک رکھیں پھر اتار لیں اور مریض کو تمام میں لیجا تیں۔ سر پر روغن نہ رکھیں، اس کے بعد کھانے میں شور بہ دیں ہوفت خواب تریاق دیں اور تمام جسم کی بلکے طور پر مالش کریں۔ سر کو مستقنی رکھیں، بیاری طول پکڑے توگدی پر تین قدین دیں اور تمام جسم کی بلکے طور پر مالش کریں۔ سر کو مستقنی رکھیں، بیاری طول پکڑے توگدی پر سیخنے لگا تیں۔ یہ بیاد کی وجہ بیخ لگا تیں۔ یہ بیاد اللہ م کا علاج یہ ہے کہ مریض کو کمبل اوڑھا تیں، گرم غذا تیں قابض غذاؤں کے ساتھ دیں۔ اقراض کہرہاء کے ساتھ دواء فلا فلی کھلا تیں۔ امتلاء و موی کے سبب پیدا شدہ نفٹ الدم میں فصد کھولیں۔ مریض کو سید ھے لٹائیں، انہیں سخت گفتگو کرنے سے روک دیں، مقام ماؤف پر سرکہ اور نیم گرم پانی کے اندر ڈبو کرا سفنج رکھیں، خون اگر کشت سے اور گاڑھا آر ہا ہو تو مسبب ذیل ضاد استعال کریں۔

#### ضاد:

ا قاقیا، پوست انار، مازو، سرکہ، بھی دانہ، اور کسیلی شراب، رجلہ کا کھانا مفید ہوتا ہے، سب سے زیادہ مؤثر عصار اُر جلہ ہے، گل مختوم بھی مفید ہے اور شاذنہ • کاءاگر ام لینا بھی مفید ہے۔ تاکل کے باعث پیداشدہ نفٹ الدم میں دواؤل کے ساتھ افیون بھی شامل کریں۔ قوت برداشت ہو تو چاردن تک کھانا ترک کرادیں، برداشت نہ ہوسکے تو آب سردے دھلی ہوئی روثی دیں۔ تالوے خون تھو کے میں ان کسیلی دواؤل کا غرغرہ کرائیں جورعاف میں مستعمل ہیں، اس قتم کا یہی علاج ہے۔ نفٹ الدم کے علاج میں علاق ہے۔ نفٹ الدم کے علاج میں عبل سے کام لیں کیونکہ تاخیر ہے ہلاکت ہوگی۔ نفٹ الدم مسلسل ہا تجام میں سکون ہوجائے تو وہی تدبیر اختیار کریں جو کمزوروں کے لئے سل لاحق ہوتا ہے۔ نفٹ الدم میں سکون ہوجائے تو وہی تدبیر اختیار کریں جو کمزوروں کے لئے کرتے ہیں مجھلی دیں، سوروں کی گوڈیاں اور بھیج کھلائیں، تمام جسم کی مالش کرائیں۔ کثرت حمام کرتے ہیں مخصد اور جماع ہے بازرکھیں۔ (بولس)

#### ديرو ثنيد:

تخم بنج، پوست بخ لفاح، كل بحيره، كندر، اقاقيا، تخم رجله، تخم بادروج، گلنار، كافور، قرص بناليس\_

مقدار خوراک کرام ، ہمراہ عرق بادروج ۱۹ گرام وعرق خرفیہ ۱۹ گرام۔ (مؤلف) تبھی نفث الدم گرمیا نمکین چیز کے کھانے ہے ہوجا تا ہے۔شدید غم اور کثرت روزہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ نکلنے والاخوٰن گوشت کے مانند تھکتے کی صورت ہو توابیاعفونت کی وجہ ہے ہو تا ہے۔ کثیر الغذاگرم کھانوں کے مسلسل استعال یا کسی گرم ملک و مقام میں داخل ہونے یا کثرت حمام سے نفث الدم ہواور تھوڑا تھوڑا ہو توالی حالت جورگول کے پھول جانے سے ہوتی ہے ضربہ کودنے پھاندنے ، بھاری بوجھ اٹھانے یا سخت ٹھنڈک کی وجہ ہے ہواور زیادہ آرہاہو تور گوں کے بھٹ جانے ہے ایسا ہو تاہے،زیادہ نکل رہا ہواور خون پتلا ہو، مائل بہ سیاہی ہو، جھاگ دار ہو، در دنہ ہو تا ہو توبہ پھیپیرے سے آرہا ہوتا ہے۔ سینہ میں در دہمی ہواور خون مائل بہ سیابی ہونہ تو جھاگ دار ہو، نہ زیادہ ہو تو سینہ سے آرہاہو تا ہے۔خون پھیپر سے کے اندر پیپ کی طرح داخل ہو تا ہے۔کھانسی کے بغیر خون قصبة الرئه سے آرہا ہو یعنی بلغم کے ذریعہ خارج ہورہا ہواور عروقی امتلاءے یہ کیفیت لاحق ہو توا کل کی فصد کھول کرخون تھوڑا تھوڑا کئی بار خارج کریں۔ یہ زیادہ بہتر ہے۔ صافن کی فصد اس میں بیحد مفید ہے،اس کے بعد مریض کوسر کہ اور گرم پانی جائے کی ہدایت کریں۔اس کے ماؤف مقامات دہل الخمیں گے اور جماہواخون صاف ہو جائے گا۔ مریض گفتگونہ کریں نہ زیادہ سانس لیں، غذا تیں بالفعل گرم نہ ہوں بلکہ مائل بہ برودت ہوں، رگوں کے پھولنے اور سھٹنے سے جن مریضوں کو بیہ حالت در پیش ہوانہیں قابض غذائیں کھانے کا حکم دیں متعفن قرحہ یاشگاف کی وجہ ہے جن مریضوں کی بیہ حالت ہوگئی ہو انہیں مغری غذائیں دیں، کوئی ایسی چیز نہ پیسیں جس کے اندر جلاء اور حدت اور چرچراین پایا جائے۔سر کہ مستشنی ہے۔ نفث الدم میں عصارہ رجلہ پلائیں یہ بیحد بلند دواہے اِسے کھلائیں بھی۔ پر سیاوشال تمام نفث الدم میں مفید ہے۔ای طرح عصی الراعی عرق بار تنگ بھی نافع ہے۔ حرارت نہ ہوتو عصار ۂ راس عصار ہ کراث اور سر کہ نفث الدم کوروک دیتے ہیں۔روغن آس، تھوڑی قابض شراب اور سرکہ کہ ساتھ قابض چیزوں کا صادر تھیں۔ نفث الدم کے ساتھ سلان شکم،یابے خوابی ہو تھوڑا قابض شراب پلائیں۔نفث الدم کے لئے حسب ذیل نسخہ عمرہ ہے: كندر 75.00 ملى كرام رب الآس ياعصارة انارك ساتھ سرمه كى طرح پيس ليس-يه عده اور مؤثرے (اسکندر)

. کندر ساڑھے دس گرام کوٹ پیس کر رب الآس ۵۰۔۳ گرام میں گوندھیں اور پلائیں۔یا بلوط اور کندر کاسفوف دیں یا حسب ذیل قرص استعمال کریں۔ طباشیر، گل مختوم ا قاقیا، کافور، عرق باد روج میں پلائیں۔ شب یمانی کا سفوف دیں۔ صحت ہوگی۔(مؤلف)

نف الدم عفونت کے سبب ہو تو قابض اشیاء استعال نہ کریں، بلکہ مغذی (تغذیہ بخش) اور معدل (تعدیل بیدا کرنے والی) چیزیں دیں، تاکہ عفونت اور اس کی حدت میں سکون ہو۔ رگول کو کافنے ہے اس وقت پر بیز کریں جب یہ دیکھیں کہ عفونت سے خارج ہونے والا خون زیادہ ہا بلخضوص جب کہ بیار دبلا اور نحیف ہو۔ سینہ خٹک ہو چکا ہو اور گوشت زائل ہو گیا ہو، الی صورت میں رگول کے کا شخنے سل ہو جائے گا۔ ماء الشعیر اور ملو خیاو غیر ہ دیں، سرکہ، نمک، اور بیاز وغیر ہیں رگول کے کا شخنے سل ہو جائے گا۔ ماء الشعیر اور ملو خیاو غیر ہ دیں، سرکہ، نمک، اور بیاز وغیر ہ کے قریب نہ جانے دیں۔ تیز نزلہ کے سبب پیداشدہ نفث الدم میں اس بات کے لئے کو مشش کریں کہ سرکہ اور روغن گل و آب سروکے ذریعہ سرکا مزاج سر داور مرطوب رہے۔ ایسا کرنے ہے گرم کرکام ٹوٹ جائے گا ور تیز نزلہ جاتارہے گا۔

نطول، ضاد، اور سر کے لئے سعوط بار د (ناک کے ذریعہ ٹھنڈک پہونچانا) کی برابر اور بھر پور کو شش کریں، بیار کو بنج، عنب الشحلب اور حی العام کے جو شاندہ کا غرغرہ کرائیں اور انہی ادویات کو روغن کے ساتھ سریرر کھیں۔

جالینوس پر جیزت ہے کہ اس راہ کے برعکس رویہ انہوں نے کس طرح اختیار کرلیا حتی کہ مریض کو نقصان پہونچ گیا۔ میں تواس کا تجربہ کرچکا ہوں۔ (بولس)

یہ بات محل نظر ہے۔ یہاں ایک غلطی ہے۔ تبدیل مزاج کے لئے سر کو مصنڈ اکریں گے تو بہ کثرت نزلے سینہ کی جانب اتریں گے۔اس کے بر عکس سر کوگر م رکھیں گے تو سینہ کی جانب کسی چیز کا انصباب ہر گزنہ ہوگا۔ (مؤلف)

جالینوس نے ند کورہ ند ہب کے بر عکس سر پرادویہ محرقہ (جلانے والی دوائیں) تک رکھی ہیں اور تریاق اور امر وساتک پلایا ہے۔ یہ ساری تدبیریں عفونت میں اضافہ کرتی ہیں۔ (بولس) یہ سفت تو بھی غلط ہے کیونکہ یہ ادویات عفونت کوروکتی ہیں ،ان سے سخت خشکی پیدا ہوتی ہے۔

بولس نے جن دواؤں کاذکر کیا ہان سے قرحہ کے اندر میل آتا ہے۔ (مؤلف)

نفث الدم كى بہت سارے مريضوں كو ميں نے شاذند كے ذريعہ صحتياب كيا ہے اسے پيس كر اس كا غبار ٥٠٠ و ٢٠ ملى گرام عرق انار يا عرق بر سان دارا (عصى الراعى) كے ہمراہ پلايا ، اى طرح پھيپير دے كے قرحوں كا بھى علاج كيا ہے۔ شاذنہ اسے ختک كرديتى ہے اس كااثر ديگر ادويات كے مقابلہ ميں زيادہ ہوتا ہے پھر كى طرح كا بيجان پيدا ہوتا ہے نہ كھانى آتى ہے۔ قصبة الرئد كے زخم بھى مقابلہ ميں زيادہ ہوتا ہے پھر كى طرح كا بيجان پيدا ہوتا ہے نہ كھانى آتى ہے۔ قصبة الرئد كے زخم بھى

اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ان مقامات کے اندر خشکی پیدا کرنے کے لئے دوا ہے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے (بولس)

یہ بیان اس لئے ہے تاکہ قرحہ ریوی کو خٹک کرنے والی ادویات کے باب میں جالینوس کی مخالفت کی جائے۔ مگر پیش کر دہ دواؤں کی قوت اس حد تک نہیں ہے کہ وہ جالینوس کی دواؤں کے مقابلہ میں اثر کرکے تعفن کوروک دیں۔(مؤلف)

شاذنه نه مل سکے توعلاج گل مختوم اور حجرار نبی ہے کریں۔

نزلہ ہارد ہواور بہہ کر آنے والی چیز خام ہارد ہو توالیی صورت میں مریض کو تریاق دیں۔ میں نے سرکے وسط میں داغ دیا ہے۔ جس سے مریض صحتیاب ہو گیا نزلہ جاتارہا کھانی میں سکون پیدا ہو گیا۔ نفث الدم کاہر مریض جماع، غصہ ، چیخ پکار، کرفس، صبر ، پرانے پنیر، شراب، دھوپ، گرم پانی اور گرم کھانوں سے پر ہیز کرے۔ دودھ پر گزارہ کرے، اسے غذا بنالے۔ تازہ مرطوب پنیر سے زیادہ مفید اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک ایسا شخص میرے علم میں ہے جو سال بھر سمید روثی کے ساتھ دودھ کھاتااور پیتارہا۔ شراب سے پر ہیز کیا چنانچہ قرحہ ریدسے صحتیاب ہو گیا۔ (بولس)

تے الدم کی ایک قتم شدید امتلاء سے پیدا ہوتی ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے ،مریض کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ایک طرح کا فضلہ ہوتا ہے جے طبیعت دفع کرتی ہے۔ مریض کے لئے ضروری ہے کہ وہ امتلاء سے بچے کیونکہ زیادہ ہو گیا اور طبیعت دفع نہ کرسکے تو اچانک موت طاری ہو جاتی ہے کیونکہ فضلہ سے قلب کے بطون مجر جاتے ہیں اور نبض رک جاتی ہے (قبط)

قصبة الرئد كے شعبول اور شريانوں كے در ميان كھے گذر گاہيں ہوتی ہيں جن سے بخارات گزرتے ہيں طبعی حالت ميں خون كا گذريبال سے نہيں ہو تا۔ يہ گذر گاہيں كى وقت كشادہ ہو جاتی ہيں تو قصبة الرئد ميں كھے خون آ جا تا ہے اور نفث الدم كى حالت پيدا ہو جاتی ہے۔

کھانسی آنے پر جھاگ دار خون خارج ہوتو یہ پھیپھڑے سے خارج ہوگا۔ جھاگ دار نہ ہوگاتو اس کا تعلق پھیپھڑے سے خارج ہوگا ہو کہ جھاگ دار خون پھیپھڑے کے گوشت میں کسی قرحہ کے ہونے سے لاحق ہوتا ہوتا ہونے والاجو خون جھاگ دار نہیں ہوتا وہ پھیپھڑے کی کسی رگ کے بھٹ جانے سے خارج ہوتا ہے۔ (جالینوس) کے بھٹ جانے سے خارج ہوتا ہے۔ (جالینوس)

پھیپھڑے اور سینہ ہے آنے والے خون کے در میان میں سیابی سے امتیاز کر تاہوں، خون سیاہ ہواور تھوڑا تھوڑا آئے تو یہ سینہ ہے آنے کی علامات ہیں (مؤلف) تحصیلہ شاہدہ معالم معال

تجربه اور مشاہدہ سے معلوم ہوا ہے کہ نفث الدم میں سرخ رنگ بیاری کو بڑھادیتا ہے۔ (جالیوس)

نفث الدم کے مریض کو دو دھ نہ پلائیں گے البتہ کمزور ہو تو پلا سکتے ہیں۔ کیونکہ دو دھ سے خون زیادہ ہو جاتا ہے اور مریض خون زیادہ تھو کئے لگتا ہے کیونکہ رگول کے اندر خون بھر جاتا ہے۔

ای طرح موٹا تازہ چربی والا مریض کھانتا ہے تو رطوبتیں تھوکتا ہے تو اس کے لئے بھی دودھ بہتر نہیں ہے کی خاندررطوبات بھر جاتی ہیں۔لہذاسل کے مریضوں کے لئے جو بیحد لاغر ہو بچے ہول، خٹک کھانسی میں اور خالص کر سوداء کے لئے دودھ موزوں ہے (مؤلف)

منہ سے خارج ہونے والاخون آلہ غذائی سے یا آلہ تنفس سے یاسر سے آتا ہے ، معدہ اور اس کے اردگر دسے آنے والاخون نے کی صورت میں ہو تاہے۔ (ابن سر ابیون)

اگرخون قریبی حصدے آرہاہے توقئے کی تحریک کے شروع بی میں معمولی حرکت سے خارج ہوگا۔ایسے بی آلہ تنفس سے آرہا ہوگا اور اس کا تعلق قریب سے ہوگا تو بلغم کے ذریعہ خارج ہوگا۔(مؤلف)

آلہ تنفس ہے آنے والاخون کھانی کے ذریعہ خارج ہوگا۔(ابن سر ابیون) اگر خون قریبی حصہ ہے آرہا ہے توقئے کی تحریک کے شر وع ہی میں معمولی حرکت ہے خارج ہوگا۔ ایسے ہی آلۂ تنفس سے آرہا ہوگا اور اس کا تعلق قریب سے ہوگا تو بلغم کے ذریعہ خارج ہوگا۔(مؤلف)

آلی تنفس ہے آنے والاخون کھانی کے ذریعہ خارج ہوگا۔ (ابن سر ابیون)

آلی تنفس میں خون کا تعلق جس فدر دورہے ہوگائی فدر سخت کھانسی بھی ہوگی۔ (مؤلف)

سرے آنے والاخون تالواوراس کے اردگر دے آتا ہے۔ یہ بلغم کے ذریعہ خارج ہوگا۔ سر

ے آنے کی حالت میں ام الر اُس کے اندر در دہوگا۔ (ابن سر ابیون)

اگر ایسانہ ہو تو در د تالواوراس کے اردگر دہوگا۔ (مؤلف)

آلی میں ہے آنے والاخون سینہ یا پھیچر سے آتا ہے۔ پھیچر سے آنے والا پھیچر سے کے گوشت یااس کی رگول سے آتا ہے سینہ سے آنے والاخون گاڑھا جما ہوااور ماکل بہ سیابی ہوتا ہے کے گوشت یااس کی رگول سے آتا ہے سینہ سے آنے والاخون گاڑھا جما ہوااور ماکل بہ سیابی ہوتا ہے در واس کیونکہ طول مسافت کی وجہ سے یہ منجمد ہوجاتا ہے۔ اس کے ساتھ سینہ میں درو بھی ہوتا ہے در واس مقام پر ہوتا ہے جہال شگاف ہوتا ہے۔ میں نے تج بہ کرکے دیکھا ہے کہ اس پہلوم یفن لیٹا ہے تو خون اس نے بہ کشرت تھوکنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے سبب کا تذکرہ ہم نے اس کے باب میں کردیا

ہے۔اس بیاری کا استنباط ہم نے حیلہ الرئہ کے پانچویں مقالہ سے کیا ہے جہال مصنف نے سینہ کے اندر ماءالعسل کے سر ایت کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔

پھیپر اے گوشت ہے آنے والا خون، پھیپر اے کار اور تا ہے اور سل میں ہتا اور سل میں ہتا اور سل میں ہتا اور سفیدی، پتلا بین لئے ہوئے اور جھاگ دار ہو تا ہے۔ یہ نہایت برا ہو تا ہے اور سل میں ہتا کر دیتا ہے۔ پھیپر اے کی رگوں ہے آنے والا خون زیادہ ہو تا ہے اور سینہ اور پھیپر اے گوشت کے مقابلہ میں سرخ، رقیق اور گرم ہو تا ہے۔ یہ پھیپر اے گوشت کے مقابلہ میں زیادہ پتلا نہیں ہو تا بلکہ گاڑھا اور خون سے زیادہ مشابہ ہو تا ہے۔ پھیپر اے کی رگوں سے خون، رگوں کا منہ کھل ہوتا ہے۔ منہ کھلنے کی وجہ عروقی امتلاء کش ہونا ہے۔ منہ کھلنے کی وجہ عروقی امتلاء کش خون، سقط وضر بہ، چیخ و پکاریا خون کی حدت ہوتی ہے۔ عروقی فساد فقط خون کی حدت کا بتیجہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ منہ کھلنے کی وجہ عروقی امتلاء کش نہار گی بہ کش گاڑھے خون کے چیڑنے، لہذا مقدم تدبیر کش ہے عروق کی اسلاء، یکبار گی بہ کش گاڑھے خون کے چیڑنے، حمام کے بعد غذا لینے اور گرم کھانا کھانے ہے امتلاء دموی کا پیتہ کریں۔ ایسی ھالت میں خون کا چڑھنا، اور تھو کنا آسانی سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نہ در د ہوتا ہے نہ بخار۔

خون کی حدت ہے رگوں کے کھل جانے میں تیز حرارت اور خون کے اندر بہت زیادہ لطافت ہوتی ہے۔ فساد عروق، تیز، تلخ نزلہ ، یا تیز اور چر بری غذاوں کے استعال کی وجہ ہے ہو تا ہے۔ یکبارگ بہت زیادہ خون اس میں نہیں آتا۔اس کے ساتھ در داور بخار ہو تا ہے۔

ر گیس کھٹتی ہیں بیحد سخت مُصندُ کیا بھاری بھر کم بوجھ کی وجہ ہے۔اس کی وجہ ہے آنے والا خون گاڑھااور زیادہ ہو تا ہے۔اکثر حالات میں ورم موجود ہو تا ہے۔اس سے چھٹکارامشکل ہو تا ہے۔ مریض صحتیاب نہیں ہو تا۔

## رگول کے کھلنے کاعلاج:

ہمیشہ باسلین ابطی کی فصد کھول دیں، بقدر طافت دوسر ہاور تیسر ہے دن بھی خون نکالیں۔
مریض آ رام کرے، گفتگو کرنا قطعاً ترک کردے، جب بھی شدت تفس پر مجبور ہواور نفث الدم کے
ساتھ سخت تکلیف دہ کھانی نہ ہو تو تیزسر کہ پانی میں ملا کر جرعہ جرعہ لے تاکہ پھیپے وا منجمد خون سے
صاف ہو جائے۔ کھانی تکلیف دہ ہو تو سرکہ سے پر ہیز کریں۔ کیترا، صمنح وغیرہ مسکن دواؤں کے
ذریعہ جسے بھی ہو کھانی روکنے کی تدبیر کریں۔ مریض سیدھالیٹے، سیدھانہ لیٹے گا تو سینہ کے بعض
صے بعض پر دباؤڈال کر کھانی پیدا کریں گے۔ کھانی اس طرح کے مریض کے لئے نہایت خراب

ہے کیونکہ اس سے ورم پیدا ہوگااور مقام ماؤف بندنہ ہوسکے گا۔ دیکھیں جسم اگر صاف نہ ہو تو خلط غالب کے لئے مسہل دیں۔ خون آنا بندنہ ہو تو گل، پھٹری، کہرباء، گلنار، جیسی مغری اور قابض ادویات عرق بہی کے ساتھ استعال کریں۔ بخارنہ ہو تو شر اب دیں۔ غذا کم دیں اور قابض دیں۔ خون سرکی جانب سے تالومیں آر ہا ہو تو سب سے پہلے قیفال کی فصد کھولیں پھر قابض اشیاء کا غرغرہ کرائیں اور ضادوں کے ذریعہ سرکو مختد آکریں۔ (ابن اس ابیون)

یہ علاج محل نظر ہے ۔ یہاں گرمی پہونچانے کی ضرورت ہے اعتدال کے ساتھ نیند لانے کے لئے مخدراشیاء دیں۔ کھانسی کو تسکین دیں، سینہ پر قابض صادر تھیں۔(مؤلف)

پھیپر سے کے گوشت سے آنے والے خون کا علاج ند کورہ بالا کریں۔ مگر یہاں سرکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ گل، شاذنہ جیسی خشک، گوشت پر کرنے والی ادویات ماء العسل کے ساتھ دیں۔ فساد عروق کے لئے یہ علاج عمدہ ہے۔ شاذنہ کو کوٹ کر ذرہ بنادیں اور ۵گرام پلائیں۔ نہ کورہ بالا وضاحت کے مطابق کھانسی اور نزلوں کا شقیہ کریں، مخدرات دیں۔ فساد عروق کا علاج کثرت سے جسم کا شقیہ کریں، عمدہ غذائیں دیں۔ کیونکہ یہاں ردی اختلاط ہوتے ہیں۔ مسکن اور شنڈی چیزیں دیں۔ فصد اور ملین اشیاء کے ذریعہ شکم کو زم کرنانہ بھولیس۔ شاذنہ، گل، کہریاء اور دم الاخوین پلائیں۔ شاذنہ کا اثریہ ہے کہ زخم کو خشک کرتی اور تیزی سے صحت لاتی ہے۔ پیپ آناشر وع ہوتو بلائیں۔ شاذنہ کو چیں کر ذرہ کے مانند کرلیس اور اس کے بعد پلائیں۔ پینے میں بارش کا پانی نہ مل سکے تو ایسا پانی ویں جس میں گلاب، گل ارمنی بھگودی گئی ہو۔

حدت اور فساد عروق کے ساتھ نفث الدم کیلئے عمدہ سفوف:

طباشیر ۱۰، گل ار منی ۱۰، شاذنه ۱۰، بسد ۵، کبر باء۵، لؤلؤ۵، صمغ۲، کیتر ۲۱، خشخاش سیاه ۳، مختم رجله ۳، مختم گلاب ۳، مختم خرفه ۳، گلنار ۳\_ مقدار خوراک ساژھے دس گرام ہمراہ آب بارال۔

ریگر:

كندر، كل مختوم، صمغ، دم الاخوين، قاقيا\_مقدار خوراك ٤ گرام\_(ابن سرايون)

#### مفردات:

رجله كاكھانانفث الدم كے لئے عدہ ب(جالينوس)

ر جلہ وہاں استعمال کریں جہال نفث الدم کے ساتھ حرارت اور سخت پیاس ہو کیونکہ اس سے غایت درجہ حرارت بجھتی ہے اور قبض کے ساتھ رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ (مؤلف)

عصار وُلحیة التیس نفث الدم کے لئے عمرہ ہے۔ نیخ قنطور یوں کبیر وگرام بخار ہو تو آب تازہ کے ساتھ ورنہ شراب کے ہمراہ لیس۔نفث الدم میں مفید ہے (جالینوس)

اس کی وہاں سخت ضرورت ہوتی ہے جہاں ند کورہ فغل کے ساتھ تھو کئے میں سہولت بھی پیدا کرنا ہو۔لہذا یہ بات نوٹ کرلیں۔(مؤلف)

جالینوس نے تقد مہ المعرفۃ میں لکھا ہے کہ نفٹ الدم کی ایک فتم ورم رئے د مومی ہے لاحق ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ خون کار شخ یہاں ہے قصبۃ الرئے پر ہوتا ہے اس فتم میں اور دیگر اقسام میں فرق یہ ہے کہ اس میں خون کم ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا جب کہ پھیپورٹ کی رگوں کے پھٹ جانے میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ سخت بخار، تنفس عظیم، نہایت طاقتور ہوتا ہے یا چہرہ سرخ ہوتا ہے یہ فتم اکثر چار دن یا ایک ہفتہ کے اندر یک جاتی ہے یہ مامون ہوتی ہے۔ ایک ہفتہ کے بعد علی حالہ باقی رہ تو بیحد خطر ناک ہوجاتی ہے۔ اس فتم کا علاج تا ابض اشیاء ہے نہیں بلکہ سب سے پہلے فصد پھر منفنج دے کر کیا جاتا ہے۔ پوست کندر کا استعمال نفٹ الدم میں اطباء کثر ت سے کرتے ہیں کیونکہ یہ مفید ہوتا ہے۔ نفٹ الدم کے لئے زراو ندعم ہوتا ہے۔ نفٹ الدم میں اطباء کثر ت سے کرتے ہیں کیونکہ یہ مفید ہوتا ہے۔ نفٹ الدم کے لئے تارہ و کا کے عدہ ہے۔ (مؤلف)

گل مختوم کو کوٹ کر منہ میں چھڑک دیاجائے توسیال خون رک جاتا ہے، خون کو قطعی روکنے کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی اور دوا نہیں ہے۔ گل لامی نفث الدم کے لئے بیحد عمدہ ہے۔ کندر کا مشروب نفث الدم میں مفید ہے۔ پوست اسی باب میں طاقتور ہے۔ آملہ نفث الدم کو عمدہ طور پرروک دیتا ہے حب الآس نفث الدم کے لئے عمدہ ہے۔ (خوز)

ای وقت جب که سینه میں خشونت (کھر دراین)موجود ہو (مؤلف)

محم کراٹ کے گرام ، ساق کے گرام نفث الدم اور مز من کو توڑ دیتے ہیں ، غاریقون کا مشروب پھیپھڑ سے اور سینہ سے آنے والے خون کوروک دیتا ہے۔راوندنفث الدم کے لئے عمدہ ہے۔ (خوز)

عرق بادروج تفث الدم كے لئے عمدہ ب (روفیل) كل مختوم خالص كے مقابلہ ميں خون كوروكئے كے لئے اور كوئي چيز نبيں ہے۔ (خوز)

#### مومیائی عجیب وغریب شے ہے۔ (مؤلف)

سخت بھوک کے وقت معدہ پر مر ہُ سوداء کا انصباب ہونے لگتا ہے۔ خالص خون اس کی پرورش کر تاہے سخت بھوک کے بعد خون کی تئے ہو تو یہ خیال کریں کہ یہاں پچھ شگاف ہو گیا ہے اس ہے کوئی حرج ہر گزنہ ہوگا۔ (خوز)

مخنڈک ہے سینہ اور پھیپھڑے کی رگیں او گول کی پھٹتی ہیں جن کے مزاج خٹک ہوتے ہیں۔ جسم دیلے اور سخت ہوتے ہیں۔ان کے مقابلہ میں مر طوب اور نرم جسم کم متاثر ہوتے ہیں۔

(جالينوس)

مسلسل شدید کھانسی کامریض نفث الدم ہے چھٹکار انہیں پاتا کیونکہ کھانسی کی شدت اور تشلسل ہے کوئی رگ بچٹ کررہتی ہے۔ ایسی صورت میں جلد فصد کھول دیں تاکہ رگوں پر بوجھ ہلکا ہو جائے۔ سینہ کی ہلکی مالش اور اس پر نطول کریں، گرم پانی کا جرعہ دیں تاکہ مریض ند کورہ کیفیت پیدا ہونے ہے۔ محفوظ رہے۔ (مؤلف)

ایک عورت گاڑھاسیاہ خون تھوگرہی تھی، خون کچھ جما ہوا اور پچھ جما ہوا نہیں تھا۔ تھو کئے وقت لذگاور مری کے اندر نا قابل برداشت سوزش محسوس کرتی اس وقت اُسے تئے ہو جاتی تھی۔ بہی کیفیت کئی دن تک جاری رہی مگراس ہے اے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی بلکہ کلائی طحال جس کی وہ شکار تھی کم ہو گئی۔ ای طرح ایک اور شخص سال بھر نئے کر تاربا چنا نچہ اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ لہذا واضح رہے کہ خون کی تئے اور دست جگر اور طحال نے اس لئے ہوتی ہے کہ ردی فضلات کا ازالہ ہو جائے یا شدید امتلائی کیفیت جاری رہے۔ اگر فضلات ردی نہ ہوں تو انہیں رو کئے میں جلدی نہ کریں اور غور کرکے دیکھ لیس کہ آیا یہ عادت رہی ہے؟ کیااس کے ازالہ کے لئے تدبیر کرنا ضروری ہے؟ اور تدبیر کرنا ضروری ہے؟ اور تدبیر کرنا ضروری ہے؟ اور تدبیر کے بعد کیا حالت بدتر ہوگئی ہے یا بہتر ؟ (مؤلف)

نفث الدم ریوی میں فصد کھول دینااور تھوڑا تھوڑا خون کی بار نکال دینا مفیدہ، مریض کو تھم دیں کہ نہایت کٹھاسر کہ پانی میں ملا کر جرعہ جرعہ کئی بار لے،اس سے خون کا آنابند ہو جاتا ہے اور منجمد خون تحلیل بھی ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)

جالینوس کی میہ تدبیر اختیار کرنے سے پہلے شگاف کو بند کرنے کی تدبیر کرلیں۔ مریض کے دونوں باز دوئل اور ناک کے دونوں کناروں کو حسب قاعدہ ہاندھ دیں۔اور اسے پانی ملاہواسر کہ تین بار دویا تین گھنٹوں کے اندردیں۔اس کے بعد مغری، قابض، مخدر،اور نیند آور دوائیں سر کہ میں ملاکر دیں، یہ بہت مؤثر ہے سر کہ کے اندر پانی کثرت سے ملاہوا ہو۔دن میں دوبار عصار ہی دیں۔مریض

میں طافت ہو تواس دن کھانا بالکل نہ دیں۔ کھانے میں پر ندوں کا گوشت دیں اور مریض کو تا کید کریں کہ چنخااور تھکاوت کے کام کرنا تو در کنار بولے تک نہیں۔ اسی طرح ساتویں دن تک تدبیر کرتے رہیں، مریض کی گلوخلاصی ہو جائے گی۔

انسان کو بھی یہ حالت پیش آتی ہے کہ سیاہ گاڑھاخون نے کر تا ہے ، ساتھ بیس شدیڈش اور سوزش ہوتی ہے۔ یہ دراصل ایک فضلہ ہو تا ہے جس کا طحال سے انصباب ہو تا ہے ۔ معدہ اور سینہ کے اندرخون کے جم جانے سے بھی انجمادخون کے ند کورہ اعراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ (جالینوس)

کوئی ایسا شخص نظر آئے جو سینہ سے خون خارج کر تا ہو یاخون کی تے کر تا ہو۔ اس طرح کی حالت پیشتر نہ رہی ہو بلکہ کوئی ایسا سبب رہا ہو جس کی وجہ سے نفث الدم یاخون کی تے آتی ہو، پھر یہ حالت ختم ہوگئی ہو۔ اس کے بعدرنگ میں زردی، جسم میں لاغری، غشی، نبض میں صغر، جسم میں گری حالت ختم ہوگئی ہو۔ اس کے بعدرنگ میں زردی، جسم میں لاغری، غشی، نبض میں صغر، جسم میں گری اور استر خاء پیدا ہو گیا ہو تو خون یا تو سینہ کے اندر آتا ہے کھائی کے ذریعہ خارج ہو جاتا ہے۔ فورا الیسی چیزیں دیں جو خون کو جو سے تھے کو تحکیل کردیں تو سینہ کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ الیسی چیز بھی دیں جو خون کو دھو دیا کر ہے۔

قاطع اور مفتح تمام دوائیں نفث الدم ریوی کے لئے خراب ہیں کیونکہ اس طرح کے مریفوں کوان کے مخالف دواوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ قابض ادویات ہوتی ہیں۔

ذات الجنب میں جب کیفیت ہلکی ہویا سحنہ (چبرہ کی حالت) خراب میں فصد کھولنا جتناضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری نفث الدم میں ہے۔نفث الدم میں فصد کھولنے کی ضرورت نہ بھی ہوتو بھی کھول دیں۔خواہ مریض کمزور کیول نہ ہو۔ (جالینوس)

#### تفث الدم كاايك عمده اورمؤثر نسخه:

منہ میں خباز کارس لے کرتھوڑاتھوراحلق سے نیچے اتار دیں۔ (تیاذوق) اس کے ساتھ صمغ اور لعاب اسپغول شامل کرلیں۔ خباز میں عجیب وغریب لزروجت (لسی) ہوتی ہے (مؤلف)

نفث الدم كے مريض كے يہاں آكر وہ طاقتور رياضت كراتا تھا جو اس كى موت كا باعث موجاتى تھى۔اس كا كہنا تھا كہ ايسااس وقت كرناچاہئے جب امتلاء دموى موجود ہو (جالينوس بنام ارسطراليس)

نورستہ کلی اذخرنفث الدم میں مفید ہے، پوست غرب بھی اثر رکھتا ہے۔
اسفنج سوختہ پھیپھڑے میں ڈبونے کے بعد نفث الدم کے لئے موزوں ہے۔ شاخ گوزن سوختہ ساڑھے دس گرام کا مشروب ہمراہ کیتر انفث الدم میں مفید ہے۔ نفث الدم میں آس تر اور خشک کھائی جاتی ہے۔ غرب کا پھل کھانانفث الدم میں مفید ہے۔ (جالینوس)

. جالینوس کا قول ہے کہ پچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاخ گوزن خاصحر دوسری سینگوں کے مقابلوں میں زیادہ محمود ہے۔اے سوختہ کرنے کے بعد دھو کر استعمال کیا جائے تو نفت الدم کے لئے شافی ہو تا ہے۔(دیا سقوریدوس)

نکوئی انتھے (بھیٹر بکری کے بچے کا تیزاب معدی) 1500 ملی گرام مشروب کے طور پر استعال کیا جائے تو نفث الدم میں مفید ہے بلوط، جفت بلوط، اور بلوط کاجو شاندہ بھی مفید ہے۔ (دیا سقوریدوس) رجلہ کا کھانانفث الدم میں مفید ہے عصارہ رجلہ کا مشروب اور زیادہ مؤثر ہے (جالینوس) نخ باد آورد کا مشروب نفث الدم کے لئے موزول ہے۔ نفث الدم کو پی تطعی طور پر توڑ دیتا ہے۔ اس میں یہ واضح طور پر مفید ہے۔ اس طرح باد ورد سیاہ بھی مفید ہے۔ بھونیں تو آتش بے دود پر

اس میں یہ واضح طور پر مفید ہے۔ اس طرح باد ور دسیاہ بھی مفید ہے۔ بھو میں تو آئش بے دود پر بھو نیں، اس کی افادیت بیحد بردھ جاتی ہے۔ بیضہ کا چھلکا اتار کر چاشانفٹ الدم میں مفید ہے۔ اس کے ساتھ کوئی مغری دواجس میں بیوست ہو، مثلاً کا تباءیا کوئی قابض شئے مُلاً گلنار، خشخاش اور نخم بنج شامل کی جائے تو حدہ بردھے ہوئے نفٹ الدم میں مفید ہے۔ (جالینوس)

دارشیشعان کاجوشانده نفث الدم کوروک دیتا ہے۔ (دیاسقوریدوس و جالینوس)

سبزی گلاب (اقماع الورد) کا مشروب نفث الدم کو قطع کردیتی ہے۔کارباء کا بھی یہی اثر ہے رسوت کو ہمراہ آب نفث الدم میں استعال کرتے ہیں، لباب گندم سے گاڑھی چننی بنا کر استعال کرنا نفث الدم میں مفید ہے۔(دیاسقوریدوس)

مقطون نفث الدم میں مفید ہے۔ (دسیاسقور بدوس و جالینوس)

طر فاء کے کچل کا مشروب نفث الدم میں مفید ہے طراثیث اپنی خاصیت سے خون کوروک دیتی ہے۔(دیاسقوریدوس)

> گل مختوم اور گل کو کب ساموس دونوں عمدہ ہیں (بدیغورس) گل ار منی نفث الدم میں بیجد مفید ہے۔ (دیاسقوریدوس) عصار ہُ ہر گِ انگورنفث الدم میں مفید ہے (جالینوس)

انگور صحرائی کے پھل کامشروب نفث الدم میں مفید ہے کندر مفید ہے، اس کا چھلکا اور زیادہ

مفید ہے۔ بھنی ہوئی دھنیااس کے لئے نفع بخش ہے (دیاسقوریدوس) مختم کراث نبطی کے گرام کامشروب ہمراہ حب الآس سینہ کے مزمن نفث الدم کو قطع کر دیتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

بادام تلخ ہمراہ نشاستہ و پو دینہ نفث الدم کے لئے عمدہ ہے۔ صمغ بادام نفث الدم میں مفید ہے۔ بادام تلخ نفث الدم میں نفع بخش ہے۔ ( دیاستوریدوس وجالینوس)

عصار ہُ برگ خرفہ سینہ اور پھیپھرٹ سے آنے والے خون میں مفید ہے۔ طراثیث کامشروب سینہ اور پھیپھرٹ سے ہونے والے نفث الدم میں نافع ہے۔ (ابن ماسوبیہ)

مصطلی نفث الدم میں عدہ اور مفیدے۔ (جالینوس)

پوست نیخ مصطلکی و برگ مصطلکی دیر تک جوش دے کرصاف کیا جائے پھر اے اتناپکایا جائے کہ شہد کے مانندگاڑ ھا ہو جائے اور اے استعمال کریں۔نفث الدم میں مفید ہے۔شر اب میں خاص پانی کی جگہ بارش کا پانی شامل کر کے استعمال کریانفث الدم کے لئے عمدہ ہے۔ (دیاسقور بیروس)

قسب نفث الدم میں مفید ہے۔ تھجور کامشروب نفث الدم کے موافق ہے۔ عصارہ نعتع ہمراہ سرکہ کامشروب قاطع نفث الدم ہے۔ جالینوس کہتا ہے کہ ایسااس لئے ہے کہ اس کے اندر کسیلاپن ہو تا ہے۔ پرانانہ ہو توسر کہ ملاکر پینے سے نفث الدم ٹوٹ جاتا ہے۔ (روفس)

عصارہ نعیع کامشروب ہمراہ شاذنہ نفث الدم میں بیحد مفید ہے۔ (یہودی) بہی مشوی کا کھانانفث الدم میں بیحد مفید ہے، سینہ کے اندراس سے گھر دراین بہت کم لاحق ہو تا ہے۔ گل بہی نیز عرق بہی کامشر وب نفث الدم میں مفید ہے۔ (دیاسقوریدوس)

جوزالسر والجھی طرح کوٹ کراور شر اب کے ساتھ استعال کیاجائے تونفٹ الڈ) میں مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

مچھلی ہے بنی ہوئی غذا چٹیؤں کے ساتھ استعال کر نانفث الدم میں مفید ہے (جالینوس) آب حصرم نفث الدم غیر مزمن کے لئے مفید ہے ، ضرورت ہے کہ کسیلا پن زیادہ ہو اس سے اثر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

عصا الراعی اور گل علین نفث الدم میں مفید ہے۔ صبر ساڑھے تین گرام ہمراہ آب سر دکا مشروب نفث الدم کے لئے قاطع ہے۔ نیخ قنطور یون ساڑھے تین گرام کامشروب جب بخار نہ ہو تو شراب کے ہمراہ اور بخار ہو تو آب تازہ کے ہمراہ نفث الدم صدری میں مفید ہے۔ نیخ قنطور یون کبیر نفث الدم میں مفید ہے۔ نیخ قنطور یون کبیر نفث الدم میں مفید ہے۔ مقدار خوراک اگرام ہمراہ آب تازہ یاشراب دانہ انار مرس بارش کے پانی میں نفث الدم میں مفید ہے۔ مقدار خوراک اگرام ہمراہ آب تازہ یاشراب دانہ انار مرس بارش کے پانی میں

55

بھگو کر پینانفٹ الدم میں مفید ہے (دیاسقوریدوس)

عاریقون 1500 ملی گرام مشروب ہمراہ آب تازہ نفٹ الدم کو قطع کر دیتا ہے (بولس)
گنار نفٹ الدم میں مفید ہے (دیاسقوریدوس)

زراو ندکامشروب نفٹ الدم میں نفع بخش ہے (دیاسقوریدوس)

شاذ نہ کور گڑ کر آب عصی الراع میں جینانفٹ الدم میں مفید ہے۔ (دیاسقوریدوس و جالینوس)

ذنب الخسیل نفٹ الدم صدری میں مفید ہے۔ قرن الثورسوختہ کامشروب ہمراہ آب نفٹ الدم میں نفع بخش ہے۔ (جالینوس)

میں نفع بخش ہے۔ (جالینوس)

ختم محمی نفٹ الدم میں مفید ہے۔ نئے خطمی بھی اس میں مفید ہے کیونکہ قبض کی تاثیر رکھتی ہے۔

خوالینوس)

#### نفث الدم مين مفيد ادويات:

نظاذ خر، رایوند چینی، دار شیشعان، پوست کندر، مصطکی، جوزالسرو، پوست صنوبر، پوست شجر کا مریم، طراهیث، آمله، گل ار منی، گلاب مع سبزی، شاخ گلاب، انار ترش، دانه انار بارش کے پانی میں جوش دیا ہوا، حب الآس، مصغ عربی، شاخ گوزن سوخته، انفحة الآرب، خرفه، بقله حقاء، غار بقون، یه تمام ادویات بوزن کے گرام، گلاب کی شاخوں کے عرق یاعرق خرفه کے ہمراہ بینا نفث الدم میں مفید ہے۔ ادویات بوزن کے گرام، گلاب کی شاخوں کے عرق یاعرق خرفه کے ہمراہ بینا نفث الدم میں مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

ہمیشہ باسلین کی فصد کھولیں۔نفث الدم کو قطع کر دینے والی دوائیں حسب ذیل ہیں: رجلہ،ریوند،گل مختوم،صمغ عربی،گلاب،گلنار، (اسحاق)۔

#### نفشالدم کے لئے سفوف کانسخہ:

کزیرہ مقلوما، عصار کو خرفہ ما، مختم رجلہ مقلوما، شاخ گوزن سوختہ ما، کہریاء سفیدما، گلنارما، نشاستہ مقلوما، جفت بلوط ک، اقاقیا ک، طباشیر ک، گل سرخ مع سبزی ک، ریوند چینی ۸، مختم حماض مقلو ۸، مناور وان ۸، بسدمغول ۸، مرات (کئی بار دھلا ہوا) ۸، صمغ محمص ۱۵، گل مختوم ۵۰، اسپغول ۲۰۰۰ اسپغول کی ساہ سیغول کے سواتمام دواؤں کو کوٹ کر آب خرفہ میں شامل کریں اور صبح وشام کے گرام استعمال کریں۔ غذا میں مسور مقشر بھنی ہوئی، سرکہ اور آب نار میں جوش دے کر ایس۔

نفث الدم چار پہلوؤں ہے ہو تا ہے۔ ا۔ شگاف ہو گیا ہو۔ کودنے پھاندنے ، چیخ و پکاریاضربہ سے ۲۔ شدید غم وغصہ لاحق ہوجانے سے نفسانی تحریک ہوگئی ہو۔ ۳۔ تیز اخلاط نے فساد پیدا کر دیا ہو۔ ۳؍ رگوں کے منہ کھل گئے ہوں۔ یہ حالت کثرت طعام وشراب، شیریں پانی میں کثرت حمام اور مسلسل بیکاری کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔

خلطی فساد وغیرہ میں فرق یہ ہے کہ خون کے اندر ساہی اور تعفن ہوگا۔ شگاف وغیرہ کے در میان فرق کثرت و قلت خون ہے کریں گے۔عروق کے اندر جہاں کہیں شگاف ہو خون گاڑھا ہو گا۔اس سے پہلے ظاہری سبب موجود ہو گا۔ پھیپھر سے خارج ہونے والاخون لطیف اور رقیق ہو گا۔اس میں جھاگ ہو گا۔ بغیر کسی تکلیف کے خارج ہو گا۔ سینہ سے خارج ہونے والے خون میں حجاگ ہو گا مگر تکلیف کے ساتھ خارج ہو گا کیونکہ سینہ کے اندر بکٹرت عضلات ہوتے ہیں پھیپھڑے میں کوئی عضلہ نہیں ہو تا۔ فساد وخلطی ہے پیداشدہ نفث الدم کاعلاج حدت کے اندر تسکین اور مزاج کے اندر تعدیل پیدا کرنے والی دواؤں ہے کریں گے۔مثلاً پانی میں جو ش دیا ہوادودھ، آب کدو،ر جلہ اور خرفہ دیں گے۔ بخار میں ہو تو دودھ ، ماءالشعیر ،اسفیوس کے ذریعہ علاج کریں گے۔رگول کے منہ کھل جانے میں فصد، قلت غدااور مازو، ساق۔گلنار حب الآس،طباشیر، گل سرخ کے جو شاندہ اور لوہ ے بچھائے ہوئے پانی کے ذریعہ کریں گے۔ یہ پانی بیحد قابض ہو تاہے بخارنہ ہو توبیہ یانی خاص طور پر یلاتے ہیں۔ قسطا، فاختہ ، بٹیر ،اور کم خون والے گوشت جیسے خشک گوشت غذامیں دیں۔ کم خون والے گوشت کوسر کہ ،انار ترش اور ساق کے ساتھ ابال کردیں۔شگاف ہوجانے سے خون آرہا ہو توصمغ قرط، صمغ ام غیلان، صمغ اجاس جیسی مغری دوائیں دیں۔ یہ جیرت انگریز تا ثیر رکھتی ہیں۔ گل ار منی نثاسته ،استعال کریں سر مق (بقوا) کھلائیں ، مریض کویائے دیں ،ماءالشعیر اور نہری مچھلی کااسفید باج پکا كردي \_يائة فالدم كى تمام قىمول مين عده موت بير - (طبيب معلوم)

رگول کے اندرخون زیادہ ہو جائے تواور اس سے پچھ رگیں پھٹ جائیں توایی حالت میں نفث الدم، بواسیر وغیرہ کے عوارض لاحق ہوتے ہیں۔ مریض کی عروتی طاقت رگول کا پھٹنا ممکن نہ ہواور خون کی مقدار بڑھ گئی ہو تواچا تک موت طاری ہو جائے گی۔ جسمانی صحت اور جسمانی قوت کی موجودگی میں بھی نفث الدم وغیرہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ شراب کے بعد کافی خون کی تھے گی اس سے میں بھی نفث الدم وغیرہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ شراب کے بعد کافی خون کی تھے گی اس سے اس فی نفث الدم ہو گیا۔ وریدیں جسم کے تمام اعضاء کے اندر پھٹ سے تی ہیں، شریا نمیں ہم تھی ہیں کیونکہ شریانوں کے اوپر شریا نمیں ہوتی ہیں۔ ایک بیحد موثی ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ان میں شدید امتلاء نہیں ہوتا کیونکہ یہاں بہ کشرت روح ہوتی ہے پھپھڑے جسے کشر الحرکة عضو کے اندر شگاف واقع ہو جائے اور یہ شگاف کشادہ ہوتو صحتیانی مشکل ہوتی ہے۔ (قسطا)

57

تھوک میں جب بھی جھاگ دار خون نکلتا ہے یہ سمجھیں کہ اس کا تعلق پھیھیڑے ہے ہے۔ اگریہ صاف شفاف اور گاڑھا ہو تواس کا تعلق سینہ ہے ہو گا(ابن لجلاح)

نفث الدم كے لئے:

گل سرخ مع سبزی، عدس مقشر، طرافیث، گلنار، گل ار منی، کافور، عرق گلاب میں گوندھ کر سینہ اور پہلووں پر طلاء کریں اور ایک کتانی سر د ککڑے ہے ہر گھڑی ٹھنڈک پہونچاتے رہیں۔

#### نفشالدم كاجامع نسخه:

بسد ۳، کہر باء ۳، لؤلؤ ۳، شاذنہ ۱۰، بارش کے پانی میں دھوکر ختک کیا ہوا نشاستہ بریال ۳، صحف عربی بریال ۷، گلنار ۳، گل سرخ مبزی دور نمو دہ آگرام، طباشیر سفید آگرام، مخم رجلہ ۲۱ گرام، مخم گلنار ۵ گار می مختم خوف ۱۱ گرام، برگ خوف ۱۱ گرام، ختم خس ۱۱ گرام، مخم خس ۱۱ گرام، برگ خوف ۱۱ گرام، ختم خس ۱۱ گرام، سنبل ساڑھے کا گرام ۔ شاخ گوزن سوختہ خشک کردہ ۱۰، ختم جماض منقی بریال ساڑھے تین گرام، ریوند چینی ساڑھے کا گرام، زعفران ۵ گرام، خشخاش سیاہ ساڑھے کا گرام، عصارہ آبر باریس ۵، لک مغسول سے کیتر ۵، کز برہ بریال ۱۰، کندر ۳، برگ نعنع خشک ۳، طلق ۵، شب ۳، قاقیا ۱۴ بارش کے پانی میں دھلا موا، طراشیت ، انصحة الارنب والحدی ۵ (خرگوش اور بکری کے بیج کی رطوبت معدی)، سرطان سوختہ موا، طراشیت ، انسخة الارنب والحدی ۵ (خرگوش اور بکری کے بیج کی رطوبت معدی)، سرطان سوختہ محاگرام، دم الاخوین ۵، گاؤز بان ۱۰ مقدار خوراک کرام ہمراہ عرق خرفہ۔

## صرے برجے ہوئے نفث الدم كے لئے:

حب الآس، تخم کراث مبطی، گلاب کی شاخوں اور ڈنٹھلوں سے نچوڑ ہے ہوئے پانی کے ساتھ استعمال کریں یا پھر آب نعنع سر کہ کے ساتھ استعمال کریں۔

#### :100 000

تخم بنج سفید، ساڑھے نین گرام ہمراہ ماءالعسل۔ جالینوس نے حیلہ البر میں لکھاہے کہ نفث الدم کے مریض فصد اور سہل استعال نہ کریں اور سر کو گرم نہ رکھیں گے توسل میں مبتلا ہو جائیں گے۔اس کی وضاحت ہم قروح رئے کے بیان میں کر بچے ہیں۔(ابن ماسویہ) منہ سے نکلنے والاخون سرے آتا ہے جو تے اور کھانی کے بغیر خارج ہوتا ہے۔ کھانی کے ساتھ آرہا ہو تا گار پھیپھڑے سے ساتھ آرہا ہو تا گار پھیپھڑے سے آنے کی صورت میں زیادہ ہوگا اور قبل ہوگا۔ سینہ سے آنے کی صورت میں زیادہ ہوگا۔

پیٹ ہے خارج ہوگا تو کھانی کے بغیر خارج ہوگا۔ پھیچر سے خون آنے کی صورت میں سرکہ کا استعال اندرونی نہیں ہیر ونی کریں گے۔ سینہ پر بیچنے لگاضروری ہے۔ جمام، حرکت، غصہ، چیخ و پکار، غم، تیزچر ری کی غذاؤں، دھوال اور غبارے مریض کو محفوظ رکھیں۔ مریض اگر عورت ہے تو نہایت طاقت سے اس کا دراء کر دیں گے اور ارطمث ہی اس کا جملہ علاج ہے۔

منہ سے نکلنے والاخون مری سے آتا ہے یا قم معدہ سے یا قعر معدہ سے یا منہ سے یا طاق سے یا قصبہ الرئے سے یاسر سے یا پھیچر ہے سے یاسینہ سے مری سے خون آرہا ہے تواس کی علامت یہ ہے کہ درد بچد لشدید دونوں شانوں کے درمیان درد ہوگا۔ فم معدہ سے آرہا ہے تواس کی علامت یہ ہے کہ درد بچد لشدید ہوگا۔ حلق قے آنے کی صورت میں خون تھنکھار کے ساتھ خارج ہوگا۔ قصبہ الرئے سے آنے کی حالت میں تھوڑی کھانی کے بعد یکے بعد دیگر سے تھوڑا تھوڑا آئے گاسینہ میں درد کم ہوگا۔ سر سے آنے کی صورت میں پیشتر سر کے اندر بوجھ محسوس ہوگا۔ چرہ پر سر خی ہوگی یہ بھی تھنکھار کے ساتھ نکلنے گا۔ پھیچر سے آنے کی حالت میں درد کے بغیر یکبارگی کثیر مقدار میں نکلے گا۔ سینہ سے آنے کی حالت میں درد ہوگا۔ تا تھ میں سینہ کے اندر کی حالت میں تو خون اُنر کر کی حالت میں علامت ہم نے پہچان کی ہو دون اُنر کر کر دیا ہے۔ کتاب الاعضاء لآلہ میں علامت ہم نے پہچان کی ہے اور جہاں علامت ہم نے پہچان کی ہے اور جہاں علامت کا بیان ہے وہاں ہم نے تذکرہ کر دیا ہے۔ (جالینوس)

یہاں ایک ایسی علامت کی ضرورت ہے جو سرے سرکی جانب آنے والے اور سینہ کی جانب آنے والے خون کے در میان امتیاز پیدا کر سکے۔ (مؤلف)

نفٹ الدم کی رگ کے پھٹنے یا فاسد ہونے یا حلق کے اندر جونک لگنے ہے ہوتا ہے۔ رگ پھٹنے کی علامت یہ ہے کہ پیشتر سخت چنے و پکار، سینہ پر شدید چوٹ، یا سخت تھنچاؤکی حالت ہو پچکی ہوگی۔ فاسد ہونے کی علامت یہ ہے کہ نزلہ ہوا ہوگا۔ پہلے تھوڑا خون خارج ہوا ہوگا پھر یکبارگی کثرت سے خون فکا ہوگا۔ قرحہ کی علامت یہ ہے کہ خارجی سبب کے بغیر دفعۂ خون خارج ہوگا۔ جسم میں امتلاء پایا جائے گا۔ ساتھ میں کسی فتم کا در دنہ ہوگا۔ جونک لگنے کی علامت یہ ہے کہ خون لطیف اور پانی جیسا ہوگا۔

گا۔ ساتھ میں کسی فتم کا در دنہ ہوگا۔ جونک لگنے کی علامت یہ ہے کہ خون لطیف اور پانی جیسا ہوگا۔

گا۔ ساتھ میں کسی فتم کا در دنہ ہوگا۔ جونک رودت یا حرارت، یا جمام پر اصر ار کرنے ہے ہو جاتا

ہے۔ مسلسل میٹھے ماکول ومشروب، یا فساد پیدا کرنے والی مراری خلط یا نمکین بلغم کی وجہ ہے بھی ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)

کندر، گلنار، دم الاخوین، اقاقیا، حیوفسطیداس، افیون، کبریاء، صمغ، نشاسته، گل مختوم، صبح وشام اور نصف النہار میں آب سر د کے ہمراہ پلائیں۔ مقدار خوراک کرام ہمراہ ۱۹ گرام عرق بادروج، مریض کے سامنے گل ارشی یا گل مختوم رکھیں جے صاف کر کے چھکلے کے بغیر مصغ عربی میں گوندھ لیا گیا ہو اور تھوڑی کافور شامل کر کے خوشبو دار بنالیا گیا ہو تاکہ اس کے استعال ہے مریض حرکت کر سکے ۔ غذامیں پائے، پائے کے روغن، پید معز کے ساتھ پکائی ہوئی غذادیں، سینہ پر صندل، گلنار، گل سرخ، اور قاقیا کا ہمراہ عرق گل ب طلاء کریں۔ اس دن خون آنارک جائے گا۔ (مؤلف)

## قرص كبرباء نفث الدم مين مفيد ب:

کاربا، گلنار، گلاب، قافیا، رامک، طراشیث، صمغ عربی، کیترا، خشخاش، دم الاخوین، افیون، آب برسیال دارامیں گوندھ کرماءالشعیر کے ساتھ پلائیں۔ (یہودی)

بازومائل اشخاص (مجنون) میں گاڑھی ریاح کشرت سے پیداہوتی ہے اس سے نفث الدم کو مدد ملتی ہے۔ کیونکہ بہ کشرت گاڑھی ریاح سے رکیس بار بار پھٹتی ہیں۔ میر سے خیال میں حرارت غریزی کے کمزور ہونے سے ان میں بید عالت پید ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے دل چھوٹے اور سینے شک ہوتے ہیں۔ (بقر اط) منہ سے خارج ہونے والا خون، اوپر سے اور دماغ کے گوشہ سے آتا ہے یا تالو، حلق، خجر ہ، قصبة الرئد، سیند، مرئی، یامعدہ سے نفث الدم کامریض سرخ چیزیں ندد کھیے کیونکہ یاد آتے ہیں نفث الدم ہونے گئے گا۔ (جالینوس)

نفث الدم صدری عرق بادروج سے ٹوٹ جائے گا۔ صقالبہ ، دبلغر اور قسطنطنیہ کے درمیانی ملک خرز کے باشندے، نفث الدم کو توڑنے کے لئے بیخ قنطور یون کبیر کے جوشاندہ پر اکتفاکرتے ہیں۔ (روفس)

نفث الدم عرضی طور پر ضربہ، مقطہ وغیر ہیا بلا بستر کے زمین پر سونے سے اور جوہری طور پر بسیار خوری اور امتلائی کیفیت کے رونما ہو جانے سے ہوتا ہے۔ (جالینوس) نفث الدم جورگول کے منہ گھل جانے سے ہوتا ہے کثرت اخلاط کی وجہ سے یہ منہ کھلتے ہیں یا فاسد ہوجانے ہے،الیں صورت میں سوء مزاج د موی لاحق ہو تاہے یا پھر نفث الدم کی حالت تفرق اتصال کا نتیجہ ہوتی ہے۔(مؤلف)

جھا گُدار خون کا آنا پھیپھڑے ہے ہو تا ہے پھیپھڑ سے کے اندر قرحہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جھاگ دار خون آئے کیونکہ ایبا بھی ہو سکتا ہے کہ پھیپھڑ سے کی کوئی رگ پھٹ گئی ہواوراس کی وجہ ہے بلا جھاگ کاخون آجائے۔(جالینوس)

جھاگ دار خون شگاف کی وجہ ہے نہیں بلکہ ترقع ہے ہوتا ہے۔ کھائی کے ذرایعہ اس میں جھاگ آ جاتا ہے عورت کوخون کی تئے آ جائے اور چین جاری ہو جائے جس ہے خون کی تئے آ تابند ہو جائے توابیالاز با ہوتا ہے۔ اس حالت کے اندر اکتفاء کرتے ہوئے اطباء نے صافن وغیرہ کی فصد کھول دی ہے۔ پیپ تھوکنے کے بعد نفث الدم کا ہونار دی ہے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بیاری قرحہ کی جانب منتقل ہو چکی ہے۔ بخار کے بغیر خون کی تئے آئے تواپی صورت میں مریف محفوظ رہتا ہے۔ بخار کے ساتھ خون کی تئے آئے تواپی صورت میں مریف محفوظ رہتا ہے۔ بخار کے ساتھ خون کی تئے آنار دی ہے کیونکہ بخار نہ ہوگا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جبال سے نفث الدم ہور ہا ہے وہاں ورم نہیں ہے۔ یہ محض رگوں کے کھل جانے یا قرحہ کے سبب ہوا ہے۔ قرحہ بھی وہ جس میں ورم نہ ہو۔ جن قرحول میں ورم ہوتا ہے نہ بخاروہ قابض ادویات کے ذریعہ مسہل العلاج ہیں۔ ورم اور بخار کے ساتھ جو قرحے ہوتے ہیں ان کاصحتیا ہونا ممکن نہیں فر رہوتا ہاں ناس اضافہ ہوتا ہے اور فساد پیدا ہوتا ہے بھی ہوئے ۔ خون آ رہا ہوتو گو بخار نہ ہو گر بہاری طویل ہوجانے کی صورت میں بخار آ کر رہے گا۔

نفث الدم اور سل میں بکثرت استفراغ ممنوع ہے۔نفث کی قشمیں تین ہیں۔ البعض رگوں کامنہ کھل جائے۔(۲) کسی رگ میں شگاف ہو جائے۔(۳) کسی رگ میں فساد پیدا ہو جائے۔

رگوں کے کھلنے اور پھننے کا علاج قابض ادویات اور مغری اشیاء ہے کریں۔ مغری ادویات کے ساتھ جن دواؤں کے اندر سوزش پیدا کئے بغیر خشک کردینے کی صلاحیت موجود ہو انہیں استعال کریں۔ فساد عروق کا علاج عمدہ غذاؤں ، اور گوشت پیدا کرنے والی چیزوں سے کریں۔ نفث الدم کی ادویات میں بہی لازمی مطلوب ہو تا ہے۔ خون سینہ سے آرہا ہو تو لطیف الجو ہر ادویات کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں نفث الدم کی دواؤں میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ دواؤں کے اثرات کو پہونچا سکیں کیونکہ نفث الدم کی دوائی اپنا اثر ذراد ریم میں کرتی ہیں خون معدہ اور مرئی سے آرہا ہو تو نہ کورہ مخلوطہ کی ضرورت نہیں ہے۔

لطیف ادویات اس بیاری کی بیحد ضد ہوتی ہیں۔ انہیں شامل اس لئے کیا جاتا ہے کہ اثرات کو پہونچا سکیں۔ کیونکہ قابض اور لیسدار دوائیں نالیوں کو مسدود کر دیتی ہیں اور اثرات کم پہونچتے ہیں لہذا بدر قد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ کورہ دواؤں کے اندر مخدر ادویات بھی شامل کر دیتے ہیں تاکہ مریض سوجائیں اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کھانسی نہیں آنے پاتی۔ اس طرح افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہوتی ہیں۔ جاتی ہے۔ پھر اپنی برودت سے یہ خون کو گاڑھا کر دیتی ہیں۔ لہذا اس بات میں یہ عمدہ ثابت ہوتی ہیں۔ ان ادویات کی ترکیب میں بہی مقصود ہے۔

#### تفث الدم كے لئے قرص:

افیون۵کگرام، صمغ سوادوگرام، گلنار سوادوگرام۔ بیدا یک قرص کاوزن ہے۔خون پھیپھڑے

ے آرہاہو تواس میں دار چینی ۲.۲۵گرام ہے ساگر ام تک اضافہ کریں۔ (جالینوس)

نفٹ الدم کے مریض کو عصار ہُباد روج پلادیں تونفٹ الدم فوراً رک جائے گا۔ (روفس)

افیون کا کام بیہ ہے کہ پھلے ہوئے خون کو جماکر گاڑھاکر دے لہذا اندرونی اعضاء کے تمام نزف
الدم میں بیہ عمدہ ہوتی ہے۔ (حنین)

جوخون معدہ نے نکاتا ہے وہ کھانی کے بغیر نکاتا ہے۔ آلات تنفس سے جوخون نکلتا ہے اس میں کھانسی ہوتی ہے۔ حلق اور ہوتے ہے آنے والاخون کھنکھار کے ذریعہ نکلتا ہے جب کہ منہ کے میر ونی حصہ سے خون تھوک کے ذریعہ خارج ہو تا ہے۔

کو نکہ کھنکھارنے ہے منہ کے اندر جو چیز تہ نشین ہوتی ہوہ تھوک میں آ جاتی ہے۔ سر سے
آنے والا خون کھنکھارنے کے ذریعہ خارج ہوتا ہے بشر طیکہ توے کے باہر اتر تا ہواور کھانی اور بہ
کشرت پت کا محرک نہ ہو یکبارگی اوپر ہے آئے اور جس جگہ آئے وہ توے کے پیچے ہوتو خون کا اخراج
کھانی کے ذریعہ ہوگا۔ اس حالت میں ضروری ہے کہ اچھی طرح دیکھ بھال کرلی جائے تاکہ آپ وہ
غلطی نہ کر سیس جوخون کو آئے نفس ہے آتا ہوا لوگ گمان کر کے غلطی کر بیٹھے ہیں۔ ان حضرات نے
دیکھا ہے کہ بیاری بہت جلد شر وع ہوجاتی ہے تو قدیم حکماء پر بیا انزام عائد کر بیٹھے کہ وہ پھپچر ہے
دیکھا ہے کہ بیاری بہت جلد شر وع ہوجاتی ہے تو قدیم حکماء پر بیا انزام عائد کر بیٹھے کہ وہ پھپچر ہے
ہے پیدائفٹ الدم کو عمیر العلاج بیان کرتے ہیں تفصیل ہے ہے کہ خون جب سر ہے آتا ہے بالحضوص
جب کہ مقدار میں ہواور کوئے کے پیچے اتر باہواور تو خجز ہ میں بہونچ کر کھانی پیدا کر رہا ہوتو یہ گمان
موتا ہے کہ اس کا تعلق آلات تغض ہے۔ دونوں حالتوں کے در میان فرق یہ ہے کہ پھپچر ہے۔
خارج شدہ خون جھاگ دار ہوتا ہے گر سرکی جانب ہے آنے والا خون ایسا نہیں ہوتا نیز قصبة الرئے

ے کوئی چیز بھی خارج ہوتی ہے جواس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ خون کا تعلق پھیپھڑے سے
ہادراس بات ہے بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ آیا قبل ازیں کھانی کے ذریعہ خون تھوڑا، یکے بعد
دیگرے تھوڑی بار آیا پھر کھانی کے ذریعہ کثرت سے آیا؟اس میں بید دلیل بھی ہے کہ اس طرح ک
عالت پھیپھڑ ہے کے فساد کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے نیز پھیپھڑ ہے ہے خون آنے میں درد نہیں ہو تا
کیونکہ یہاں خون دماغ کے چھٹے عصبی جوڑے سے آتا ہے بید دماغ کی کھال میں تقسیم ہو جاتا ہے اور
گوشت کے اندر قطعاً دھنتا نہیں ہے ۔ بینہ سے خون آنے میں درد اس لئے ہوتا ہے کہ یہال
عضلات اور بکثرت اعصاب ہوتے ہیں کی شخص کے سینہ میں در د ہوائی کے ساتھ ایسا خون تھو کیا
ہوجونہ زیادہ ہونہ سرخ ہو بلکہ سیاہ ہو گیا ہو اور منجمد ہو کر تھکے کی صورت اختیار کرلی ہو تو ہے سمجھیں کہ
اس کا سینہ بیار ہے۔

معدہ ہے آنے والاخون صاف ہوتا ہے۔ کی شخص کوخون تھوکتے دیکھیں گرسر میں در دہونہ بوجہ ،نہ کی چوٹ کی علامت، تو بھی ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی جونک منہ کے اندر لیٹ گئی ہو۔ معدہ ہے اس وقت بھی خون آجاتا ہے جب کوئی شخص جونک نگل لیتا ہے۔ البتہ آنے والاخون پیپ جیسا اور رقیق ہوتا ہے۔ خواہ وہ معدہ ہے آتا ہو یاناک ہے یا کی اور جگہ سے یعنی جونک والاخون۔ یہ صورت حال ہوتو مریض سے ظاہری سبب دریافت کریں۔ جواب دیتے ہوئے وہ کے گاکہ پانی پیتے وقت کوئی چیز اندر چلی گئے۔ لہذا آفتاب کی روشنی میں دونوں نھنوں اور منہ کامعائنہ کرلیں۔

پھپچروں کی رگوں میں پھٹن چند چیزوں کے ذریعہ روشی میں آتی ہے۔ایک یہ آنے والاخون زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔دوسرے یہ کہ پیشتر چیخ وپکار، عظمیا ضربہ کی کیفیت پیش آپکی ہو، خاص کراس وقت جب یہ حالت غیر متوقع طور پر پیش آگئی ہو۔ پھپچرااس کے لئے تیار نہ رہا ہواور اس کا زیادہ نرم حصہ اس کی زد میں آگیا ہو۔ چیخ اور آواز آہتہ آہتہ ہو تو پھپچرے کو وہی حالت پیش آتی ہے جو کشتی لڑنے والوں کے اعضاء کی ہلکی مالش سے پیش آتی ہے۔ یہاں رگوں کے اندر شکاف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آواز کے جو لوگ عادی ہوتے ہیں وہ مناوی وغیرہ کی طرح ہوجاتے ہیں۔ انہیں نہ کورہ حالت پیش نہیں آتی۔ رگوں کا منہ کھل جانے سے جو نفث الدم ہوجاتے ہیں۔ انہیں نہ کورہ حالت پیش نہیں آتی۔ رگوں کا منہ کھل جانے سے جو نفث الدم پھپچر ہے۔ ہوتا ہے اس سے پہلے بیکاری، گرم حمام، گرم ملک اور گرم غذاؤں کے استعال کی با تیں پوچھنے پر ملتی ہیں۔ (جالینوس)

مریض کے اندر قوت برداشت ہو تو دونوں اکل کی فصد کھول دیں اور دیکھیں کہ سینہ کے کسی مقام پر بوجھ اور درد زیادہ محسوس ہورہاہے۔ چانچہ وہاں فصد کھول دیں۔اس کے بعد ہاتھ اور

پیروں کو باندھ کر گرم روغنیات سے مالش کریں۔ قابض غذائیں دیں۔اس سے نفث الدم رک جائے گا۔ نفث الدم کا تعلق معدہ سے ہو تو قابض ادویات استعال کریں ساتھ میں بعض ایسی دوائیں شامل کر دیں جو معدہ کو خو شبود ار کر دیں۔مشلا قرنفل وغیرہ۔سینہ سے خون آرہا ہو تو قابض دواؤں کے ساتھ لطیف چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دواؤں کے اثرات مقام ماؤف تک پہونچ کیس۔ نیز مخدرات کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مریض سوسے اور کھانسی میں سکون ہو۔ فلونیا اس کے لئے عمدہ ہے۔ پوست انار جلا کر سرکہ میں ملائمیں اور نفث الدم کے مریض کے سینہ پر طلاء کریں یا تخم کتال، صبر ،افیون،شب،زاج،سرکہ میں ملاکر طلاء کریں۔(اُہرن)

#### خون کے باب میں:

خون معدہ یا جگرے ضربہ جیسے خارجی سبب یار گوں کے بھٹنے اور فاسد ہونے کی وجہ ہے آتا ہے۔ (فرق ظاہر نہیں کیا ہے)خون کہیں ہے بھی آرہا ہو تو اس کے لئے سب سے پہلے باسلیق کی فصد کھولیں۔ اس کے بعد کہریاءاور گل ارمنی مختوم کی نکیاں بارش کے پانی میں ڈال کر طباشیر کے ساتھ پیسیس۔

صمغ لوزرودی ۵. اگرام، کهرباء ۷، بسد ۷، دهنیا ختک ۷، طباشیر ۷، گردساق ۷، مخم رجله ۷، گان ۷، کی استیس ۷، نثاسته ۷، شاخ گوزن سوخته ۷، اتا قیامغول ۷، شب یمانی ساڑھ ۱۰ گرام، افیون ۷ گرام مقدار خواراک ۵. ۱۰ گرام جمراه آب بارال ۷ کھانے میں چاول مسور مقشر، اور رجله دیں۔ معدہ اور جگریر قابض مخت مختار کھیں۔

منہ ہے خون کا لکلنا تے کے ذریعہ ہے ہو تو اس کا تعلق معدہ اور اس کے اطراف ہے ہوتا کے ہوتا ہے۔ قئے کے ساتھ ان کا مقامات پر در دہوتا ہے اور اگر خون کا تعلق آلی تنفس ہے ہوتو یہ کھانی کے ذریعہ نکلتا ہے۔ اس میں در دسید ، اور حلق کے آگے ہوتا ہے۔ کھنکھار کے ذریعہ خون خارج ہوتو اس کا تعلق تالو کے بالائی حصہ وغیرہ ہے ہوتا ہے۔ اس میں در دسر کے اندر ہوتا ہے۔ آلی نفس سے خارج ہونے والاخون یا تو پھیچر ہے ہوگایا سینہ کی تجویفوں ہے ، سینہ ہے آنے والاخون مائل بہ سابی ہوگا۔ یہ جماہوا اور گاڑھا ہوتا ہے کیونکہ طویل مسافت طے کرکے آتا ہے ای لئے مجمد ہوجاتا ہے پھیچر ہے ہے آنے والاخون پتلا اور چیکد ار ہوتا ہے۔

کھانی کے ذریعہ خارج ہونے والا جھاگ دار خون اس بات کی علامت ہے کہ پھیپراے کے

اندرزخم ہے کیونکہ خون پتلااور مائل بہ سفیدی ای وقت ہوتا ہے جب پھیچر ہے گوشت میں زخم ہوتا ہے۔ جھاگ دار سفید خون انجام کار میں لامحالہ پیپ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ کھانسی کے ذریعہ چسکدار اور سرخ خون خارج ہوتواس کا تعلق پھیچر ہے گی شریانوں ہے ہوتا ہے۔ امتلاءاور فساد کی وجہ ہے بشریانیں جب پھٹتی ہیں تو یہ صورت حال پیدا ہوتی ہے۔ رکیس فاسد ہوجاتی ہیں تو خون سرخ نہیں سیاہ ہوتا ہے۔

ند كوره بالا كيفيتول كاعمومي علاج يه ب كه قابض، چيكانے اور ختك كرنے والى دوائيں استعال کی جائیں۔اس کے ساتھ کچھ لطیف چیزیں بھی اثرات کو پہونچانے کے کئے شامل کی جائیں۔نفث الدم كا تعلق مرئى وغيرہ سے ہو توگرم لطيف اشياء كى نہيں بلكہ تھوڑاحس كوسكون پہونچانے كے لئے مخدرات کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ مقامات بیجد حساس ہوتے ہیں۔ابتدا فصدے کریں، جسم پر غالب کیموس کو کم کریں، مریض کو کم بولنے کی تاکید کریں، وہ بیٹھے یاسوئے تو تن کر رہے تاکہ سینہ کے بعض جھے بعض حصول پرنہ آپڑیں۔ایی صورت میں کھانی میں تحریک ہوگی اور مقام ماؤف کا اندمال مشكل ہوجائے گا۔خون تالوے آتا ہو توسر پر قابض اور سر د دوائيں رتھيں اور اس بات كى تدبیر کریں کہ خون جذب ہو کر تالواور پھر ناک کی جانب آ جائے بشر طیکہ اس کاامکان ہو سینہ سے خون آنے پر سینہ کے اوپر پوست کندر، پوست انار، گلنار، گرد چکی، وغیرہ سے تیار کردہ ضادر تھیں۔ بارداور مرطوب تدبیر ایسے مریضوں کے لئے جو حدت دم کی وجہ سے خون تھو کتے ہیں مفید ہیں۔ رگول کے اندر شگاف سخت مصنڈک اور چوٹ سے پیدا ہو تا ہے۔ سخت مصنڈک کی وجہ سے آئے ہوئے شگاف میں زم تہمید سے کام لیں، مغری دوائیں مصالحہ جات کے پانی کے ہمراہ استعال کریں۔ نفث الدم میں بارش کایانی مفید ہے یاوہ نسخہ مفید ہو تا ہے جس میں گلاب، طباشیر اور گل ار منی شامل کی گئی ہو۔ حرارت کی وجہ سے نفث الدم ہو تو ابتدامیں فصد سے کام لیں۔صفر اء کا بار بار مسہل دیں، پیہ بنیادی علاج ہے۔اس کے بعد ماءالشعیر وغیرہ جس سے خون کے اندر تبریداور تعدیل ہوتی ہو پلائیں۔ نفث الدم میں شاذنہ ۵ گرام غبار کی طرح بنا کر بلائی جاتی ہے۔ بیمفید ہوتی ہے۔ سینہ پرخصنڈے صادر تھیں۔ مفر دادویات:

تلخ ادویات نفث الدم میں نقصان دہ ہیں چو تکہ یہاں قاطع کی نہیں قابض اور مغری ادویات کی ضرورت ہوتی ہے (سر ابیون)۔

بعض حالات کے اندرورم جگر کی وجہ سے نفث الدم ہو تا ہے۔اس کا تذکرہ جالیونس نے نہیں کیا ہے۔(ارسطر اطیس)

# تيسراباب

سینہ اور پھیپھڑے سے پیپ تھو کنا، سل، رئہ کاورم حار، رئہ قصبۃ الرئہ اور سینہ کے تمام مقامات میں قرحوں کے اندر پیپ پڑنا و جمع ہو جانا، سینہ کی فضااور اورام کے اندر پیپ کا جمع ہونا، سینہ، پھیپھڑے اور آلات تفس سے نفث الدم، پھیپھڑے کا نکل آنااور اس کاسوء مزاج۔

ذات الرید، ذات الجنب، اور نفث الدم کوسل سے الگ کر ناضر وری ہے کیو نکہ سل ایک ایسی بھاری ہے جو مذکورہ کیفیات، نزلول اور طویل کھانی کا لازمہ ہوتی ہے اور بلکے طویل بخارول اور طحلیل اعضاء (اعضاء کا بجھان) کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ لہذا سل کی علامات وغیرہ کا الگ سے ایک باب ہونا ضروری ہے۔ چاہیں تو اس پر غور کرتے رہیں کیونکہ ایسازیادہ تر ہوتا ہے کہ ذات الریہ سل کے بغیر پڑار ہتا ہے۔ چاہینوس نے اندرونی زخمول کے باب میں جو کچھ کہا ہے اس کاذکر ہم نے بھی کر دیا ہفیر پڑار ہتا ہے۔ جالینوس نے یہال لاکر کیا ہے تاکہ علاج اور علامات سب اکھٹا بیان ہوجا کیں۔ ہو۔ اس کا تذکرہ جالینوس نے یہال لاکر کیا ہے تاکہ علاج اور علامات سب اکھٹا بیان ہوجا کیں۔ کھانی کے ذریعہ خون کا آنا معدہ ہے ہوتا ہے ایم کی ہے۔ کھانی کے ذریعہ خون آتا ہے۔ بار ہامشاہدہ ہوچکا ہے کہ سرے بکشرت خون سرے نیچ آتا ہے بالحضوص جب کہ طاق آس پاس کوے سے داخل ہو کرگر تا ہے تو مریض خون تھو کتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت خون خجرہ کے اندر آتا ہے تو کھانی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہاں اچھی طرح غور کرے دیکھ لیس تاکہ تیزی ہے کے اندر آتا ہے تو کھانی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہاں اچھی طرح غور کرے دیکھ لیس تاکہ تیزی ہے خون بلا کی تکلیف کے بند ہو جائے تو جاہلوں کی طرح یہ گمان نہ ہوسے کہ اطباء حاذ قین کا یہ خیال کہ خون بلا کی تکلیف کے بند ہو جائے تو جاہلوں کی طرح یہ گمان نہ ہوسے کہ اطباء حاذ قین کا یہ خیال کہ خون بلا کی تکلیف کے بند ہو جائے تو جاہلوں کی طرح یہ گمان نہ ہوسے کہ اطباء حاذ قین کا یہ خیال کہ خون بلا کی تکلیف کے کہ اطباء حاذ قین کا یہ خیال کہ خون بلا کی تکلیف کے بند ہو جائے تو جاہلوں کی طرح یہ گمان نہ ہوسے کہ اطباء حاذ قین کا یہ خیال کہ

کھانی کے ذریعہ خون کا فکلنا خراب بیاری ہے بیہ باطل خیال ہے کیونکہ پھیپھڑے کے اندر نہایت سخت آفت آچکی ہوتی ہے کیونکہ ایس حالت میں کی چھوٹی رگ کاٹونما ممکن نہیں ہوتا ہے ہایں ہمہ یہ ممکن ہے کہ کھانی کے ذریعہ عروتی فساد کی وجہ سے اجابک بہ کشت خون چڑھ آئے ۔ تھوڑے تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد انسان خون تھو کتا ہے تو اس کے بعد یہ حالت پیش آسکتی ہے کہ چڑے وپکاراور سقلا کے فاہری سبب کے بغیر بھی انسان کثرت سے خون تھو کئے گئے ۔ بعض او قات اس حالت میں کا توجہ ہے جائزہ لے اور دیکھے کہ آیا خون کی طابیب کے لئے ضروری ہے کہ نکلنے والے خون کا توجہ ہے جائزہ لے اور دیکھے کہ آیا خون کی ماتھ کوئی چیز بھی شامل ہے نیز کیا خون جھاگدار ہے۔ جھاگدار خون اس بات کی سب سے بڑی ولیا ہے کہ خون نہیں ہوتا کو گئے ہے ہے اس طرح نہیں ہو خون خارج کر نے والے مربی ہو حصہ ، عروتی طبقات کی کوئی چیز یا چھپھڑے کے گوشت کا کوئی کھڑاموجو د ہو تو یہ حصہ ، عروتی طبقات کی کوئی چیز یا چھپھڑے کے گوشت کا کوئی کھڑاموجو د ہو خون خارج کرنے والے مربیض کو پچھے بھی درو نہیں ہوتا کیونکہ سینہ میں اعصاب زیادہ اور پھپھڑے سے خون خارج کرنے والے مربیض کو پچھے بھی درو نہیں ہوتا کیونکہ سینہ میں اعصاب زیادہ اور پھپھڑے سے جو جاتے ہیں آگے نہیں بڑھے گردن تک پھلتے نہیں ہے ۔ سینہ کی اندر کشت سے اعصاب ہوتے ہیں آگے نہیں بڑھے گردن تک پھلتے نہیں ہے ۔ سینہ کے اندر کشت سے اعصاب ہوتے ہیں تی تم کوئی معندات کا مجموعہ ہوتا ہے ۔ بھی جہ سے بیاں شدید حس ہوتی ہے ۔ پھر یہ سخت ہوتا ہے اور چھپھڑا ازم ہوتا ہے ۔ مدافعت نہیں کر تاای لئے اس میں درد کم ہوتا ہے ۔ پھر یہ سخت ہوتا ہے ۔ بھی وجہ ہوتا ہے ۔ پھر یہ سخت ہوتا ہے ۔ پھر یہ سخت ہوتا ہے ۔ پھر یہ سے خور ہوتا ہے ۔ پھر یہ سخت ہوتا ہے ۔ پھر یہ سے ہوتا ہے ۔ پھر یہ سخت ہوتا ہے ۔ بدتا ہوتا ہوتا ہے ۔ دانوت نہیں کی تو تا ہے ۔ بدتا ہوتا ہے ۔ دانوت نہیں کی تو تا ہے ۔ دانوت نہیں کی تو تا ہے ۔ دانوت نہیں کوئی کی تو تا ہے

سینہ کے کسی بھی حصہ میں انسان درد محسوس کرے، ساتھ ہی کھانسی کے ذریعہ خون بھی تھو کے مگر خون زیادہ مقدار میں نہ ہوسر خ ہو، بلکہ سیاہ ادر منجمد ہو کر تھکا بن چکاہو توالی صورت میں بیاری سینہ کے اندر ہوتی ہے۔ سینہ سے بھیچرٹ کے اندر خون ای طرح آ جاتا ہے جس طرح پیپ آ جاتی ہے۔ نفث الدم کے بعد زخم پیدا ہوتے ہیں، جو زخم پھیچرٹ کے اندر ہوتے وہ مشکل العلاج ہوتے ہیں یااصلا آن سے صحت نہیں ہوتی۔ سینہ کے زخموں کا حال ہے ہے کہ اس میں اکثر رگیں جو پھنتی ہیں وہ باریک ہوتی ہیں۔ سینں سے خون آتا ہے۔ مز من ہونے کے باوجو دیہ مند مل ہوجاتی ہیں بہذا ہے زخم ایسے نہیں ہیں کہ صحتیاتی ان سے مشکل ہو۔

پھیپرٹ کے زخم گو کسی وقت درست ہوگئے ہوں مگران کی مدت دراز ہو جاتی ہے تو سینہ کے اندرا کی۔ خت فتم کاناصور کی بقایا موجو درہتا ہے جس پرایک پرت پڑجاتی ہے جو معمولی سبب سے کھل جاتی ہے چنانچہ نفث الدم دوبارہ ہونے لگتا ہے۔ آلات غذائی سے اوپر آنے والے تمام خوان تے کے ذریعہ اوپر آتے ہیں کھانسی کے ذریعہ نہیں۔ جائزہ لے کر دیکھ لیس ہوسکتا ہے حلق کے اندر کوئی

جو تک لبٹی ہو۔ کسی شخص کو دیکھیں کہ مسلسل خون تھوک رہا ہو سابق میں بھی کوئی در دمحسوس کیا ہو
نہ سر میں بوجھ ، نہ اسے چوٹ آئی اور اس وقت بھی اسے در دمحسوس نہ ہورہا ہو تو اس کے نتھنوں کا
جائزہ لے لیس اور حلق کو بھی روشنی میں دیکھ لیس، جائزہ اچھی طرح لیس ہو سکتا ہے ایسی حالت
یہال کسی جو نک کے لیٹ جانے سے پیدا ہو گئی ہو۔ مریض سے پوچھ لیس کہ کوئی ایساپانی تو نہیں پیاتھا
جس میں جونک رہی ہو۔ (جالینوس)

منہ سے خون یا تئے کے ذریعہ لکاتا ہے یا کھانی کے ذریعہ یا ملکے طور پر یا تخق کے ساتھ کھنکھارنے کے بعد۔ کھانی کے ذریعہ لکلنے والاخون چھپھڑے سے تعلق رکھتا ہے یا سینہ سے۔ تئے کے ذریعہ آنے والاخون مری، فم معدہ یا تعر معدہ سے آتا ہے۔ یہ صورت حال پھپپھڑے ہیں نہیں ہوتی کیونکہ قصبۃ الرئے کے اندر کوئی ایسی رگ نہیں ہوتی جس سے معتد بہ مقدار میں خون لکلے کھنکھارنے سے خون کا آتا یا تو کؤے، حلق اور اطراف حلق سے ہوتا ہے یاسر سے آتا ہے۔ جائزہ لے کر دکھے لیس پھر اس کے مطابق تدبیر کریں۔ اس کاذکر ہم باب المعدہ میں اور کھنکھارنے کے ذریعہ خون کے آنے کاذکر باب الحلق میں کریں گے۔ (مؤلف)

پھیچرہ نے اندر کی وقت بھی شدید در دنہیں ہوتا۔ باتی ہو جھ کااصاس اس جگہ بہت ہوتا
ہے۔ تاؤکااحاس تو عظم القص تک اور یہال عظم الصلب تک پہنچا ہے کیونکہ پھیچرہ کی جھلیال
اس جگہ باہم مر بوط ہوتی ہیں۔ جھاگ دار خون کے ساتھ سینہ کے اندر بوجھ کے اور تیزی بخار بھی ہو
توالی صورت میں پھیچرہ نے کے اندرورم حار ہوتا ہے۔ بوجھ کم ہو،ای طرح ضیق تفن بھی کم ہوگر
التہاب تیزاورنا قابل ہر داشت حد تک ہو تو پھیچرہ نے اندرورم کاپیۃ دیتا ہے ای کی حمرہ کہتے ہیں۔
فون زیادہ آئے یا کی ظاہری سب کے بعد آئے تو یہ پھیچرہ نے کی کسی رگ کے کھل جانے کی
علامت ہے۔ شریانوں کو زیادہ تر تیز آواز کھول دیتی ہے۔ بشر طیکہ تیز آواز رفتہ رفتہ نہ ہو کیونکہ رفتہ
تیار ہوجاتا ہے ورنہ جسم میں بھٹ جا کیں۔ سے حالت تیزی سے ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو تیز آواز
تیار ہوجاتا ہے ورنہ جسم میں بھٹ جا کیں۔ سے حالت تیزی سے ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ گئی تیز آواز
ہیں جیسا کہ ریاضت کے جو حضرات عادی ہوتے ہیں تو ان میں رگیں کم پھٹی
ہیں جیسا کہ ریاضت کے جو حضرات عادی ہوتے ہیں تو ان میں رگیں کم پھٹی
ہیں جیسا کہ ریاضت کے جو حضرات عادی ہوتے ہیں وہ اس کے کم شکار ہوتے ہیں۔ رگیں خت شعنڈک عور وتی طبقات کو محموس بناد ہی ہے۔ یہ مشکل سے پھیل
ہیں۔ اس طرح یہ طبقات پھٹنے کیلئے تیار ہوجاتے ہیں۔
ہی تو جونون شور وہنگامہ اور چوٹ کے ظاہری سبب کے بغیر اور کشرت سے گرم یائی کے تیام،
ہی جونون شور وہنگامہ اور چوٹ کے ظاہری سبب کے بغیر اور کشرت سے گرم یائی کے تیام،

گرم ملک کے اندر قیام اور گرم ماکولات ومشروبات کے استعال سے تھوکنے میں خارج ہوتا ہے وہ پھیپر سے کی رگوں کے سینے سے خارج ہو تاہے۔ تھوڑا تھوڑا خون تھوکئے کے بعد دفعہ زیادہ مقدار میں خون خارج ہو جائے اور ساتھ میں پھیپیراے کے کچھ اجزاءیائسی زخم کے چھلکے بھی آ جائیں تواس کا صحتیاب ہونا ممکن نہیں ہے زخم اگر قصبة الرئد میں ہو تو مریض کو در دمحسوس ہوگا۔ پھیپھرے میں ہونے کی صورت میں در د نہیں ہو تا۔ نیزنفث الدم بھی تھوڑ ابی ہوگا۔ قصبة الرئدے خوان آنے میں بھی در دزیادہ سخت نہ ہو گا۔ بہر حال در د ہو گا مگر پھیپر اے سے خون آرہا ہو گا تو در د بالکل نہ ہو گا۔ سل کی ایک اور قتم ہے جس کی ابتداء نہ نفث الدم ہے ہوتی ہے نہ پھوڑوں ہے۔ یہ بہت کم

میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اجاتک کھانسے کے بعدر قبق مراری خلط خارج کی۔ بیہ خلط شوخ سرخ اور زر د کے مابین تھی اس کے ساتھ حدت قطعانہ تھی ای طرح کی خلط وہ بر ابر خارج كرتار ہا۔اس كے بعد اے ہكا بخار رہے لگا۔ پھر اے دق ہو گيا۔ بعد ازال كھائى كے ذريعہ اس نے تھوڑی پیپ خارج کی۔ چار ماہ کے بعد پیپ کے ساتھ اس نے تھوڑاخون خارج کیا۔ جس کے بعد جسم بَیْھلناشر وغ ہوااور بخار بڑھنے لگا۔ طافت گھٹے لگی اور سل ز دہ مریض کی طرح اس کی و فات ہو گئی۔

ای طرح کچھ اور مریض سامنے آئے۔ میں نے ہر چندان کاعلاج کیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ یہ تمام مریض پھیپرے سے ایسے مکڑے خارج کرتے رہے جو متعفن تھے۔اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے پھیپیروں کے اندر ای طرح کی متعفن حالت پیدا ہوگئی جو خارج میں پیدا ہو جاتی ہے۔البتہ پھیپر سے کے اندر آپریش کرنااور اے داغناخارجی اعضاء کی طرح ممکن نہیں ہو تا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مریض ہلاک ہوجاتے ہیں۔ایک تیسرے مریض پر میں نے بڑی توجہ کی۔شموم اور ماکول و مشروب کے ذریعہ اس کے پھیپھڑے کو ہری طرح خشک کرناشر وع کیا۔ چنانچہ دن بھراہے اندر وخور دن نام كى دواسو تلهن او رسوتے وقت خوشبودار روغنيات كى نتفنول ير مالش كرنے كا تعلم ديامشرود يطوس، امر وسیا، اُٹاناسیااور تریاق پلایا گریہ مریض ایک سال کے بعد مرگیاغالبًازیادہ دیر تک زندہ ند کورہ تدبیر کی وجہ سے اور موت کے معین وقت کے باعث رہ کا۔ (جالینوس)

پھیپھڑے کے زخم تر ہوں تو معالج کا کام یہ ہے کہ انہیں مندمل کرے۔ پرانے ہو جائیں تو انہیں خٹک کرنے کا اہتمام کرے۔ میرے خیال میں دودھ اس حالت میں مفز ہے۔اس کا فائدہ شروع میں ہو تاہے۔(مؤلف)

رگول کے کھل جانے ہے جونفث الدم ہو تاہے وہ انجام کے اعتبار سے نفث الدم کی قسمول

میں داخل ہے اس کاعلاج ممکن حد تک فصد کھولنااور جسم کو ٹھنڈک پہو نچانا ہے۔ نیز اس حالت میں مبر داور مغری ادویات استعمال کی جائیں۔(مؤلف)

نفث الدم ریوی، چوٹ، چیخ و پکار، از حد ہرودت، اور گرم غذاو وَل، حرارت امتلاء، کشرت حمام ، یابالفعل گرم ماکول ومشروب کی وجہ ہے رگوں کے منہ کھل جانے ہے واقع ہوتا ہے۔
نیزیہ نفث الدم عروتی فساد ہے بھی ہوتا ہے جوگرم مزاج اور خمکین بلغم ہے رونماہوتا ہے۔
مریضان سل کی آئکھیں دھنس جاتی ہیں تاک کے کنارے تیز ہوجاتے ہیں، کنپٹیاں چپک جاتی ہیں۔ دونوں شانے اور کہنیاں ابھر آتی ہیں۔ ایسالگتا ہے جے معلق ہوگئی ہوں۔ دونوں پنگھوں کی طرح جسم ہے الگ نمایاں ہوجاتی ہیں، ناخون میز ھے ہوجاتے ہیں۔ (جالینوس)

طری بیم سے الک تمایاں ہو جائی ہیں، ناخون سیر سے ہو جائے ہیں۔ (جابیوں) ای کو مجنج سمجھیں کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تہنیاں پہلوؤں سے دور ہو جائیں۔ یہی عجھے (پر)کی شکل ہوتی ہے۔(مؤلف)

مر یضان سل کا تنفس بد بودار ہو تاہے۔

پھیپر کے زخم مزمن ہو جائیں اور تیزی ہے مند مل نہ ہول تو انہیں لطیف، اور خشک کردینے والی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ زخم خشک ہو جائے۔ مریض کے رہنے کی جگہ خشک مقام ہو۔ای طرح کی تدبیری اختیار کی جائیں اورای طرح کی ادویات استعال کی جائیں تو مریض کی عمر اللہ کے حکم ہے بڑھ جائے گی۔ ان ادویات میں سب سے پہلی دوااندروماخش ہے جو طقومی ادویات میں داخل ہے۔اے دار چینی، سنبل، زعفران، ساذج، لبان، مر، اذخر، جیسی لطیف و قابض رب السوس جیسی مغری اور بنج اور افیون جیسی مخدرادویات کے ساتھ مرکب کریں، نزلہ زیادہ ہواور تکلیف دہ ہو تو مخدرات میں اضافہ کردیں۔ ای طرح سخت تکلیف دہ خشونت موجود ہو تو مغری ادویات میں اضافہ کریں۔

#### عده دواكانسخه:

دار چینی ۳۷.۵گرام ، کندر ۳۷.۵گرام ، عصاره سوس ۳۷.۵گرام ، مر ۱۸گرام ، کیتر ۲۷ گرام ، حماما ۱۸گرام شهد خالص بفدر ضرورت \_

یہ در حقیقت ایک عمدہ دوااس مخف کے لئے ہے جس کے پھیپر وے بیں زخم ہو نیز پھیپر وے
کے تمام مز من امراض میں یہ مفید ہے کیونکہ دار چینی کاجو ہر لطیف اور مجفف ہو تا ہے۔ حماما کا اس
کے بعد دوسر انمبر ہے چونکہ یہ دونون شکی پیدا کرتی ہے ہیں لہذا اس کے ساتھ عصارہ سوس اور کیتر ا
شامل کیا گیاجو مغری میں ، مر ورز عفران تج پیدا کرتے ہیں تحلیل کرتے ہیں اور تھوڑی خشکی لاتے ہیں۔

## ان دواؤل میں جن کو پھیچرے کے زخم خشک کرنے کیلئے تیار کیاجا تاہے، حسب ذیل دوائیں شامل ہیں:

دار چینی، سلیجه ،مر ،زعفران ،نورسته کلی اذ خر ،روغن بلسان ،سنبل ،حماما، کندر ،گلنار ،لیجة السنیس ، سک ،گل مختوم ،صمغ ،افیون ، بنج ، مغاث ،وغیر ه۔

لطیف مدر بول تخموں ، مصالحہ جات ، مغری اور تھوڑی مخدر ادویات سے مرکب دوائیں «تصبیحورے کے زخموں میں مفید ہیں۔

#### پھیچرے کے زخمول میں مفیدامیر وسیاکانسخہ:

سنبل ١٠، زعفران ١٠، مر ١٠، قبط ١٠، سليجه ١٠، دار چيني ١٣ گرام ، اذ خر ١٠، فلفل سياه ١٠، فلفل سفيد ١٠،

#### 71

جند بیدستر ۳، زراوند ۳، صمغ بطم ۳، میعه ۳، مختم بنج سفید ۳، انیسون ۴٫۵ گرام، مختم کر فس۵٫۳ گرام، کیترا ۲۷ گرام ، ۱۳۷ گرام شراب کے اندر کیتر اکو حل کریں۔ تمام دواؤں کو شہد میں شامل کرلیں۔ مقدار خوراک ۷ گرام ، بخار کی صورت میں پانی اور سر کہ ، ورنہ ماءالعسل کے ہمراہ۔

#### پھیچرے کے زخموں کو خٹک کرنے کی عمده دوا:

طرامیت ۲۵گرام ، مر۲۵گرام ، جند بیدستر ۲۱گرام ، کندر۲۵گرام ، عصاره ساق ۳۳گرام ، میکبنج ۲۱گرام ، کندر۲۵گرام ، خصاره ساق ۳۳گرام ، سکبنج ۲۱گرام ، انیسون ۳۲گرام ، افیون ۲۸گرام ، خخم کرفس ۲۸گرام ، جاوشیر ۸اگرام ، خخم بخم کرام ، بوست معید ۲۸گرام ، فراسیون ۵. ۴ گرام ، بوست بیرون ۳۵گرام ، فراسیون ۵. ۴ گرام ، بوست بیرون ۳۵گرام ، دار فلفل ۲۸گرام ، فلفل سفید ۸اگرام ، رای الحمام ۵ . ۴ گرام ، شهد بقد رضرورت بیرون ۳۵گرام ، دار فلفل ۲۸گرام ، فلفل سفید ۸اگرام ، رای الحمام ۵ . ۴ گرام ، شهد بقد رضرورت ب

#### نفشالدم كے لئے:

ا۔ نفث الدم زیادہ ہونے پراستفراغ ممنوع ہے۔

السند کا علاج ہے کہ مقام ماؤف پر گوشت اُ گ آئے، رگول کا کھلنا، پھٹنا، یا فاسد ہو جانا ہے۔ عروقی فساد کا علاج ہے کہ مقام ماؤف پر گوشت اُ گ آئے، رگول کا منہ قابض ادویہ سے بند کیا جائے، رگول علی شکاف ہونے پر گل بخیرہ جیسی مند مل کرنے والی ادویہ استعال کی جائیں۔ فاسد مقام پر گوشت الی دواؤل ہوں۔ سینہ اور پھیچرٹ کوشت الی دواؤل سے آلتا ہے جو جید الکیموس ہول اور گوشت اگانے والی ہوں۔ سینہ اور پھیچرٹ سے پیپ آنے میں فہ کورہ دواؤل کے ساتھ گرم لطیف دوائیں شامل کی جائیں تاکہ اثرات پہو پی سکیں، گویہ لطیف دوائیں بیچد خراب اور نفث الدم کے مخالف ہوتی ہیں گر دیگر دواؤل کے اثرات پہو نچانے کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔ معدہ اور اطراف معدہ سے خون آنے میں ان دواؤل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فہ کورہ بالادواؤل کے اندراس قدرسر دادویات بھی شامل کر دی جاتی ہیں، جو سن کردیے کی حد تک نہیں ہوتی ہیں۔ یہ دوائیں ہرودت پہونچا کر مفید ہوتی ہیں نیز گہری نیند لاتی ہیں، کردیے کی حد تک نہیں ہوتی ہیں۔ یہ دوائیں ہرودت پہونچا کر مفید ہوتی ہیں نیز گہری نیند لاتی ہیں، جس سے فائدہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے کھائی میں سکون بھی ہوجا تا ہے۔ اس سے کھائی میں سکون بھی ہوجا تا ہے۔ خون کا بہاؤ بھی رک جس سے فائدہ اور گاڑھا ہوجا تا ہے۔ اس سے کھائی میں سکون بھی ہوجا تا ہے۔ بیر ہو نیا ہوجا تا ہے۔ بیر ہیا ہوتی اللہ میں دواؤل کا ضابط، مثلاً عصارہ لیجی استیں، دوس اللس، گنار، قبایہ، مازو، گل مختوم، صمع عربی، کہرباء، نشاستہ، افیون، ختم خشخاش، نخ، مر، دار چینی، سلیحہ، قرص بناکر شربا استعال کریں۔

#### نفث الدم كي دواتين:

افیون ۲۷گرام، صمغ عربی ۵. ۳گرام، نشاسته ۲.۲۵گرام، قاقیا۲.۲گرام - بید ایک خوراک بے نوش کریں۔ بید معدہ کے لئے موزوں ہے۔ ان میں تھوڑی دار چینی شامل کردی جائے تو پھی پھیچر دے کے لئے موزوں ہوجائے گی۔ نفث الدم ریوی میں پینے والی دواؤں کو میں نے دیکھاہے کہ ان کے اندر گری پیدا کرنے والی دوائی داخل نہیں کی جاتیں۔ لہذایا در کھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

#### نفث الدم كے لئے قرص كاعدہ نسخه:

قاقیا، گلنار، عصارہ کیے السیس، تخم گلاب، گل مختوم، کندر، صمع عربی، تخم بنج، افیون، عصارہ پر سیان دارامیں قرص بنالیں اور سر کہ کے ساتھ استعال کریں۔خون زیادہ آرہاہو تو عصارہ کسان الحمل کے ہمراہ استعال کریں۔

#### نفث الدم كے لئے طاقتور نسخه:

تخم شوکران و گرام، تخم ننج ۵.۳ گرام، نشاسته ۵.۳ گرام، سنبل ۲.۲۵ گرام، گل بحیره ۵.۳ گرام، انیسون ساگرام مقدار خوراک ۵.۳ گرام بارش کاپانی پیانی کے اندر طباشیر شامل کر کے پینا مفید ہے۔ (جالینوس)

بادروج سینہ اور پھیپھڑے کو بیحد خشک کر تا ہے۔لہذا سل کے دوسرے اسٹیج جہال زخم کو خشک کرنا مقصود ہواس کااستعال موزول ہے (مؤلف)

. نفث الدم كے اندر ہونے والے در دكے لئے مسكن ادويہ مخدرات اور ایسے تخموں سے تیار كی جاتی ہیں جو مدر بول ہوتے ہیں۔

> نفث الدم میں استعمال کی جانے والی دواءالیز ور کانسخہ: مخم کر فس اجزء، بادیان اجزء، سلجہ لیم جزء، انیون لیم جز۔ پانی کے ساتھ قرص بنالیں۔

### ریگر:

مختم نخ اجزء، مختم کرفس اجزء، افیون اجزء، گلاب خشک اجزء، زعفران الم جز۔۵. ۴ گرام کی قرص تیار کریں۔

### تكونے قرص:

مخم بنج ۴، مخم کر فس ۴، افیون ۵. ۴ گرام ، انیسون ۵. ۴ گرام \_ قرص بنالیں \_ ایک قرص صبح وشام ہمراہ آب سر د \_

ند کورہ قرص نفث الدم میں مفید ہیں خواہ مریض سل کے قریب کیوں نہ پہونچ گیا ہو۔اطباء نے اے مخدرات اور مدر بول ادویہ ہے تیار کیا ہے۔ تمام مادوں کو تھینچنے کے لئے بھی یہ عمدہ ہیں۔ تمام در دوں کے لئے مسکن ہیں صرف قولنج میں مفید نہیں ہیں۔ازالہ قولنج کے لئے مخدرات کو طاقتور اور غالب ہونا چاہئے۔

نفث الدم، سل اور ان مریضوں کے لئے مفید قرص کا نسخہ جن سینہ پر انصباب نزلہ ہو تا ہو اور خراب مواد اترتے ہوں۔

#### نسخه

تخم قناء مقشر، مخم كتال، مخم خشخاش، مخم كرفس، مخم ننج، افيون، خيساند هُ كندر ميس گونده كردير ـ (جالينوس)

# حرارت اور پیاس غالب ہو توحسب ذیل تخموں سے کام لیں:

تخم خیار، تخم قثاء، تخم کدو، تخم رجلہ، خشخاش، تخم نئخ، افیون۔ اے تخم کر فس اور انیسون کے ہمراہ پلائیں تاکہ اثرات اندر پہوئج سکیس۔ حرارت نہ ہو تواس کے ساتھ تانخواہ، سنبل، مر، دار چینی، شامل کریں۔ باب الربو میں ہم ایسی دواؤں کا تذکرہ کرنچکے ہیں جس تھو کئے اور ازالہ مادہ وغیرہ میں سہولت ہوتی ہے۔ (مؤلف)

پھیپرے کے اندر دبیلہ (پھوڑے) کاعلاج یہ ہے کہ لطیف اور ختک کرنے والی دوائیں اور

رقیق شر اب استعال کی جائے۔شراب تھوڑی پی جائے۔

یں رہب بھی ہوں ہیں۔ مخدر تخموں کی ادویات سخت کھانسی کے وقت موزوں ہیں جیسا کہ نفث الدم اور خراب نزلوں میں کھانسی کے لئے بیہ استعمال ہوتی ہیں (جالینوس)

میرے خیال میں دودھ پینے ہے پھیپر اصاف ہوجاتا ہادراس کی پنیریت ہے تغزیہ حاصل کرتا ہے۔ پھیپر اس کے مرطوب کر دیتا ہے۔ دودھ زخم کو مرطوب کر دیتا ہے۔ دودھ زخم کو مرطوب کر دیتا ہے۔ دودھ زخم کو مرطوب کر دے تو ضرورت کے برعکس اس کا عمل ہوگا کیونکہ پھیپر اس کے فر میں بنیادیہ ہے کہ عمکن حد تک وہ ختک ہوجائے بایں ہمسل کے مریض کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جم کے اندرر طوبت آئے اور اعضاء کی اصلی رطوبتوں کی حفاظت کی جائے۔ دل کے اوپر ختک مزاج غالب نہ ہونے دیا جائے کیونکہ جس کو پھیپر اس کی خودہ میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ لہذا اس کا باب میں دودھ بیحد موافق ہوگا۔ متفقہ طور پریہ سینہ ، پھیپر الور پھیپر موافق ہوگا۔ متفقہ طور پریہ سینہ ، پھیپر الور پھیپر مال کے اطراف کے لئے مفید ہے۔

قصبۃ الریہ بیں زخم ہو تو مریض کو گدی کے بل لٹائیں اور تھم دیں کہ وہ دواکو منہ ہیں رکھ کر فتہ رفتہ اندر داخل کر ہے۔ اپ طرح قصبہ الریہ بیں کھائی کی تخریک ہوئے بغیر دواکا ایک عمرہ حصہ داخل ہو جائے گا۔ اس بات کاشدت سے خیال رکھیں کہ قصبۃ الریہ بیں یکبارگی بہت ساری چیز داخل نہ ہو۔ ورنہ کھائی اٹھے گی اور سخت نقصان ہوگا۔ واضح رہ کہ دیوار پر پانی جس طرح بہتا ہے ای طرح قصبۃ الریہ کی دیوار پر رطوبت بہے گی تو کھائی پیدانہ ہوگ مگر قصبۃ الریہ کی دیوار پر رطوبت بہے گی تو کھائی پیدانہ ہوگ مگر قصبۃ الریہ کی تجویف جو ہوائی گذرگاہ ہے اور جس کے ذریعہ شخص ہو تا ہے کے وسط میں کوئی دوا کرے گی توگرتے ہی کھائی پیدا ہوگ۔

شہد کی چیزیں سینہ اور پھیپھڑے کے تمام زخموں کے لئے ہم نے جو ایجاد کیا ہے اس کا مقصد

یہی ہے کہ قابض دوائیں داخل کرتے ہیں تو معدہ میں وہ دیر تک رک جاتی ہیں۔اور ان کے اثر ات

آگے نہیں بڑھتے،لہذاشہدان ادویات کے لئے ایک تیز رفتار سواری کی مانند ہوتی ہے جو ان ادویات کو
مقام ماؤف تک پہونچاتی ہے بایں ہمہ شہد کے اندر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو زخموں کے لئے مصر
ثابت ہو۔

سینہ اندر دبیلہ (پھوڑا) ہو اور پیپ اور سینہ کے گوشت میں تعفن پیدا ہو گیا ہو تواکثر ہڈیال متاثر ہو جاتی ہیں حتی کہ متعفن ہڈیوں کو مجبوراً کاٹ دیناپڑتا ہے اکثر حالات کے اندراس پہلی کے اوپر جو پہلیوں پر استرکرنے والی متعفن جملی کی وجہ سے عفونت زدہ رہ جاتی ہے کوئی چیز چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس حالت کے اندر ہمارا معمول ہے ہے کہ زخم کے اندر جب ہم ماء العسل کی پچکاری دیتے ہیں تو مریض کو حکم دیتے ہیں کہ بیار پہلو کے بل لیٹے اور بار بار لیٹے، بعض دفعہ اس پہلو کو ملکے طور پر حرکت بھی دے، پھر قرحہ کے جو ف میں جو بچھ ماء العسل رہ جا تا ہے جو اے" جاذبۃ القعی" آلہ کے ذریعہ نکال لیتے ہیں۔ایساکر لینے کے بعد جب ہمیں یہ یقین ہو جا تا ہے کہ بیپ تمام کی تمام قرحہ کی ریزش سمیت خارج ہو چکی ہے تو اس وقت یہاں ہم دوائیں پہونچاتے ہیں۔

پھیپھڑے کے زخموں کو ہم شہد کھلا کراور ماءالعسل کے ذریعہ صاف کرتے ہیں۔ (جالینوس) پھیپھڑے کے زخموں کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو شہد اور ماءالعسل سے صاف کئے جاتے ہیں کیونکہ یہ تنقیہ کے علاوہ غذاکا کام بھی دیتے ہیں، نیز اندرونی زخموں کے لئے مصر نہیں ہوتے۔ (مؤلف)

کھانی کے ذریعہ قصبۃ الرئے کے چھلے کی کوئی چیز نکل آتے تواس کا مطلب یہ ہے کہ پھیپھڑے کے اندر کوئی برداز خم موجود ہے کیو نکہ قصبۃ الرئے کا چھلہ اپنے بند ھن سے آزاد ہوجائے گا تواس سے پہلے ہی انسان مرجائے گا۔ یہ برے برئے چھلے ہوتے ہیں۔ پھیپھڑے کے اندر فساد اور تعفن گرم رطوبتوں سے بہت جلد پیدا ہوتا ہے ، کھانسی کے زور سے پھیپھڑے کی کوئی بردی رگ کٹ کر نکل آئے گی۔ یہ رگ پھیپھڑے کی ہوگی قصبۃ الرئے کی نہ ہوگی کیونکہ قصبۃ الرئے کی رگیس بال کی طرح آئے گی۔ یہ رگ پھیپھڑے کو زخموں اور ور موں کا احساس نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہاں کوئی عصب نہیں آئے۔ (جالیونس)

یہاں اعصاب بھی آتے ہیں تونا قابل اعتناء، اور وہ بھی پھیپے دے کی جھلی میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔(مؤلف)

پھیپرے کے ورم کے نتیجہ میں ضیق تنفس لاحق ہوتا ہے جی کہ مریض گھلا گھنے کی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے چنانچہ بیٹے کرخود کو سیدھاکرلیتا ہے تنفس سے جو پچھ فارج ہوتا ہے وہ بے حد گرم ہوتا ہے۔ بالخصوص جب کہ ورم حمرہ فتم کا ہوتا ہے۔ عظیم تنفس اور سر دہوا لینے کے بعد مریضوں کو آرام ہوتا ہے۔ انہیں مائل بہ سرخی ،یازردی یا جھاگ دار ،یا سبزیا سیادہ نفث الدم ہوتا ہے۔ اکثراس حالت کے ساتھ انہیں سینہ کے جوف میں بوجھ اور ایسادرد ہوتا ہے جو جسم کی گہرائی سے شروع ہوکر عظم النص اور پھر عظم الصلب کے گوشہ تک محسوس ہوتا ہے بخار تیز ہوجاتا ہے نبض موجی چلتی ہے۔ رخسار کی ہٹری بیجد سرخ ہوجاتی ہے جس آدی کے پھیپر سے میں کوئی بیاری ہوتی ہوتی ہو اس کا چرہ وڈھیلااور سفید ہوجاتا ہے ہوتی ہوس آدی کے پھیپر سے میں کوئی بیاری ہوتی ہو اس کا چرہ وڈھیلااور سفید ہوجاتا ہے بشر طیکہ ورم حارثہ ہو۔

نفت الدم کامریض سرخ چیزوں کودیکھنا پند نہیں کرتا کیونکہ خون جسم کے ظاہری حصول کی جانب کھنچ اٹھتا ہے۔ اس سے رنگ کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے (جالینوس)
میرے خیال میں ایبااس لئے ہوتا ہے کہ مریض کوخون یاد آجاتا ہے۔ (مؤلف)
جن مریضوں کی جہنیاں پروں کی مانند ہو جاتی ہیں (یعنی مریضان سل) چونکہ ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں اس لئے معمولی سبب نے انہیں نفٹ الدم تیزی سے ہونے لگتا ہے۔
وات الرئے کے جن مریضوں کے بالائے جسم یا سینہ کے مقامات کے زیریں حصوں میں پھوڑے نکل آتے ہیں تو یہ پھوڑے بیت واصر بن جاتے ہیں اور مریض نجات پاجاتے ہیں۔ (جالینوس)

كيونكه سينه كى فضامين بيب كاانصباب مونے لگتا ہے۔ (مؤلف)

ذات الرئه میں بخار ہو جو زائل نہ ہو تا ہو ، در داور الم کم نہ ہو تا ہو ، مریض قابل اعتباء کوئی چیز تھو کتانہ ہو۔ اچھی طرح شکم بھی نہ چلے ، نہ ایسا پیشاب ہو جس کے اندر بہت زیادہ رسوب پایا جائے۔ ایسے حالات کے اندر بیاری محفوظ ہو ، تو نہ کورہ بالا پھوڑے کی امید رکھیں کیو تکہ نہ کورہ با توں میں سے کسی ایک بات کی موجود گی بحر ان کا پید دیت ہے پھر مریض کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پسلیوں کے سرول کے بنچ تھوڑ االتہاب پایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کورہ پھوڑے مید کے بنچ ہیں۔ جو پھوڑے سینے کے بالائی حصول میں نمایاں ہوتے ہیں اور مریض کی پسلیوں کے سرول کے بنچ ہیں۔ جو پھوڑے سینے کے بالائی حصول میں نمایاں ہوتے ہیں اور مریض کی پسلیوں کے سرول کے سرول کے سامنے کا حصہ پتلا ہو ، سوء تنفس ایک مدت تک رہ کر کسی ظاہری سبب کے بغیر زائل ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مواد او پر کوچڑھ رہا ہے جیسا کہ پسلیوں کے سرول کے بنچ جرارت کا ہو نااور ان کا تناو مواد کا بنچ کی طرف گرنا ظاہر کرتا ہے۔

پھیپھڑے کی خطرناک بیاریوں میں جو پھوڑے پیروں میں نکل آتے ہیں وہ سب کے سب مفید ہیں۔ سب سے افضل پھوڑے وہ ہوتے ہیں جو اس وقت نکلتے ہیں جب تھوک کے اندر نظم بالکل نمایاں ہونا چاہئے۔ ہو تاہہ ہے کہ تھوک جانے والی چیز پہلے سرخی پھر پیپ کی صورت افتیار کر لیتی ہ اور باہر کی جانب ابھرنے گئی ہے تواس کے بعد عرض اور الم جب بھی ظاہر ہوں گے تو مریض بقینی طور پر محفوظ اور سالم رہے گا۔ پھوڑے کے اندر تسکیس نہ ہوگی تا و فتیکہ درد تیزی کے ساتھ رفع نہ ہو جائے۔ تھوکی جانے والی چیز تا پختہ ہوگی، غیر واجبی طور پر ہوگی، پیشاب کے اندر عمدہ رسوب نہ ہوگاتو وہ جوڑ فاسد ہوئے بغیر نہ رہے گا جس میں پھوڑا نکلے گایا پھر اس کی وجہ سے خت سدہ لاحق ہوگا۔ ہوگاتو وہ جوڑ فاسد ہوئے بغیر نہ رہے گا جس میں پھوڑا نکلے گایا پھر اس کی وجہ سے خت سدہ لاحق ہوگا۔

ہے کہ یہ مقام ماؤن سے دوراور نیچے کی جانب مائل ہوتے ہیں خاص کر جب کہ بیج ہو چکا ہو۔ بیج کی علامت یہ ہے کہ تھوک تبدیل ہو جاتا ہے اور بغیر کسی د شواری کے بکٹرت استفراغ ہوتا ہے۔ مریض کے بیٹے ہیڈلی کے اندر پھوڑا نگلنے ہے مریض اس خطرے ہے باہر نکل آتا ہے جس کا ذات الرئے میں اندیشہ ہوتا ہے۔ البنۃ اس کا جوڑ کی صحت ذرا مشکل ہے ہوتی ہے۔ بعض او قات یہ حالت مز من بھی ہو جاتی ہے۔ نگلنے کے بعدیہ پھوڑے غائب ہو جائیں اور جس چیز کو باہر خارج کرنا ضروری ہو وہ خارج نہ ہوتی ہے۔ یہاں مریض کی ضروری ہووہ خارج نہ ہوتی ہے ۔ یہاں مریض کی عقل خراب ہوتی ہے۔ یہاں مریض کی عقل خراب ہوتی ہے۔ یہاں مریض کی عقل خراب ہوتی ہے۔ یہاں مریض کی مطلس نہیں ہوتا ہے صورت حال نہ ہو تو بخار ساکن موجاتا ہے بلکہ اندر کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ اس حالت کے ساتھ ضیق تنفس بھی ہو تو مریض مرجائے گا۔

پھیچرے کی وجہ ہے جو بیپ پیدا ہو جاتی ہے اس ہے زیادہ تر مشاکخ (بوڑھے) اور ڈھلتی عمر کے لوگ مر جاتے ہیں۔ پیپ کے بقیہ سارے حالات میں نوجوان زیادہ مرتے ہیں کیو تکہ پھیچر ااور سین نے مریض اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ اس حالت ہے نیج کر باتی رہ سکیں ایسااس وقت ممکن ہے جب طاقت زیادہ موجود ہو۔ ضعف قوت کی وجہ ہے بوڑھے حضر ات نہ کورہ صورت حال ہے بہت کم نیج پاتے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر چو نکہ طاقت زیادہ ہوتی ہے اس لئے وہ تیزی ہے صاف ہوجاتے ہیں۔ پیپ کی بقیہ قسمول ہے مرادوہ ہیں جن کے ساتھ شدید بخار ہو، مثلاً کان کے اندر پھوڑا ہے۔ یہاں نوجوان خطرے کی زد میں زیادہ رہے ہیں کیونکہ کشت حرارت کی وجہ سے ان کے بخار زیادہ سخت ہوتا ہو۔ (جالینوس)

نفث الدم، چوٹ، الحچل کود، شور ہنگامہ، سخت ٹھنڈ ک باز مین پر بستر کے بغیر سونے ہے لاحق ہو تا ہے۔ (جالینوس)

کسی آدمی کوسل ہواور کھانی کے ذریعہ آنے والی شئے بد بودراہو، سر کے بال بھی جھڑ رہے ہوں تو یہ موت کی علامت ہے کیونکہ اس وقت بال اس لئے گرتے ہیں کہ غذا کم ہو جاتی ہوائے ہوں جس جو کچھ بہو مچتی ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ بال گرنے کے بعد دست آنے کی بیاری ہو جائے تو مریض مر جاتا ہے کیونکہ بالوں کاگر تا اس بات کی علامت ہے کہ اخلاط کم ہو گئے ہیں، مریض کمزور ہو چاتی ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ دست بھی آنے لگیں تو اس حالت کی سر حد موت سے قریب تر ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے طاقت اصلاً زائل ہو جاتی ہے۔ (جالینوس)
تھوک ہیں جھاگ دار خون ہو تو اس کا تعلق بھیچر مے گوشت سے ہو تا ہے۔ یہ بھیچر مے

کے اندرزخم ہونے کی خصوصی علامت ہے۔ چینے وغیرہ کی وجہ سے شوخ سرخ خون زیادہ مقدار میں خارج ہواور جھاگ دارنہ ہو تواس کا مطلب یہ ہے کہ پھیپھڑے کی کوئی رگ بھٹ گئی ہے۔ جھاگ دار خون کا تعلق پھیپھڑے کے گوشت کے جوہر سے خصوصی ہو تا ہے۔ سل کے مریض کو دست آ جائے تومر جاتا ہے۔ (جالینوس)

برف، پالااوراس پر مخنڈی ہونے والی چیز ول کے استعال ہے بہ کثرت خون پھوٹ جاتا ہے کیونکہ سینہ کی رقیس اس سے بچٹ جاتی ہیں اور پھیپھر سے اور سینہ کو نقصان پہو نچنے لگتا ہے۔ (جالینوس)

ذات الجنب، ذات الرئد كاسبب بن جائے تو خراب ہو تا ہے۔ ذات الجنب كے سبب كاذكر ہم كر يچكے ہيں، ذات الرئد قرانيطس كا سبب بن جائے تو يہ بھى خراب ہو تا ہے كيونكہ يہ حالت تب ہى ہوتی ہے جبور م كی موجب خلط بہت زيادہ ہو جاتی ہے۔ (جالينوس)

سل کامریض برابر دبلا ہوتا جاتا ہے۔ جب تک اسے کھانسے کی طاقت ہوتی ہے زندہ رہتا ہے، اس سے پھیپر داصاف ہوتارہتا ہے۔ کھانسے کی طاقت کم ہوجاتی ہے تو پھیپر دے کی رگیس مسدود ہونے لگتی ہیں اور اختتاق کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اس طرح مریض مرجاتا ہے۔ سل سے مرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے (جالینوس)

مریض سل کے دونوں جڑوں پر ہاقلاجیسے دانے نکل آئیں تو ہاون دنوں کے اندر مر جائے گا۔ گدی کے اوپر سیاہ ہاقلا جیسا کوئی دانہ نکل آئے اور سائے نہیں نیز اسی کے ساتھ کثرت سے نیند بھی آنے لگے تو چالیس دنوں کے اندر سل کا یہ مریض مر جائے گا۔۔

سے فدم کے بیرونی حصہ پر سیاہ ورم انڈے کے برابر نمایاں ہو جائے اور اسے بول کی شکایت بھی ہو جائے ، لمبی گٹڑی اور خربوزہ کھانے کی خواہش بھی ظاہر کرنے لگے توبیہ تین مہینوں کے اندر مرجائے گا۔ (جالینوس)

### ذات الرئه كى علامات:

تیز بخار، سینہ کے اندر ہو جھ کا احساس، شانوں اور پہلوؤں اور پشت میں در د، مریض گدی کے بل سوئے گا، پہلوؤں کے بل نہیں لیٹے گا۔اختناق کی کیفیت تقریبانہ ہوگی۔چبرہ گلاب کی طرح سرخ ہوگا۔نفس بلند اور تیز ہوگا، آئیس مرطوب ہوں گی اور شنڈک کی خواہش کرے گا۔زبان کھر دری ہو جائے گی، نبض صغیر ہوگی، گردن موثی ہوگی چبرا پھولا ہوا ہوا ہوگا۔ آئکھوں کی حرکت ست ہوگ

اطراف مختد ہاوران کارنگ بدلا ہوا ہو گا۔ زبان بڑھ جائے گی۔ بیاری ذات الجنب کی منتقل ہو جائے تو تنفس خفیف ہو جائے گا۔ (جالینوس)

پھیپیوٹ کے اندر پیدا ہونے والے زخم خبیث ہوتے ہیں کیونکہ پھیپیوٹ میں مسلسل حرکت ہوتی رہتی ہے۔اس لئے یہاں دوائیں دیر میں پہو پنچتی ہیں۔(جالینوس)

پھیپروے کے زخم دو قتم کے ہوتے ہیں ان میں ایک وہاں ہو تا ہے جو پھیپروے کار حصہ ہو تا ہے ہیں پیروے کار حصہ ہو تا ہے بہال ورم حار اور بخار ہو جانے ہے پہلے پہنے دگانے کی فوری ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد وہ زخم ہیں جن سے مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان کا مند مل ہونا ممکن نہیں ہو تا۔ مریض کو مفید ووائیں پاکر یہال خطکی طاری کی جاتی ہے تاکہ پھیپروے کے اندرزخم کے باوجو دوہ دیر تک زندہ رہ سکے۔ پھیپروے کے اندرزخم کے باوجو دوہ دیر تک زندہ رہ اس کے رہا ہو نہیں ہونا ہے۔ اس کے اندر فساد پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے آلات تنفس کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے فساد ابتدائی حالت میں اور کم ہوگا۔....(۱)

ابتدامیں مناسب علاج میں عجلت ہے کام لیاجائے تو مریض مکمل طور پر صحتیاب ہو جائے گا۔

بر داشت کی طاقت ہو تو اس علاج کے لئے فصد کھولیں، سر کو گری پہونچا ئیں، استرے ہے سر کو مونڈ دیں اور خشک دوا ہے اسے لت بت کر دیں۔ اس کے بعد انر نے والی بیپ کو خشک کریں، یہ دوا تانسیا کے نام ہے معروف ہے۔ اس سلسلہ میں استعال کی جانے والی دواؤں میں سب نے زیادہ طاقتور یہی دوا ہے۔ تام سے معروف ہے۔ اس سلسلہ میں استعال کی جانے والی دواؤں میں سب نے زیادہ طاقتور یہی دوا ہے۔ تام میں علی ختم حرف، اور بیٹ کبوتر اس ہے کم تر ہیں۔ میں اس دواکو زیادہ تر استعال کر تاہوں۔ ایسے خموں کو بلانا بھی مفید ہے جن میں سلیجہ اور افیون شامل کر دی گئی ہوں، اس طرح کی دواء ہے سر سے انر نے والا مواد گاڑھا ہو کر خشک ہو جائے گا۔ مکمل علاج کا تذکرہ ہم نے شریف خاتون کے علاج کاذکر کرتے ہوئے کر دیا ہے۔ (جالینوس)

کھے اوگوں کے اندر سل کی بیاری اس طرح بھی پیدا ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ پیشتر نفث الدم بالکل نہ تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کچھ اوگوں کو مراری خلط کی تئے کرتے دیکھا ہے۔ یہ تئے مسلسل ہوتی رہی حتی کہ وہ سل کی بیاری میں مبتلا ہوگئے۔ اس کا تذکرہ ہم نے کر دیا ہے باقی سل کے تمام اسباب کا تذکرہ تو یہاں کریں گے۔ (مؤلف)

ممکین بلغم جوسر سے انز کر پھیپھروے میں آتا ہے وہ نہایت خراب فتم کی سل پیدا کرتا ہے۔ (طیماوس)

<sup>(</sup>۱)عبارت غير واضح اور منى ہو كى ہے۔

جو حضرات سینوں پر انصباب نزلہ کے کثرت سے شکار ہوتے ہیں وہ سل کے لئے تیار رہے۔ بیں، بالخصوص جب کہ نزلہ کے اندر حدت اور سینہ نگ ہو، مز اج مر اری ہو، مریض کم گوشت ہو ، نزلے سینوں پر زیادہ اترتے ہوں تو یہ وہ حالت ہے جس میں انسان سل کے لئے بیحد مستعد ہو تا ہے کیونکہ یہ نزلے گرم اور تیز ہوتے ہیں۔ (مؤلف)

پھیپھڑے کی کریوں کے حاد (Acute) امر اض ابتدائی ہوتے ہیں یا پھر ایسے ہوتے ہیں جن سے صحت مشکل ہوتی ہے۔ ان کریوں کوجو جھلی ڈھا نگتی ہے یعنی اندرسے قصبة الرئد پر استر کرنے والی جھلی کے حاد امر اض میں صحتیابی جلد ہوتی ہے البتہ یہاں سخت تعفن پیدا ہوجائے جس سے فساد اس حد تک رونما ہوجائے کہ کریوں کے نیچے کے جھے کھل جائیں تو صحت ہونا مشکل ہوتا ہے۔ البتوں)

پھیپھڑے میں قصبۃ الرید کی شاخوں تک جو شریا نیں ہوتی ہیں وہ دراصل ایسے راستے ہیں جن سے ہوا تو گزرتی ہے گر جسم جب تک طبعی حالت میں رہتا ہے ان سے خون نہیں گزرتا ہے۔اگریہ راستے غیر طبعی حالت میں ہوجائیں حتی کہ ان سے خون گزرنے لگے تو پھیپھڑے کی شاخوں تک خون مہو نجنے لگے گا۔اس سے کھانسی اور نفث الدم کی شکایت پیدا ہوگی۔(جالینوس)

واضح رہے کہ کھانی کے ذریعہ انبان خون تھوکے اور معاملہ خطرناک نظر آئے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کاعلاج مشکل اور صحت کا ہوناد شوار ہو کیونکہ یہ حالت ہوسکتا ہے کہ ند کورہ بیاری کی وجہ سے ہو، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بواسیر وغیرہ کی طرح رگوں کے کھل جانے سے لاحق ہوئی ہوائیت تفث الدم کے ساتھ خراب اعراض نظر آئیں اور سابق میں خراب اسباب رہ ہوں تواس وقت بیاری کے خراب ہونے کی فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ حالات کے اندراندیشہ نہ کریں۔ علاج یہ کہ نفث الدم بہ افراط ہو تو قابض ادویہ استعال کریں۔ فصد کھولیں اور امتلائی حالت کو ہلکا کریں۔ فصد کھولیں اور امتلائی حالت کو ہلکا کریں۔ (مؤلف)

پھیپھڑے کے زخم میں گل ادمنی بیحد مفید ہے کیونکہ پھیپھڑے کے زخم کو خٹک کرتی ہے جی
کہ اس کے بعد مریض کو کھانسی نہیں آتی۔الایہ کہ تدبیر کے اندر کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو۔ یہ خٹک
کرنے میں بیحد مؤثر ہے۔ پھیپھڑے کے زخم کو بیحد خٹک کرنے والی ادویات سے فائدہ ہو تاہے حتی کہ
مریض خود کو مکمل طور پر صحتیاب تصور کرنے لگتے ہیں۔ای طرح خٹک ہوا بھی مفید ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ مریض روم سے نوبہ کو بجرت کرجاتے تھے۔ یہاں جو مریض آگیا ہے اور تدبیر کے اندر کوئی
غلطی واقع نہیں ہوئی تو سالوں زندہ رہا۔ ہاتی جن لوگوں نے خود کو آزادر کھا، تدبیر کے اندر بگاڑ پیدا

کرلیاوہ مرض کی جانب واپس ہوگئے۔ میرے خیال میں پھیپھڑے کے زخم خٹک کرنے والی ادویات سے زر داور خٹک ہو جاتے ہیں، حتی کہ گومند مل نہ ہوں مگر ڈھک جاتے ہیں۔ جیسا کہ تواصیر میں حالت ہوتی ہے کیونکہ انہیں بھی صاف کرکے خٹک دوا کے ذریعہ علاج کیا جائے تو سکڑ کر ڈھک جاتے ہیں۔(جالینوس)

مریض برابر تندرست معلوم ہو تا ہے الایہ کہ امتلائی کیفیت یا تدبیر کے اندر کوئی غلطی واقع ہو جائے توالگ بات ہے۔ (مؤلف)

نفث الدم کی سب ہے بری، خبیث اور پھیپھڑے کو جلد خراب کر دینے والی قتم وہ ہے جو بعض اوگوں کے اندر فساد پیدا ہو جانے ہے وجو دیس آتی ہے۔ دوسری وہ ہے جو خود پھیپھڑے کے اندر کسی آفت کے لاحق ہونے ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر بیہ حالت نفث الدم ہے اور بالحضوص اس وقت ہوتی ہے جب یہ کسی رگ کے بھٹ جانے ہے واقع ہوتی ہے۔ (جالینوس)

جو جسم سل کے لئے مستعد ہوتے ہیں وہ وہ ی ہوتے ہیں جن کے سینے تنگ، کم انجرے ہوئے اور شانے انجرے ہوئے اور شانے انجرے ہوئے ہیں۔ یہ شانے کیا معلوم ہوتے ہیں جینے پر۔ جن جسموں کے سرتیزی سے بجر جاتے ہیں وہ ان سے تیز نزلے انزکر پھیپیرٹ میں انزنے لگتے ہیں ان جسموں کے سرتیزی سے بجر جاتے ہیں وہ ان سے تیز نزلے انزکر پھیپیرٹ میں انزنے لگتے ہیں ان میں ان دونوں چیزوں کے بیک وقت اجتاع سے مریض، سل کے بالکل قریب آجاتا ہے کیونکہ مسلسل نزلہ کا انزناد پر تک انزتے رہنے سل کا باعث ہوجاتا ہے۔ یا پھر ایسا ہوگا کہ ضعف اور جگہ کی شکل فرج سے پھیپیرٹ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ (جالینوس)

ند کورہ مریضوں میں انصباب نزلہ سے کھانی پیدا ہوگی، سینہ کی تنگی کی وجہ سے کھانسی ان کے لئے مفتر ہے۔ یہ کھانسی رگوں کے پیٹ جانے کا باعث بنے گی اس کے بعد حاد نزلہ کا نصباب ہونے لگے تو بیاری اور مفتکم ہو جائے گی۔ (مؤلف)

پھیچڑے کی بیاری اور خاص کرنفٹ الدم کی تیاری کے لئے بینہ کی تجویف کا تنگ ہونا کا فی ہے سل کی بیاری بیل گرفتار ہونے والے زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سر کے بال کم، بگھرے ہوئے، سفید، جلد پر دھے، شانے پرول کے مانند پیچھے کو انجرے ہوئے، پیشاب ماکل بسر خی اور آئکھیں ہموار ہوتی ہیں۔ باردمز انجوالے خاص کر مر طوب المز انج حضر ات سر سے انصباب نزلہ کے لئے مستعدر ہے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ سل کی بیاری کے لئے بھی تیار رہتے ہیں۔ مزان چو تکہ سر داور سینے شک ہوتے ہیں اس لئے عور تیں مردول کے مقابلہ میں سل کی بیاری میں زیادہ گرفتار ہوتی ہیں۔ (جالینوس)

جن حضرات کے شانے پیچھے کی جانب پرول کی مانند اکھرے ہوئے ہیں وہ سینہ ہے ہونے والے نقث الدم میں تیزی ہے بہتلا ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ریاح اور نفخ کشرت ہے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اپنا مشاہدہ ہے چنانچہ بہی بات بیاری میں بہتلا ہونے کے لئے سازگار ہوتی ہے۔ میرے خیال میں چونکہ ان حضرات کے دل چھوٹے ہیں اور ایسا محض سینوں کے چھوٹے ہونے ہے ہو تا ہے اس لئے ان میں ریاح زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ دل جب چھوٹا ہوتا ہے تو پورے جسم کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ جن نزلول کے اندر حدت اور حرارت ہوتی ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں رہتے۔ نقث الدم بھی ایسی صورت میں لازم ہے کیونکہ بید نزلے آگے بڑھ کر پھیپیوٹ کے اندراپی حدت سے فساد پیدا کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بیہ خبیث اور خراب ہوتے ہیں۔ باتی جن نزلول کے اندراپی اندر حدت نہیں ہوتی وہ پختے ہو کہ بید خارج ہوجاتے ہیں۔ شدت سوزش کی وجہ ہے آگر بید خارج ہوجاتے ہیں۔ شدت سوزش کی وجہ ہے آگر بید خارج ہوجاتے ہیں۔ شدت سوزش کی وجہ ہے آگر بید خارج ہوجاتے ہیں۔ شدت سوزش کی وجہ ہے آگر بید خارج ہوجاتے ہیں۔ شدت سوزش کی وجہ ہے آگر بید خارج ہوجاتے ہیں۔ شدت سوزش کی وجہ ہے آگر بید خارج ہوجاتے ہیں۔ حتی کہ اس سے سر ہری طرح ہال میں باقی رہ وجاتے ہیں تو خت کھائی کے باعث ہوتے ہیں۔ حتی کہ اس سے سر ہری طرح ہال جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے امتلائی کیفیت رہ نما ہو جاتی ہی جنانچہ اس کیفیت ہے بھی نزلہ کا انصباب

جاتا ہے۔اس کی وجہ سے امتلائی کیفیت رونما ہو جاتی ہے چنانچہ اس کیفیت سے بھی نزلہ کاانصباب ہونے لگتا ہے۔ کھانسی کی شدت سے بھی پھیپھڑے کی کوئی رگ بھٹ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی حالت ناپسندیدہاور خراب ہوتی ہے کیونکہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔لہذامعلوم ہوا کہ یہ حالت خراب ہوتی ہے۔نفٹ الدم ہویانہ ہو۔(جالینوس)

اطباء کامعمولی ہے اور صحیح معمول ہے کہ قرحہ ُرئہ کے مریض کو خشک ملک میں منتقل کردیتے ہیں جیسا کہ سل کے مریضوں کو وہ روماہ نوبہ میں منتقل کر دیا کرتے ہیں۔ (جالینوس)

اس مسئلہ پر غور کرلیناضر وری ہے یہ بات ظاہر ہے کہ اطباءان مریضوں کو جن کے پھیپھر سے کا زخم منتظم ہوجاتا ہے خشک ہوا میں منتقل کر دیتے ہیں اور صحت سے مایوس ہوجاتے ہیں۔ علاج صرف خشک کر دینے کا ہو تاہے چنانچہ پھیپھرافشک حالت میں پڑار ہتاہے (مؤلف)

پھیپھڑے کے زخموں بین قدماء کا طریقہ یہ تھا کہ گرم مکواتوں کو سینہ پرر کھ کر داغ دیتے تھے۔ اس میں عبلت کرنی چاہئے۔ یہاں یہ انتظار روا نہیں ہے کہ پھیپھڑے کے زخم خراب ہو جا کیں در د بڑھ جائے۔

سل کے مریض موت کے قریب پہونچتے ہیں تو تنفس اس قدر صغیر ہوجاتا ہے کہ بڑے غور کے بعد ہی محسوس ہوتا ہے۔(جالینوس)

سخت جسم کے لوگ اور شینڈے ملک، گرم ملک اور زم جسم کے لوگوں کے مقابلہ میں اس بات کے لئے زیاد ومستعد ہوتے ہیں کہ پھیپیرم کے کی زیریں رگیس ان کی پیٹ جائیں۔ (بقر اط)

# نفشالدم كي دوا:

کندر ، دم الاخوین ، گلنار ، کهرباء ، خشخاش سیاہ ، مصغ عربی ، گل ارشی ، زراو ند چینی ، سب کے سب معتدل اجزاء کے ساتھ۔مقدار خوراک ۴٫۵ گرام ، مشروب کے طور پر۔ د ہی ، لوہے کے ذریعہ گرم کیا ہواد و دھ بینااور سینہ پر مازو کا ضادر کھنا مفید ہے۔ (جالینوس)

جالینوس کا کہنا ہے کہ پھیپھڑے کے بڑے زخم میں مریض کو میں مصالحہ جات اور خشک دوائیں پلا تا تھا۔ مقصود بیہ تھا کہ اس سے زخم کی بعض عفو نتیں خشک ہوجائیں۔ مریضوں کو امر وسیا، مثر ودیطوس تریاق،اور تجرنانایادیتا تھا تا کہ رطوبت خشک ہوجائے۔

پھیپھرے کے پرانے زخمول میں قطران ایک چھوٹا چمچہ صبح کو چاہتے ہیں۔

بدبودار بلغم اور برانی کھانسی کے لئے مفید بخور کانسخہ:

زر بیخسر خ کو بھیڑ کے تھی میں پیں کر جھر ہیری کے پتۃ پر طلاء کریں اور خٹک کرلیں پھر ایک یاد و پتول کا جب چاہیں بخور دیں۔

### دیگر:

زر شخ زرد، زراوند طویل، پوست، نیخ کبر، گھی میں پیس لیں اور ۹٫۵ گرام کی گولیاں بنا کرروئی میں محفوظ رکھ لیں۔ بوقت ضرورت دن میں تین بار مریض کو دھونی دیں یا پھر قنہ کی دھونی دیں، یازر شخ یا جوزبواصغیر کوروغن شیرج میں گوندھیں اور ۹٫۵ گرام لے کر دھونی دیں۔ (اُہران)

### نفالدم كے لتے:

دودھ کو چھاچھ کی صورت میں پیکیں وہ اس طرح کہ دودھ دوہ کر اس کی بالائی اتار لیس پھر اس
کے اندرلو ہے کے گرم مکڑے ڈال کر جوش دیں۔اور تھوڑا تھوڑا استعال کریں۔(طبری)
پھیپھڑے کے اندرورم حار ہوجاتا ہے تو قبل اس کے کہ اس کے اندر پیپ پڑے، پختہ اور
سرخ ہوگرم بخار پکڑلیتا ہے۔ورم پختہ ہوجاتا ہے اور اس میں بیجان آجاتا ہے تو بخار کم ہونے لگتا ہے
اور پھر ہاکا ہو کرمسلسل باتی رہتا ہے جسم کمزور ہوجاتا ہے اور ناخون کبڑے ہوجاتے ہیں۔(اُھرن)

# چوتھاباب

# ذات الرئه اور ذات الجنب ميں فرق

ذات الرئه میں ضیق تنفس زیادہ ہو گاحتی کہ مریض کو اپنا گلا گھنتا ہوا محسوس ہو گا۔ تنفس بھی مشقت کے بعد لیتا ہے۔ (طبری).....(۱)

جو مریض بلغم تھو کے گا، سینہ میں در دہوگا۔

ذات الجنب میں مریض کو عظیم تنفس لینے کی قدرت ہو گی گو تنفس حسب مادہ محت لف ہو گا۔ سینہ کے اندر در دیہلومیں ہوگا۔ان دونوں حالتوں کے در میان اچھی طرح فرق کرلیں۔(مؤلف) ذات الرئه میں نبض لین اور موجی ہو گی۔ذات الجنب میں صلب، کمز ور اور متواتر ہو گی۔ر خسار

کی بڈیاں سر خنہ ہوں گی۔ (جالینوس)

خون کے باب میں غور کریں خواہ کسی پہلو ہو مگر نفث الدم پر در د ہو تا ہو تو فصد کھول دیں اگر در دیورے سینہ میں ہور ہاہو تو دونوں ہاتھوں کی الحل کی فصد کھول دیں، اگر نفث الدم زیادہ ہو جائے تو ینڈلیاں، بازوباندھ کرپیروں بالحضوص تلوؤں کی مالش کریں اور گرم روغن اس پر لگائیں۔( اُھر ن) نفث الدم کے بعد بیحد سخت ضیق تنفس ہو، کرب اور بے چینی ہو، مُصندُ السینہ آئے توبہ جان لیں کے خون منجمد ہوچکا ہے۔ ایس حالت میں قابض ادویات ہر گزنہ دیں۔ ملطف ادویات سے کام لیں۔ سلنجبین اور برزور دین حتی کہ خون کے اندر لطافت پیدا ہو کر اس کا سقیہ ہو جائے۔ دواء الکر کم ، تنجبین، گرمیانی۵. ۳گرام،ای طرح عرق کراث وغیر ه محللات خون مفید <del>بین \_ نفث الدم می</del>ن لو ہے کے ذریعہ پکا ہوا چھا چھہ اور سینہ پر قابض صاد مفید ہیں۔اس میں سے بھی مفید ہے کہ سر کہ میں اون تر كركے بايوست انارسر كه ميں پيس كرسينه يرر كھاجائے۔ (مؤلف)

<sup>(</sup>۱) یہاں نسخہ کے اندر بیاض ہے۔

#### عده ضاد:

اس کو سینہ پرر کھا جائے تو نفث الدم، معدہ پر طلاء کیا جائے تو تئے اور آنتوں پرر کھا جائے تو اسہال کوروک دیتا ہے۔مقوی اور قابض ہے۔

لبان، گلنار، اُ قاقیا، مامیثا، شب، راس، گل سرخ، تخم بنج، پوست یبروج، مر، صبر ، زعفران سب کو پیس کرعمده سر که میں گونده لیس اور بطور طلاءاستعال کریں۔(مؤلف)

# سينه كے پرانے زخمول كے لئے:

قطران کاایک چھوٹا چمچہ مریض کو صبح کو دیں۔ یہ عمدہ ہےیا قنہ سائلہ تھوڑا لے کر تھوڑی شہد میں ملائیں اور چٹائیں۔

کن ایک کی زبانی سنا بھی ہے اور سلسل خبر ول سے ثابت بھی ہے کہ پچھ لوگول کو نفث الدم کے بعد پیپ تھو کئے کی شکایت ہوئی توان میں ہے پچھ بکری کے دودھ کچھ گدھی کے دودھ سے صحتیاب ہوگئے۔ایک مریض تو صرف بیس دنول کے اندر صحتیاب ہوا۔اس کے والدگدھی کا دودھ دوہ کر فوراً نہیں آدھے گھنٹہ یااس سے بھی زیادہ عرصہ کے بعد پلاتے تھے،اسے فوری افاقہ ہوا۔یہ ایک نوخیز نوجوان تھا۔(اُھرن)

ذات الرئد ایک ورم حار ہوتا ہے جو پھیپرٹ کو لاحق ہوتا ہے۔ زیادہ ترشد یو نزلہ ، یا ذبحہ ،

یار ہو، یا شوصہ ، یادیگر بیار ہوں کی موجودگی میں لاحق ہوتا ہے بھی اس بیاری کی شروعات اپنے شین خود ہوتی ہے۔ ساتھ میں عرض ، محرقہ نما تیز بخار ، سید میں ہوجھ، کھنچاؤ، چہرے میں بیش امتلائی کیفیت ، التہاب اور شعلوں کی طرح او پر چڑھتے ہوئے بخار ات موجود ہوتے ہیں۔ رخسار کی دونوں ہیں بالیاں ، آنکھیں سرخ ہوجاتی ہیں ، پلیس او پر تک نیچے کی جانب ماکل ہوتی ہیں۔ پلیوں کی رگوں میں امتلائی کیفیت ہوتی ہوں ہے۔ آنکھوں کی جھلیاں کیا گئی ہیں جیسے ابھری ہوئی چربیاں ہوں۔ ان اعراض کے اندر جس قدر حرارت ہوتی ہے ای قدر ورم میں حرارت ملتی ہے۔ بیاری سی اور بیاری کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہو تو مریض فصد ہے پر ہیز کرے بالخصوص جب کہ سابقہ بیاری من من ہو چگی ہواور میں پیدا ہوئی ہو تو مریض فصد ہے پر ہیز کرے بالخصوص جب کہ سابقہ بیاری من من ہو چگی ہواور شروع میں مریض فصد ہے کہ بیاری من اور پیلیوں پر شروع میں مریض فصد ہے کریں، یا پنڈ کی پر پچند شروع میں مریض فصد ہے کریں، یا پنڈ کی پر پچند شروع میں ہو تو علاج فصد ہے کریں، یا پنڈ کی پر پچند کا گئیں۔ تدبیر میں تاکہ در دہیں سکون ہو شکم کو شرم کریں، اور کھانی میں دی جانے والی نرم غذا کیں استعال کریں۔

سینہ سے پیپ تھو کئے کی وجہ سینہ کا کوئی پھوڑا،نفث الدم جو زائل نہ ہوا ہو، ذات الجنب، یا سر سے اتر نے والا تیز فتم کادائمی نزلہ ہو تاہے۔

سینہ کا پھوڑااگر ہے تو اس کی علامت شدید خٹک کھانسی، سینہ کے اندر بوجھ، شدید در د کے ساتھ کھانسی کا آنااور بھی رطوبت کا خراج ہواکر تاہے اخراج رطوبت کے بعد مریض ہلکا پن محسوس کر تاہے مگراس سے صحت نہیں ہوتی۔ بخار کے ساتھ کیکی ہوتی ہے۔ گفتگو تیز ہوتی ہے ایسا تنفس کی اذیت سے بیجنے کے لئے ہو تا ہے۔ پھوڑا پھو ٹاہے تو مجھی پیپ خارج ہوتی ہے بھی در دی نما چیز باہر آتی ہے۔ مریض مجھی کھانمی، پیشاب مایا گانہ آنے سے صاف ہوجاتے ہیں، اس طرح سل میں مبتلا ہونے سے بیچے جاتے ہیں۔ تیز تے اگر نہیں آتی تو مریض سل میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ اس اثناء میں پھیپرے کے اندرزخم ہو چکاہو تاہے۔ سل میں مبتلا ہوجانے کے بعدر خسار کی دونوں ہڈیاں بے رنگ ہوجاتی ہیں گوشت کم ہوجاتا ہے، ماخن ٹیز ھے ہوجاتے ہیں۔ آئکھیں چکنائی لئے ہوئے سفیدی اور زردی کی جانب ماکل ہوتی ہیں۔ اس بیاری کے اندر مریض اگر مبتلا نہیں ہوتے تو شکم میں گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے، پسلیوں کے سرول کا نجلاحصہ اوپر کی جانب تھنچ اٹھتا ہے۔ شدید پیاس لاحق ہوتی ہے۔ بھوک جاتی رہتی ہے جن لو گوں کوتئے ہوتی ہے ان کی تئے میں بیحد خراب بو ہوتی ہے۔ ایے مریضوں کاعلاج یہ ہے کہ انہیں پھوڑے پکانے کی دوائیں دی جائیں۔اس کے لئے گرم ا سفنج کے ذریعہ سنکائی کی جائے۔ آر دجو، انجیر خٹک پکا کر، تھوڑی علک البطح، بیٹ کبوتر، نطر ون اور تحظمی کا صادر کھا جائے۔مریض اس پہلو لیٹے جس پہلو میں پھوڑا ہو۔و قناً فو قنا شریت شہداور آش جو گھونٹ گھونٹ لیتا رہے۔ مریض میں جب بھی قوت آ جائے شربت زوفا وحاشا ہمراہ شہد استعال كرے۔ پھوڑے كے تھنے ميں تمكين مچھلى كھانے اور بوقت خواب اس كولى كے استعال سے مدد ملتى ہے جس میں ایارج اور خنظل پڑا ہو۔ پیپ کا خارج ہو ناشر وع ہو جائے تو زو فاابال کر ،اصل السوس اور ایرساشر بت شهد، زیت اور خربوز میں پکا کردیں۔ زخم کی صفائی میں وشواری ہو تو مرکب دوائیں مثلاً وہ دواجو فراسیون مفردے اور وہ مرکب جو کرسنہ سے تیار کیا گیا ہو دیں۔ سل کی جانب منتقل ہوجانے والے مریض کو چننی میں کراٹ شامی ملا کردیں، چننی جواور خندروس کی بنائیں، پینے میں بارش کایانی اور ماء العسل استعال کریں۔ سینوں پر پہلے تخم کتاں اور آئے ہے مرکب ادویہ استعال کریں۔ دونوں کا صلبہ ، خیار ، زیت ، شہد اور برگ مخطمی کے جوشاندہ میں صادبنا ئیں اور استعمال کریں۔ پھر ایک زمانہ کے بعد مر ہم استعال کریں جو موم ، تھی، روغن غار ، پیخسوس اور مر ہم سسالیوس سے تیار کئے گئے ہوں سینہ پر دائمی نزلہ کے اندر خلاف سے تیار شدہ ضادر تھیں اور نہار منہ سادہ شربت

استعال کریں جو مانع نزلہ ہوں۔ سل مز من میں مریضوں کو بھی مثر وریطوس اور تریاق افائی دیں۔
ان کے لئے گل ارمنی بھی مفید ہے گوسل کی بیاری کھانسی ہے شروع ہوئی اور مسکن سعال گولیوں ہے کھانسی کو تسکین ہوجاتی رہی ہو پھر بھی گل ارمنی مفید ہے کیونکہ بیہ قرحہ کی محافظ ہوتی ہے۔
اے بڑھنے ہے روک دیتی ہے مریضان سل کواطراف میں ورم رخواسی طرح بیدا ہوجاتا ہے جس طرح یہ صبن (مرض استشقاء) میں لاحق ہوتا ہے۔ نیز سوء مزاج بھی ہوجاتا ہے۔ (پولس)
ایک ایسا شخص میرے علم ہے جس کے بھیچیوں کے اندر زخم ہوگیا تھا۔ اس نے مسلسل دورہ استعال کرنا شروع کیا، دورہ کے ساتھ سمیند روئی اور اطریہ (۱) کھاتا تھا۔ شراب بالکل ترک کردی تھی شراب کی خواہش ہوتی تو دورہ پی لیتا تھا۔ چنانچہ خراب قتم کے متعفن زخم سے اسے نجات مل کئی۔ اور مکمل طور پر صحصتیا ہوگیا۔

پسلیوں پر استرکر نے والی جھلی اور جسم کے تمام داخلی حصول میں موجود ورم ریوی کے پیپ زدہ ہونے کی علامات:

شدید بخار، مختلف او قات میں طاری ہونے والی کپکی، ثقل، مقام ماؤف پر چیمن ، تڑپ، ان علامات کی موجود گی بیربتاتی ہے کہ ورم سمٹنا چاہتا ہے۔

یار طاقتور نظر آئے، تھو کی جانے وائی پیپ پلی ہو تو یہ سمجھیں کہ اس کا تعلق سینہ ہے۔

یہ چودہ دونوں کے اندر صحبتیا بہو جائے گا۔ بیپ کل کا کل اڑھی اور جامد ہو تو صحبتیا بی کے لئے چودہ

دنوں سے زیادہ مدت کی ضرور ت ہوگی۔ بایں ہمہ مریض کمزور ہو تو ساٹھ دن تک پیپ کا اثر رہے گا۔

نفٹ الدم میں خیال کر کے دیکھیں کہ پیپ گاڑھی آر ہی ہے یا پلی اور کیا پیپ ہے بھی یا

نبیں۔ پیپ موجود ہواور بخار بھی ہو تو مریض کو ماءالفعیر دیں۔ شکم خشک ہو تو عصارہ بادام یعنی بادام

سے تیار شدہ چٹنی دیں اور اس کے مشابہ سبزیاں کھلائیں۔ شکم نرم ہو تو امکان کی حد تک حفاظت

کریں۔ چٹنیال نہ دیں، صاف روثی کی عصارہ کے ہمراہ دیں۔ تھو کی جانے والی پیپ گاڑھی ہو گر

ساتھ میں مرہ (بت) نہ ہونہ بخار ہو تو ماءالعسل پلائیں کیونکہ یہ مفید ہے۔ پیپ خراب ہو جاتی ہو تو

ماتھ میں مرہ (بت) نہ ہونہ بخار ہو تو ماءالعسل پلائیں کیونکہ یہ مفید ہے۔ پیپ خراب ہو جاتی ہو تو

پیپ کے خارج ہونے میں سہولت پیدا کریں،اس کے ساتھ شہدیا تھی میں شامل کردیں تو

(١) اطريه ايك متم كاكمانا، وحاك كم اند، آفے ياركرتے بي (سوئيال)

بہتر ہے۔ یہ جوشاندہ قبل از طعام پلائیں۔ ماء العسل تمام او قات میں دیں اور نیم گرم دیں۔

سل کی بیاری طویل ہو جاتی ہے تو مریض کی طاقت گرجاتی ہے۔ اخراج بلغم کی طاقت کمزور ہو
جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے تنفس میں شکی آجاتی ہے۔ اس صورت حال کے اندر جو کی دلیہ کے ساتھ
کوتر کا بچہ اور چوزہ پکا کر مریض کو پلائیں۔ مرغ کا خصیہ کھلائیں تاکہ مریض میں طاقت بپدا اور گلاگھٹے
کی کیفیت نہ ہونے پائے۔ امکان کی حد تک مریض کی طبیعت کی حفاظت کریں۔ طبیعت نرم ہوگی تو
دی جانے والی غذامفیر نہ ہوگی۔ شکم نری دے تو مریض کو چوزے بھون کر دیں۔ ٹھنڈی غذائیں جن
سے رطوبتیں جاری ہوں، دیں۔ اس ہے شکم کو قوت ہوگی اور وہ رکے گا۔ طاقت زیادہ کمزور ہو تو
تھورے نمک کے ساتھ بھیج بھون کر دیں۔ زیادہ نمک شکم کو نرم کر دیتا ہے، تاہم تھوڑا نمک شامل
نہ کیا جائے تو غذا ہضم نہ ہوگی۔ پائے، بادام، چلغوزہ، منتی تھوڑی طاقت آجانے کے بعد دیں۔ زیادہ
کر وری دی سے سینہ کے اندر ٹوٹ کھانہ سے تو یہ قایس آرائی کریں کہ بیپ سینہ کے اندر ٹوٹ چکی ہے۔
کیفیت ہلکی ہو تو دود دھ پلائیں، اس ہو طاقت بہونے گی۔ الایہ کہ شدید حرارت ہو، اس صورت میں
دود ھ مفید نہ ہوگالبتہ بخار نرم ہو تو دود دھ پلاگر قوت واپس لاتے ہیں۔ (اسکندر)

#### دودھ کے بارے میں:

پیپ بد بو دار ہو سقیہ کی ضرورت ہوتی ہے اور دودھ پلانا ضروری ہوتو گدھی کے دودھ کا استخاب کریں۔ کیونکہ سقیہ کی اس کے اندر بیجد صلاحیت موجود ہوتی ہے، نیزاو نٹنی کا دودھ دیں اس سے تھو کئے اور خودہ دیں۔ بیاری کے شروع سے تھو کئے اور خش میں سہولت پیدا ہوگی البتہ شدید بخار کی حالت میں دودھ نہ دیں۔ بیاری کے شروع میں دودھ نہ پلا میں۔ فہ کورہ دودھ ہر یض کو تابسند ہوں تو بکری اور گائے کا دودھ دیں۔ دودھ سے اسھال آنے گئے تو دودھ کا چھاچھ پکا کر پلا میں اور بطور غذا کے بھی استعال کریں۔ بعض او قات اس کے اندر سمیذ روثی، مو بیال یا جاور س یا چاول ڈال کر کھلا میں۔ اس سے شقیہ ہوگا اور زخموں کا گوشت کے اندر سمیذ روثی، مو بیال یا جاور س یا چاول ڈال کر کھلا میں۔ اس سے شقیہ ہوگا اور زخموں کا گوشت اگے گا۔ بخار کی موجود گی میں شھنڈ کی غذا میں دیں۔ آگر مینہ ہوتو کشرات شامی کا پیتہ بند گو بھی اور بلیون اگے گا۔ بہتر یہ ہے کہ مر غیال، تیتر، بیر، چکور، اور گوریاں جو فریہ نہ ہوں دی جا میں۔ مریض شور با پیند کرے تو اس میں شہد اور کراث شامی کا پیتہ شامل کر دیں۔ خشی پیدا کرنا مقصود ہو تو مسور، بند گو بھی، اطریہ (سوئیال) نشاستہ وغیرہ شامل کر یں۔ خشی پیدا کرنا مقصود ہو تو مسور، بند گو بھی، اطریہ (سوئیال) نشاستہ وغیرہ شامل کریں۔ نمکین ایک یادوبار کھالی جائے تو اس سے اخراج ہوں خشا ہو کر سخت ہو جاتے بند گو وہ بین آسانی ہوتی ہے کشرے استعمال سے زخم خواہ کئے خراب ہوں خشک ہو کر سخت ہو جاتے بوجاتے ہو جاتے ہو ج

ہیں۔لہذا تملین سے پر ہیز کریں۔

جن لوگوں کا بلغم تیز اور نمکین ہوتا ہے ان کے لئے بے مزہ غذا کیں نہایت عمدہ ہوتی ہیں، باتی جو مریض لاغرنہ ہوئے ہوں اان کے لئے بے مزہ غذا کیں، جہازوں پر سمندر کا لطف اٹھا کیں اور جمام کریں، جو لاغر ہو چکے ہوں اان کے لئے دودھ، روغنیات اور چربیوں کی ہلکی مالش، اور سوی مفید ہے (بولس)

پھیپورے کے اندر ورم حار ہوتا ہے تو ورم حار معدہ کی طرح مریض کو پیاس نہیں لگتی۔
تنفس ٹھنڈا، رنگ سرخ اور زبانیں سخت کھر دری ہوتی ہیں، مریض ٹھنڈی ہوا میں رہنا چاہتا ہے۔
ٹھنڈے پانی سے محروم ہونے کے باعث یہ بات نہایت سکون بخش ہوتی ہے۔ (اسکندر)
کتابوں کے مطالعہ سے حسب ذیل دوامیں نے تر تیب دی ہے۔

# غزاء دوائي:

ایسے مریض کے لئے جو کھانسی کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہویا جے رطوبت کی ضرورت ہو۔ آرد
چنا، آر دبا قلااور نشاستہ گائے کے دودھ میں حلوہ بنالیں اور روغن بادام اور شکر ملا کر استعال کریں۔
اس کے بعد دوسرے دن آبزن میں جیٹھیں۔ آبزن میں خشخاش ڈال دیں تو اور بہتر ہوگا۔ حرارت
غالب ہو تو ند کورہ چیز عصار ہُجو اور دودھ سے تیار کریں۔ بخار زیادہ تیز ہو تو دودھ خارج کرکے
عصار ہُجو، روغن بادام، شکر اور اطرب یااس کے اندر حواری کی بھوسی ڈال کر استعال کریں۔
مؤلف)

### گدهی کا دود صاستعال کرنے کاطریقہ:

اس سے پھیپھڑے کی تمام بیاریوں کاازالہ ہو جاتا ہے۔ گدھی کادودھ دوہ کراستعال کریں،اور نصف النہار تک استعال کریں پھر چڑیوں کے گوشت کی بینی لیںاور اس کے اوپر ملی ہوئی (Mixed) شراب پی لیس، شراب سے ثقل اور کھٹاس محسوس ہو تواس میں شکر ملائیں اس طرح تین ہفتہ علاج کریں۔(طبیب نامعلوم)

سل کی بیاری انہیں پیش آتی ہے جن کے سینہ تنگ، گردن کبی اور شانے پروں کی طرح علق ہوتے ہیں۔

سل کے مریض کے اندر طاقت ہو تواہے گدھی کا دودھ پلائیں۔ (شمعون) اس لئے کہ

گرھی کے دودھ سے شکم چلنے لگتا ہے۔اس کی شہادت خود شمعون نے دی ہے۔(مؤلف) پیپ تھو کنے کی پرانی بیاری، پرانی کھانسی اور بد بو دار تھوک کے لئے صبح کو قطران ایک جھوٹا چمچہ استعال کریں۔(ابن ماسویہ)

# سل كى تين فتميل بين:

ا۔ سرے اترنے والے نزلہ کی وجہ سے پیداشدہ

۲۔ نفث الدم کے بعد پیدا ہونے والی بیاری کی وجہ سے پیداشدہ

نفث الدم كى وجہ ہے جو لوگ سل كے لئے مستعد ہوتے ہيں، وہى ہوتے ہيں جن كے جسموں ميں حرارت كى وجہ ہے امتلائى تفييت سر تك پہونچ جاتی ہے اور نزلے سينہ كى جانب اتر نے لگتے ہيں۔

سل کی موجود گی میں ہونے ہونے والے بخار دتی ہوتے ہیں جو بھی جدا نہیں ہوتے نیز وہ باریک(وقیق) بخار بھی ہوتے ہیں جوروزانہ باری سے آتے ہیں۔

بی سل کے اندر بلغم تقریباً پختہ نہیں ہوتا۔اس کااوپر چڑھنااور تھو کنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بلغم خارج ہوتا بھی ہے تو تھوڑا، بدرنگ، خراب اور تیزی سے تلف ہوجاتا ہے۔ جس سل میں بلغم تیزی سے پختہ ہوتا ہے اور اخراج بہ آسانی ہوتا ہے وہ زیادہ دیریک باقی رہتا ہے۔

بخار کی عدم موجود گی میں گول بلغم کا خارج ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مریض دبلا ہوجائے گا۔اس طرح کا بلغم خارج کرتے ہوئے ایک مخلوق کو میں نے دیکھاہے کہ ایک زمانہ تک ان کے جسم دیلے ہوتے رہے اور سل کے مریضوں کی طرح فوت ہوگئے۔ بیاری کے شروع میں جن لوگوں کے سینوں میں پیپ ہوتی ہے پھیچروے کے فاسد ہونے سے پہلے یہ حالت ہوتی ہے۔

اطباء قدیم نے قرحہ ریوی کے مریضوں کو تھم دیا کہ کثرت ہے گرم ہواناک کے اندر داخل کریں۔ زیادہ داخل کریے۔ نادر داخل کریں۔ زیادہ داخل کرنے سے زخم صاف ہوگا اور گرم ہوا سے پھیپیر اختک ہوگا۔ بیاری کے شروع میں حالت مجمیعر ہوجانے اور ڈھیلاپن پیدا ہونے سے پہلے پہلے یہ عمل کیا جائے گا۔ (جالینوس)

دوده سے کے بارے میں:

عور تیں مریضوں کو دودھ پلائیں تو تیزی سے آسانی پیداہوتی اور پھیھرمے کازخم سرعت

#### ے مندمل ہوجائے گا۔

### سینہ کی پیپ کے بارے میں:

ذات الجنب وغیرہ کی وجہ ہے کوئی پھوڑا پک کر پھوٹ جاتا ہے تو سینہ کے اندر پیپ آجاتی ہے۔ شروع میں ، یعنی پھوڑا انگلتے وقت سینہ کے اندر بوجھ ، تناؤاس کے بعد باریک بخاروں کا بیجان ، خشک کھانسی ، ذات الجنب کی ابتدائی حالت کی طرح ، لاحق ہوتی ہے۔

پھوڑا پختہ ہو کر پیپ زدہ ہوجانے کار جمان رکھتا ہے تو پیپ کی وجہ ہے وہ پھوٹ جائے گااور شدید کپی طاری ہوگی۔ غدہ کے اندر سرخی آ جائے گی کھانی ابھرے گی،انگلیاں گرم ہوجائیں گی خاصل کرانگلیوں کے اندر نی جھے۔ پیپ تھوڑی ہوتی ہے تو بھی اخراج کے ذریعہ صاف ہو جاتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے تو انجام سل تک بہو پختا ہے بھی ایسا ہوتا ہے پیپ بول اور برازکی نالیوں میں چلی جاتی ہے اور کی طرح کی خون آشامی نہیں ہوتی۔ بھی یہ بات طبیعت کے مخفی راستوں ہے ہوجایا کرتی ہے بیپ اور بلغم کے اندر فرق یہ ہے کہ آگ پر رکھنے سے پیپ کے اندر سے بو خارج ہوگی کیو نکہ یہ بدبودار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پانی میں تہ نشیں ہوجائے گی بلغم تیر تارہ گا۔ کس جوانب بیپ ہانی اندازہ یوں ہوگا کہ مریض کو یکے بعد دیگر مختلف پہلووں پر لٹا کیں جس جانب وہ او پی جانب کوئی تقل معلق (لئکا ہوا) محسوس نہ کرے، اس میں پیپ نہ ہوگی ھر پیپ کی آواز بھی آ واز بھی

صادر کھیں، ماء الشعیر یا ماء اللین پلائیں۔ پیپ پیدا کرناچا ہیں تو یہ دیکھیں کہ نظے ہو گیا ہے یا نہیں۔ نظے کی علامت یہ ہے کہ بخار میں سکون ہوجائے گا۔ ایسی صورت میں فراسیون، حاشاء انجیر، اور شہد کاجوشاندہ پلائیں تمکین مچھلی کے کھانے اور بوقت خواب قو قایا ہنے ہے پیپ بسرعت بنتی ہے۔ قئے ہے پیپ بسرعت بنتی ہے۔ قئے ہے پیپ کومد دملتی ہے گراس میں بیحد بڑا شگاف ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے خالص پیپ کرنے لگتی ہاور گلا گھنے کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہاس میں خطرہ ہے۔ پیپ پھٹے تو یہ دیکھیں کہ اگر کم ہوات تھو کئے ہے تنقیہ ہوسکتا ہے تو ماء العسل، ایر سا، حاشا اور زو فاد یکر اخراج میں طبیعت کے لئے سہولت پیدا کردیں۔ غذا ملین اور سہل دیں۔ چالیس دن تک اخراج ہوتا رہے تو فیہا ورنہ سل ہوجائے گا اور یہ دیکھیں کہ مشکل ہوتو جاذبہ النج (پیپ تھینچ کا آلہ) کے ذریعہ پیپ تھینج لیں اور یہ دیکھیں کہ دوئے کے قرید دفتہ دفتہ دفتہ بیپ کوچوں لیس، اور اسے ماء العسل سے دھوتے رہیں پیپ جذب

كرنے كے بعد جگه كومند مل كرنے كى جانب توجه ديں (روفس)

ذات الریہ فلغمونی پھپھڑے میں ہوتا ہے۔ زیادہ ترزکام، خناق اور رہو کے بعد ہوتا ہے نیز ذات الجنب یاسر سے اتر نے والے بعض تیز فتم نزلول کے بعد بھی ہوتا ہے جو پھپھڑے کی جانب آتے ہوں اور پھپھڑا انہیں دفع کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بعض اوقات پھپھڑے کے اندر تناؤہ حالت ابتدائی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ درد کے ساتھ ضیق تنفن، تیز بخار، ثقل، سینہ کے اندر تناؤہ امتلائی کیفیت، سرخی، چہرے میں سرخی خاص کر رخسار کی دونوں ہڈیاں سرخ ہوجاتی ہیں کیونکہ یہاں تیز بخارات پڑھ کر آتے ہیں۔ ذات الریہ بعض ان بیاریوں کے بعد پیدا ہوجن کا اوپر تذکرہ کیا کیا ہے۔ اور اس حالت میں مریضوں کی فصد کھول دی گئی ہو تواب فصد نہ کھولیں اس کے بعد پیٹ کو خالی کر کے روغن بادام تاز افزوز فانور کی ساتھ ماءالشعیر دیں۔ در داور حرارت میں سکون ہو جائے تو جو کا طوہ جوروغن بادام اور شہد سے تیار کیا گیا ہو دیں، اخراج ہونا شروع ہوجائے تو زو فااور ایر ساکش کریں حرارت جب تک رہے سینہ پر بنفشہ، موم سفید اور لعاب اسپغول کے ذریعہ بلکی مالش کریں حرارت اوپر آجائے تو گھی، ہڈی کے گودے وغیرہ کے ذریعہ مالش کریں۔ رابت اوپر آجائے تو گھی، ہڈی کے گودے وغیرہ کے ذریعہ مالش کریں۔ رابت اوپر آجائے تو گھی، ہڈی کے گودے وغیرہ کے ذریعہ مالش کریں۔ (ابن سر ایون)

كتاب الصول مين بقر اطكاحسب ذيل بيان برهاب:

حرارت غریزی کمزور ہوجائے حتی کہ بچھنے کے قریب ہو، پھر مریض سل کاخود معمول یہ ہو کہ اس باب میں اس کی حالت افزوں ہو جاتی ہو تو بھی اے اختلاط (بدعقلی فسادعقل) کی بھی شکایت ہو جاتی ہے۔ (مؤلف)

ذات الرئد کے مریض کا تنفس سخت متواز اور عظیم ہو تاہے۔

زخموں کی وجہ سے پھیپھڑے کے اندر درد نہیں ہوتا۔البنۃ ثقل ہوتا ہے۔ تناؤ کثرت سے ہوتا ہے جوعظم القس سے پشت کی ہڈی تک پہونچتا ہے کیونکہ پھیپھڑے کو جو جھلیاں احاطہ کرتی ہیں وہ فد کورہ مقامات سے مربوط ہیں۔اس میں فلغمونی قتم کا جو ہوتا ہے اس میں ضیق تنفس ہہ کثرت ثقل، بخار اور رخسار کی ہڈیوں میں سرخی ہوتی ہے البتہ التہاب نا قابل برداشت ہواور مریض کمزور وناتواں ہوتواس کا مطلب یہ ہے کہ ورم حمرہ ہے (جالینوس)

اوراگرالتہاب کم ، بخار میں سکون اور ثقل زیادہ ہو توور م بلغی ہوگا۔ (مؤلف) سوء مزاج رئد بلا مادہ غیر مساوی ہو تو کھانسی پیدا کرے گا اور مساوی ہو تو تھوڑا ہونے کی صورت میں تنفس تبدیل کردے گا۔ تیز اور گرم ہونے کی صورت میں ہوائے سر دہیں سانس لینے اور آب سر دپینے کی خواہش پیدا کرے گا۔ زیادہ مدت گذر جانے کے بعد بخار بھی آئیں گے۔ سر د ہونے کی صورت میں برعکس اسباب لاحق ہوں گے۔ یعنی ہوائے گرم میں سانس لینے اور آب گرم پینے کی خواہش ہوگی بشر طیکہ سوء مزاج تھوڑا ہو، زیادہ ہونے کی صورت میں پھیپھڑے کے اندر مواد بھر جائے گا۔ (جالینوس)

اس کے بعدر بولاحق ہوگا۔ یہال ایسے ربو کاعلاج کرنادرست ہوگا جس کے ساتھ بخار نہیں ہو تا۔ (مؤلف)

گول بلغم مریض کو زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد سل اور لاغری کی حدیک پہونچا دیتا ہے کیونکہ اس سے سینہ کے اندر بہ کثرت حرارت کا پنۃ چلتا ہے۔

سرے اترنے والا دائمی نزلہ مریضوں کے اندر کھانسی اور گلا بیٹھنے کی کیفیت پیدا کر تا ہے۔ زیادہ مدت گزرنے پر کھانسی کے اندر سکون پیدانہ ہو تو سل ہو جاتا ہے۔

# سل کی بری قشمیں دوہیں:

ا۔ سرے متوازازنے والے نزلہ سے پیداشدہ سل۔ ۲۔ نفس رئد کے اندر پیداشدہ آفتوں سے لاحق ہو جانے والا سل زیادہ تربیہ قتم نفث الدم کا نتیجہ ہوتی ہے بالخصوص نفث الدم جب کہ در دسر سے لاحق ہوا ہو۔

# سل کی بنیادی قشمیں تین ہیں:

ا۔ سرے اترنے والی چیزے پیداشدہ سل۔ کہ تھے ہو

۱۔ کسی بھی عضوے اتر کر پھیپیرٹ میں آنے والے مادہ کی وجہ سے پیدا ہونے والاسل۔ ۱۳۔ پھیپیرٹ کے اندر ابتدائی طور پر ہونے والاسل۔ جیسے نفٹ الدم ریوی، پھیپیرٹ کی جانب جومادہ آتا ہے وہ زیادہ ترسینہ اور حجاب سے آتا ہے۔ جانب جومادہ آتا ہے وہ زیادہ ترسینہ اور حجاب سے آتا ہے۔ بھی جگر اور معدہ سے بھی آتا ہے۔ (جالینوس)

میامر میں حسب ذیل بیان پڑھ چکا ہوں: کھانسی کی ایک فتم ایسی ہے جو قصبۃ الرئہ کے کھر درے پن سے پیدا ہوتی ہے اس میں مملس ادویات مثلاً انگور کا گاڑھارس، نشاستہ،انڈ ااور کینتر ااستعمال کریں۔(مؤلف)

# مرطوب کھانسی کے لئے بالخصوص عدہ دوا:

شب ۲، افیون ۲، بارز د۲، میعه ۷ مقدار خوراک ۵ ساگرام (جالینوس)

بھی سینہ اور پھیپیرٹ مرطوب ہو جاتے ہیں،ایسی حالت میں زاج نے زیادہ مفید اور کوئی چیز نہیں ہے۔مقد ارخوراک ۵گرام۔میرے نزدیک سل کو خٹک کرنے کے لئے عجیب وغریب ہے۔ اس طرح ند کورہ گولی بھی۔(مؤلف)

سل کے جن مریضوں کا مزاج خٹک ہوتا ہے خزال کا موسم جس کے اندر شالی ہوا موجود ہو انہیں مفتر ہوتا ہے۔اس کی وجہ سے سینہ اور پھیچر سے کے اندر اہتز از پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح شالی ہوا جس کے اندر رطوبت نہ ہو مثلاً موسم سر ما،اور حرارت نہ ہو، تو تھوڑا تخلیل کردیتی ہے۔اس لئے یہ نقصان پہونچانے کے لئے موافق ہوتی ہے۔(مؤلف)

عروتی فسادگی وجہ سے نفث الدم ہو تو فصد نہ کھولیں۔ شہد جیسی غذاؤں اور ماء الشعیر جیسی معدل اشیاء کے ذریعہ تنقیہ کریں۔ خشک کرنے والی ایسی ادویات پلائیں جن سے سوزش نہ ہو۔اور قرص کہرباء جیسی قابض دوائیں دیں۔ (ابن ماسوبیہ)

حدت، ورم، یا عروتی فساد ہے جن لوگوں کو سل ہوجاتا ہے انہیں مسلسل نرم بخار رہتا ہے، جسم لاغر ہوجاتا ہے، ناخون میر ھے ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ ناخون کے نیچے گوشت بگھل جاتا ہے۔ حالت دیر تک باتی رہتی ہے تو بال جمڑ نے لگتے ہیں۔ سقیہ ہاور زیادہ جمڑ نے لگیں گے۔ اس کے بعد نفث الدم (اخراج) بند ہونے لگتا ہے یہ حالت موت کے قریب پیش آتی ہے کیونکہ اس وقت مریضوں کو دست آنے لگتے ہیں اور وہ مرجاتے ہیں۔ اس ہے قبل اشتہا ختم ہوجاتی ہے، شکم تحلیل ہونے لگتا ہے۔ ایمی صورت سل کے مریضوں کی ہوتی ہے، شکم تحلیل ہونے لگتا ہے۔ اخراج بلغم ناممکن ہوجاتا ہے۔ یہی صورت میں شروع سے نہ کورہ علامات کے رونما رہے ہوتے ہیں۔ طاقت بالکل گرجاتی ہے ایک صورت میں شروع سے نہ کورہ علامات کے رونما ہونے کے وقت تک اخراج رک جاتا ہے تو یہ بیاری کے خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ شروع ہی پیشنگی قطعا نہیں آتی۔ شروع ہی بیشنگی قطعا نہیں آتی۔

بخار کی موجود گی میں پھیچرے کے زخم کاعلاج:

آطفد، تبرید، اور ترطیب کے ذریعہ، پھر زخم کو ختک کردینے کے بعد بخار میں سکون ہوجاتا

ہ، واضح رہے کہ عروتی فساد کے باعث پیداشدہ پھپچرٹ کازخم مند مل نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح کازخم صحت کے لئے کمی مدت چاہتا ہے۔ اس مدت کے اندرزخم متعفن ہوکر سخت ہوجاتا ہے چنانچہ پورا پھپچرٹ فاسد ہوجاتا ہے یا پھر فساد کے وقت پھپچرٹ اختک ہوکر سخت ہوجاتا ہے اور تا قابل اندمال صورت اختیار کرلیتا ہے۔ واضح رہے کہ عروتی فساد کے باعث پیداشدہ زخم کا فوری تدارک نہ ہوا تو سل کا فد کورہ بالا انجام ہوکر رہتا ہے۔ ایس حالت میں یعنی جب کہ عروتی فساد کا فوری علاج نہ کیا گیا تو ممکن حد تک زخم کو ختک کرنے پر توجہ دیں اور اس سے ہوشیار رہیں کہ سرسے پھپچرٹ کی جانب میں چیز کا انصاب نہ ہونے یائے۔ اس کے لئے سرکا تعقیہ کردینے والا مسہل استعمال کریں نیز مانع نزلہ ادویات سے کام لیں۔ اس مقصد کے لئے مریض کو دیا قوزہ دیں سر میں شدید امتلائی کیفیت موجود ہو تو قیفال کی فصد کھولیں۔ اس کے بعد سرکا تعقیہ کردینے والا مسہل دیں بشر طیکہ بخاریا نرم بخار نہ ہو، بخار اور خی بخاریا نرم بخار نہ ہو، بخار اور خی سے بخاریا نرم بخار نہ ہونے کے صورت میں حسب ذیل نیخ استعمال کریں:

### نسخه

مسہل دوائیں دیں۔ کشر افراج (بلغم) کا اهمتام کریں۔ حرارت جس قدر کم ہوای قدر ملطف کی قوت بڑھادیں۔ افراج بلغم کی کشرت ہے مریض نج جائیں گے۔ ان کی موت اس لئے بھی ہوتی ہے کہ افراج کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ ادویات اور ضاد کے ذریعہ خطکی پیدا کرنے ہے احرّاز کریں۔ اس کے بر عکس ترطیب ہے کام لیں۔ دودھ پلائیں تواس کے ساتھ کچھ قاطع اودیات شامل کریں۔ زخم کی وجہ ہے جو سل ہو تا ہے اے ممکن حد تک ادویات اور ضاد کے ذریعہ خشک کریں۔ سینہ پر صبر ، مر ، اقاقیا ، جوزالسرو، رامک ، کہریا، اور خاکستر بندگو بھی کا ضاد رکھیں۔ روغن آس یا روغن گل کے ذریعہ تد ہین کریں، حرارت موجود ہو تو برگ خلاف، طرفاء، گل سرخ اور صندل استعال کریں (اسحاق)

یہاں اسحاق کی جو گفتگو پیش کی گئے ہے وہ مکمل خلاصہ ہے یہ ضرورت ہے کم ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فساد رایوی ہے ابتداء یا ابتداکے بعد رگ کے بھٹ جانے ہے پھیپے ہوئے کی جو حالت ہوتی ہے اس کا نیز پیپ اور پھیپے ہوئے کے بھوڑے کا علاج ہم خود پیش کر دیں۔ سل غلیظ کا جو علاج اسحاق نے پیش کیا ہے وہ ہر حق ہے بعنی اس کا علاج وہی ہے جو ربو کا ہے البتہ اس کے ساتھ حرارت بھی ہوتی ہے لہذا تھوڑی فصد کھول دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ (مؤلف)

یہ ارادہ کرلیں کہ سینہ سے پیپ کی صفائی منہ کے ذریعہ اخراج سے کرنی ہے تو تدبیر بھاری (غلیظ) اور ابھارنے والی کریں۔ اس موقع پر قاطع ادویات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سینہ کا تنظیہ اخراج کے ذریعہ کرنا ہو تو ابھارنے کے ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ چیزیں ملین اور ملطقت ہول کوئی چیز مغلظ (گاڑھاپن پیدا کرنے والی) ہر گزنہ ہو۔ استفر اغ تھوڑا تھوڑا کرنا چاہئے تاکہ طاقت نہ گرے خارج ہونے والی پیپ سفید ہو تو مریض کا نیج جانا اور اس کے زخمول کا مند مل ہو جانا زیادہ سز اوار ہے۔ پیپ اگر بد بودار اور خراب ہو تو یہ حالت اس بات کی زیادہ سز وار ہے کہ فاسدز خم کا تنظیم کیا جائے۔ (ابن سر ابیون)

### سل کے مراتب اور ابواب حسب ذیل ہیں:

ا۔نفٹ الدم مز من، ذات الجنب، پیپ کے بننے، ذات الرئد اور ذات الحجاب کی ابتدا۔ ۲۔پیدا ہونے والا تیزنزلہ جو پھیپیرٹ کو فاسد کر دے۔ ۳۔ بکثرت غلیظ مادہ جس سے پھیپیرٹ انجر جائے۔ یہ جھاگ دار سل ہوتی ہے مؤخر الذکر دونوں فتمیں سرے انصباب نزلہ کی پیداوار ہوتی ہیں۔ سینہ کی تجویف تک سر ایت کرنے والے پھوڑے سے صحت ہو جاتی ہے،امعاءاور معدہ تک سر ایت کرنے والے پھوڑے سے صحت تقریباً نہیں ہوتی، کوشش یہ ہونی چاہئے کہ پھوڑے کے شکاف کے مند مل ہونے سے پہلے وہ جگہ مند مل نہ ہوجس کا تنقیہ کیاجارہاہے۔(مؤلف) سل کے مریضوں کی آئی تھیں و صنس جاتی ہیں۔ناک کا کنارہ تیز ہوجا تا ہے کنپٹیاں چپک جاتی ہیں۔ شانے اور کہنیاں اس صد تک او پر اٹھ جاتی ہیں کہ جسم سے الگ ہو کر معلق ہو جاتی ہیں، کیا معلوم ہوتی ہیں جسے پر لگے ہوئے ہیں۔(جالینویں)

واضح رہے کہ مجنین (وہ مریض جن کے شانے وغیر ہ پر جیسے معلوم ہوں) وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کنپٹیاں اور تمام بازو پہلوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ایبااس لئے ہو تا ہے کہ دونوں شانے پشت کے اندر سے ابھر کر او پراٹھ جاتے ہیں، کیونکہ بالارادہ یہ صورت اختیار کرتے ہیں تو بازو پہلوے دور کرنا پڑتا ہے بالحضوص جب کہ اس کے ساتھ اے او پراٹھالیں۔(مؤلف)

جس تھوک کے اندرزیادہ خون شامل نہ ہو، خون نہایت سرخ اور ایساذات الرب کے شروع میں ہو تو یہ سلامتی کی نہایت اعلی علامت ہے۔ بیاری کی اس حالت پر ایک ہفتہ یااے زیادہ عرصہ گزر جائے اور ٹھنڈک کا یہی حال ہو تواس میں ہلاکت کا کم ہے کم امکان ہو تا ہے (بقراط)

اس طرح کا تھوک اس بات کی علامت ہے کہ پھیپیرٹ کاورم دمونی ہے یہ ورم چار سے سات دنوں کے اندر پک جاتا ہے۔ ساتویں دن کے بعد بھی علی حالہ باقی رہے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا پکناد شوار ہے۔ پلنے میں دریر ہو تو ایسامر یض یاطبیب کی غلطی ہے ہوگا یا پھر یہ بات ہوگی کہ مریض کی طاقت پہلے ہی گرچکی تھی۔ورم کا بحالہ باقی رہنا عمدہ نہیں ہے (جالینوس)

#### مفردات:

زفت رطب نفٹ الدم کے مریض کے لئے عمدہ ہے۔ دوسر ہے مریض اسے ۵۔ کا گرام پلاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں۔ پیپ تھو کئے ہیں سہولت پیدا کرنے کے لئے شہد مفید ہے۔
ر بو کے لئے وہ مٹی تجویز کی گئی ہے جو مریض سل کے زخموں کو حقک کردیتی ہے حتی کہ کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ سال ہے زخموں کو حقک کردیتی ہو جائے۔ نواحیر کھانسی بند ہو جاتی ہو جاتے ہیں اس طرح پھیچرٹ کے زخموں کو بھی خٹک کر دینے والی دواؤں جس طرح چپک کر خٹک ہو جاتے ہیں اس طرح پھیچرٹ کے زخموں کو بھی خٹک کر دینے والی دواؤں سے فائدہ بہو نچتا ہے حتی کہ اکثر لوگوں کو اس کے استعال سے اپنے صحتیاب ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ خٹک آب وہ وامیں منتقل ہوئے اور اپنے تحفظ کی با تیں ترک کر دیں۔ علاج چھوڑ

دیا تو کھانسی دوبارہ عود کر آئی جیسا کہ نواحیر بھی جسمانی امتلاءے مرطوب ہو جایا کرتے ہیں۔ (جالینوس)

قطران ۵۵ گرام جائے ہے پھیپر سے کے زخم صاف اور تبدیل ہوجاتے ہیں۔ حب الغار پھیپر سے کے زخم اور عشف کے لئے عمدہ ہے۔ غاریقون پھیپر سے کے زخموں میں طلاء کے ہمراہ پلاتے ہیں۔ کراث نبطی قرحہ ریوی کے لئے عمدہ ہے۔ (دیاسقوریدوس)

حجاگ (کف دریا) سینہ اور پھیپھڑے کی بیاریوں کو پختہ کر دیتا ہے اور کھانسی میں مفید ہے۔ (اریباسیوس و بولس)

سر طان نہری کاشور بااور گوشت سل کے مریضوں کے لئے عمدہ ہے۔ (ابن ماسویہ) سوس سینہ کی پیپ کو تحلیل کر دیتا ہے۔ (خوز)

صمغ عربی بیحد شفنڈی اور خشک ہوتی ہے یہ پھیپھڑے کے زخموں کی مصر توں کاازالہ کردیق ہے۔(ابوجریج)

نوجوان سل کی بیاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بوڑھا ہونے پر مر جائے گا۔ (بقر اط) بقر اطنے بیہ بات اس لئے کہی ہے کہ لوگوں کے اس خیال کو غلط بتایا کہ مریض سل کی عمر اتنی ہی کہی ہوتی ہے جتنی اس کی عمر ہوتی ہے۔ (مؤلف)

ذات الرئے مریضوں کو تھم دیا جائے کہ عورت کی چھاتی ہے دودھ پینیں۔ (آرومن وابودینس)

اس کا مطلب بیہ ہے کہ سل کی ابتدا میں دودھ استعال کیا جائے کیونکہ ذات الرئہ نام ہے سل کی ابتدا میں دودھ استعال کیا جائے گیونکہ ذات الرئہ نام ہے سل کی ابتدا کا۔ الابیہ کہ خیال ہو کہ تھو کی جانے والی شئے میں اس سے ہمیشہ بعج ہوتا ہے یا تھوک کے اندر بہت کم چیز ملتی ہو۔ تھو کی جانے والی چیز ہمشقت تھوڑی تھوڑی تھو کی جارہی ہو۔ یہ حالت پختہ ہونے کے لئے بہت کم ہے بر تھس حال بر تھس نتیجہ کا حامل ہے۔

حرارت اور بخار کی موجودگی میں پیپ تھو کنے والے مریض کیلئے مجون کا عمدہ نسخہ:

لومڑی کا پھیپھڑا، بادیان، رب السوس، عصار ہُرِسیاوشاں، شکر پانی کے اندر شامل کرکے اور پکا کر گاڑھاکرلیں۔(مؤلف)

البحران کے تیسرے مقالہ کے شروع میں جالینوس کا بیان ہے۔ ''رعاف(نکسیر ٹوٹز) ورم ریوی کے مشابہ نہیں ہے، یہ ذات الجنب کے مشابہ ہے''۔ مرادیہ ہے

کہ یہاں عمدہ بحران نہیں ہوتا۔ یہیں سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذات الجنب کے باب میں فصد کھول دینا۔ ذات الرئہ کے مقابلہ میں زیادہ ضروری ہے ذات الرئہ میں فصد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الا بیہ کہ فصد کے لئے اکثر علامات نمایاں ہوگئی ہول۔ (مؤلف)

سل کی ایک تم نہایت خراب، خبیث اور بسر عت موت طاری کردینے والی والی ہوتی ہے۔
اس فتم میں یا تواصلاً تھو کی جانے والی شئے بختہ نہیں ہوتی یا ہوتی ہے مگر برگودار اور کم ہوتی ہے مریض
اوپر آنے والی چیز کو تھوڑا تھوڑا تھینچ پا تا ہے۔اس کی ایک اور تم ہوتی ہے، یہ خراب نہیں ہوتی ہے اور
تادیر قائم رہتی ہے۔ یہ خوب پکتی اور تھوک کے ذریعہ بہ آسانی خارج ہوتی ہے۔ (جالینوس)
یج دانت نکلنے کی عمر تک چونکہ ان کے اندر نشو ونماکی قوت زیادہ ہوتی ہے اسلئے بیجد دشوار

امراض سے بچےرہتے ہیں بالخصوص دانت نکلتے وقت وہ کسی مشکل بیاری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ (جالینوس)

یہ پھیپھڑے کے زخموں سے بالحضوص بچے رہتے ہیں۔ زخم ہوبھی جاتے ہیں تو تیزی سے مند مل ہو جاتے ہیں چو نکہ مزاج مرطوب ہو تا ہے اس لئے ان کے اندر دق کی بیاری تقریباً نہیں ہوتی۔ کئی بچوں کے اندر ذات الرئد کا متحکم زخم میں نے دیکھا ہے۔ یہ بچ مکمل طور پر صحتیاب ہوئے۔ (مؤلف) بچوں کے اندر ذات الرئد کا متحکم زخم میں نے دیکھا ہے۔ یہ بچوں کے متمام امراض بہت جلد پختہ ہوتے ہیں ان سے وہ بہت جلد صحتیاب ہوجاتے ہیں۔ بچوں کے تمام امراض بہت جلد پختہ ہوتے ہیں ان سے وہ بہت جلد صحتیاب ہوجاتے ہیں۔ (جالینوس)

سل کی بیار کی دقیق لازم بخارے خالی نہیں ہوتی۔ یہ بخارکی بخاروں ہے مرکب بھی ہوتا ہے، مثلاً پانچویں دن آنے والا بخار اور ناغہ دیکر آنے والا بخار (شطر الغیب) روزانہ آنے والا اور ناغہ دے کر آنے والا بخار۔ سب سے زیادہ برااور مہلک بخاروہ ہوتا ہے جوپانچویں دن آنے والے بخارے مرکب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناغہ دے کر آنے والا بخار پھر روزانہ آنے والا بخار۔ (جالینوس) سر کو منڈ اکر اس پر خردل، تافشیا، اور بیٹ کورتر کا طلاء اسوقت کرتے ہیں جب مادہ سرکی جانب از کر گرم گرم پھیپورے کی جانب آتا ہے اور بخار نہیں ہوتا۔ اس وقت فصدے ابتد اکرنی چاہئے۔ سر مونڈ اجائے اور ندکورہ ادویات کا اس پر طلاء کیا جائے۔ نزلہ کوروکئے کے لئے منوم، مخدر اور مغری ادویات استعال کی جائیں۔

یمل بیاری کے شروع میں کیاجاتا ہے بشر طیکہ نزلہ پھیپھڑے کوزخمی کرنے کی حد تک نہ بڑھ گیا ہو۔ مریض اس علاج سے مکمل صحتیاب ہوجاتا ہے۔ زخم ہوجانے کی صورت میں پھیپھڑے کو شک کرنے کی تدبیر کرنی چاہئے، گرصحتیابی کے لئے کوئی راہ نہیں ہے۔ (جالینوس)

سل کی بیہ تیسری فتم نہایت خبیث اور خراب فتم ہے۔ شروع میں مذکورہ تدبیر کے ذریعہ نزلہ روک کراور ختک کرنے والی اور مخدرادویات کے استعال سے صحت لائی جاسکتی ہے۔ اس سل کی علامت بیہ ہے کہ کھانسی کے بغیر نفث الدم ہوگا۔ نفث تیزنہ ہوگا حالت دیر تک باتی نہ رہے گی، نفث الدم بھی بار بارنہ ہوگا۔ البتہ نفث کی ابتدامیں بیہ کیفیت رہے گی۔ (مؤلف)

پھیچروے کا ایک پھوڑا مشاہدہ میں آیا جو سکڑ کر خون کرنے لگا پھریہ خون پیپ بنااور مریض صحتیاب ہو گیا۔ بیریانچ سال کا بچہ تھا۔ (مؤلف)

# سل کی بیاری حسب ذیل اطوارے لاحق ہوتی ہے

ا۔ ابتدائی طور پر پھیپھڑے میں پھوڑا ہو جائے۔

۲۔ پہلومیں پھوڑا ہو جائے اور پیپ کا انصباب سیند کی جانب ہونے گئے اور سینہ صاف نہ ہو سکے۔

س۔ زند کا انصباب سرکہ جانب ہونے گئے۔

سم۔ ربومز من باعث بن جائے۔

۵۔ نفث الدم سبب بن جائے۔

یہ ساری قشمیں علاج سے جاتی رہتی ہیں، بہ شرطیہ کہ فساد پیدانہ ہو۔فساد پیدا ہو جانے کی صورت میں پھیپھڑے کو فقط خٹک کیا جاتا ہے۔ دودھ سب سے عمدہ دوا ہے اس سے سل کی تمام قسموں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یہ ردی خلط کی تعدیل کرتا ہے۔اخراج کے اندر سہولت پیدا کرتا ہے۔ طاقت کو بڑھا تا ہے۔ قرحہ کو دھو کر صاف کر دیتا ہے اور مند مل بھی کر دیتا ہے کیونکہ یہ قرحہ کو سکوڑ دیتا ہے۔(مؤلف)

ایک فخص کوذات الرید کی بیماری ہو گئی۔ صحتیاب ہوا تو بازو بیجیے کی جانب ہے، داخلی پہلو ہے اور پیش بازو کے دونوں مقامات انگلیوں تک بے حس ہوگئے۔ بعض لوگوں کی حرکت کے اندر بھی تھوڑی مصرت لاحق ہو گئی ہے، ایسااس لئے کہ جو مقامات ......(۱) کے در میان واقع ہیں ان میں پہلے اور دوسرے مقام ہے نکلنے والے اعصاب کو مصرت لاحق ہوگی۔ (جالینوس)

ذات الرئه اور ذات الجنب كے مریض كو صحتیابی كے بعد بھی حس وحر كت كے اندر د شوار ی پیش آتی ہے۔اے سجھنے كے لئے باب الفالج كامطالعہ كریں۔ (مؤلف)

<sup>(</sup>١)اصل مي بحى عبارت چيونى موكى ب

#### دودھ کے بیان میں:

دودھ پھپچوں کے زخم کو صحتیاب کر دیتا ہے کیونکہ اپنی مائیت سے اس کی صفائی کر دیتا ہے۔
پیرے قرحہ پر مہر لگادیتا ہے پیسل کے مریضوں کو قطعی طور پر صحتیاب کر دیتا ہے۔ البتہ جس مریض
کا بخار طاقتور ہوتا ہے وہ لاغری کی حد تک پہونچ جاتا ہے تو دودھ کو ہضم کرنااس کے بس سے باہر ہوتا
ہے۔ دیگر لوگوں میں بخار کی حرارت سے دودھ میں تبدیلی واقع ہوجاتی ہے۔ (فلاذیوس)
گدھی کا دودھ لکڑی کے بیالہ میں بینا چاہئے۔ جس پانی کے ہمراہ اسے پیاجائے وہ بارش کا پانی ہونا چاہئے۔ جس پانی کے ہمراہ اسے پیاجائے وہ بارش کا پانی مونا چاہئے۔ سینہ پر ایک بارتازہ مر ہم ہیرون تک رکھیں اور دوسری بارچاہیں تو طلاء کریں۔ احتباس میں ماء العسل دیں۔ رب السوس نہایت مؤثر ہے۔ اسے شب میں دیں، مریض اسے زبان کے سنجے رکھے۔ (فیلغریوس)

# پرانے سل اور کبڑے بن کے لئے نہایت عمدہ نسخہ:

روزانہ ایک کیڑا آش جو کے ہمراہ جوش دیں۔ کھانے میں بیضہ کا گودااور پہیہ مرغ اور روغن بادام کے ساتھ نرم پنجنی دیں۔ کھانے کے بعد مریض کو تھوڑا آبزن میں بٹھائیں۔ زیادہ دیر تک نہیں۔اس کے بعدروغن بنفشہ سے ہلکی مالش کریں۔ (پختیشوٹ)

قصبۃ الرئہ میں پھوڑے اور ورم کی علامت ہے کہ بخاری سخت ہوگا، پشت کے وسط میں تزپ، جم میں خارش، آواز بیٹی ہو کی اور منہ کے ہو مجھلی جیسی ہوگ۔ پھیپوڑے کے اندر بھی پانی آجا تا ہے، اس کے ساتھ ہلکا بخار سلسل ہو تا ہے سوء تفس، اطراف میں ورم، مواد کا اخراج ہو تا ہے اور دیر تک ہو تار ہتا ہے۔ بھی ایسے محسوس ہونے لگتا ہے جیسے استشقاء کی بیاری ہوگئی ہے۔ بھی یہ پانی شکم کے نیچ اتر آتا ہے ایسی صورت میں تفس پہلے ہلکا پھر بھاری ہوجاتا ہے پہلوسے آپریشن کر کے بیب کے علاج کی طرح علاج کریں۔ (بقراط)

بہیں ہوئے کے پھوڑے کے بھوڑے کے ساتھ شدید بخار، گرم تنفس متواتر، منہ کی بدیو، طاقت میں ڈھیلا پن، شانے کے پنچ بہنلی اور چھاتی میں تڑپ، سینہ کے اندر بوجھ اور مریض پر ہذیانی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کچھ مریضوں میں ایہا ہوتا ہے کہ وہ کھانسی کی حد تک تڑپ محسوس نہیں کرتے۔ جھاگ سفید مادہ کا اخراج کرتے ہیں۔ شروع میں زبان سرخ پھر سیاہ ہوجاتی ہے۔ سیابی تیزی سے نہ آئے تو پھوڑا پھوٹے کے لئے بے قرار ہوگا زبان پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ چیک جائے گا۔ مرطوب المراج

مریضوں کے اندر در دزیادہ تیز ہوتا ہے۔ تھوک کے اندر شیرینی محسوس ہونے لگے تواس کا مطلب یہ کہا ہور نے کہ بھوڑے کے اندر پیپ ساف ہو گئی تو ہو گئی ورنہ ایک سال تک ہاتی رہے گا۔ (البقراط) ایک سال تک ہاتی رہے گا۔ (البقراط)

علاج سر کے استقراع کے کریں تاکہ پھیچڑے کی جانب بہہ کر کوئی چیز نہ آسکے۔ مریف کوشیر میں حلوہ دیں تاکہ پھوڑا پک اور دھل جائے۔ چار یاپائی دن تک یہ مل کریں اور شیر بنی ترک کردیں اور کوشش کریں کہ مادہ اوپر آئے، شکم مہل ہو جائے تاکہ بخار کے لئے کوئی قابل قدر طاقت باقی نہ رہے۔ ورنہ طاقت گرجائے گی اور صحت ہونا ممکن نہ ہوگا۔ پیپ بہ کر سینہ کی جانب آجائے تو ایسا محسوس ہوگا کہ افاقہ ہوگیا ہے مگر پچھ ہی دنوں کے بعد حالت خراب ہو جائے گی پندرہ دنوں سے پہلے پہلے جلد ہے جلد پانی گرم کرو پھر مریفن کو نہار منہ ایک کری پر بٹھا دو۔ ایک خض شانوں کو پکڑ کر کری پر بٹھا دو۔ ایک خض شانوں کو پکڑ کر حرکت دے، آپ اپناہا تھ مریفن کے سینہ کے دونوں جانب رکھ کر دیکھیں کہ پیپ سی پہلو ہے جس پہلو ہو ہوتی ہے۔ جس مریفن کی بٹھی پیپ میں پہلو ہو جس پہلو ہوتی ہے۔ جس مریفن کی بٹھی پیپ امید باتی ہو تو اس کا آپریشن کردیں۔ کتاں کی ایک و بٹی لیکر گل سرخ بیں ڈبو کر پہلو پر چھڑک دیں جو مقام جلد از اجلد اختک ہوتا ہو تا ہو دون ہی جہاں پیپ کا اجتماع ہوتا ہے۔ اس کے سخت ہونے ہاں کی جگہ معلوم ہو جائے گی۔ لہذ او ہیں آپریشن کریں۔ سر کو نزلوں سے محفوظ رکھیں۔ معدہ کو شنڈی کی جگہ معلوم ہو جائے گی۔ لہذ او ہیں آپریشن کریں۔ سر کو نزلوں سے محفوظ رکھیں۔ معدہ کو شنڈی کی جگہ معلوم ہو جائے گی۔ لہذ او ہیں آپریشن کریں۔ سر کو نزلوں سے محفوظ رکھیں۔ معدہ کو شنڈی کی جگہ معلوم ہو جائے گی۔ لہذ او ہیں آپریشن کریں۔ سر کو نزلوں سے محفوظ رکھیں۔ معدہ کو شنڈی سر استعال کرتے ہیں۔ (مؤلف)

できいないというとしまるとなってはないとはないというとう

# بإنجوال باب

ذات الجنب، ذات الجنب اور ورم سمبد میں فرق اور ورم رئے نیز ورم حجاب میں فرق ذات الجنب میں جو چزیں اکٹھاملتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

ا۔ تیز بخار۔

۲۔ پیلیوں کے اندر چھین جیسادر د۔

س۔ تنفس میں تبدیلی۔

سمه اور کھائی۔

کھانی تو آتی ہے مگر مریض کوئی چیز کھانسی کے ذریعہ تھو کنا نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مرض قطعی طور پر پختہ نہیں ہوا ہے۔ دوسر ہے یہ کہ کوئی چیز تھو کتا بھی ہے تووہ چیز نامحمود ہوتی ہے۔اس کی دوفتمیں ہیں۔

ا۔ تھو کی جانے والی شئے کے اندر فقط تھے نہ ہو۔

۲۔ تا پختہ ہونے کے علاوہ فی نفسہ ردی اور خراب ہو۔

پختہ تھوک ان دونوں کے برعکس ہوتا ہے۔ اس کواطباء خصوصیت سے "بزاق" کہتے ہیں۔
ان کا معمول ہے ہے کہ "بزاق"اس تھوک کووہ نہیں کہتے جوخون، مرارہ، بلغم یا جھاگ سے مشابہ ہو۔
ان تمام چیزوں کووہ "نفث" سے تعبیر کرتے ہیں۔ "نفث" کے اندر خون، صفراء،اور سوداء کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تواہے وہ بزاق کانام دیتے ہیں مرض پیدا ہونے کے بعد سے بزاق تیزی سے پیدا ہوجاتا ہے تو کم ہوتا ہے۔ نفث کچھ بھی نہ ہویا ہو گرنا پختہ ہوتو مرض کے طویل ہونے کی علامت ہوتا ہوتا ہے۔

خراب ہونے کے ساتھ خبیث بھی ہوتو موت کی خبر دیتا ہے۔ (جالینوس)

گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ بیاری کے بعد نفث کانہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پیپ قطعاً پختہ نہیں ہوتی ہے۔ جس قدر نفث میں تاخیر ہوگی نظ کا زمانہ بھی ای قدر دراز ہوگا۔ نفث ہونا کی بیاری کے ہونے کی دلیل نہیں ہے البتہ یہ بختہ، محمود، اور ردی کیفیات سے خالی ہو حتی کہ براق سے کہا جا سکے اور بیاری کے بعد جلدرو نما ہوا ہو تو بیاری کے کم ہونے کی دلیل ہے۔ ان صفات کے بر عکس ہوتے اور بیاری کے بعد جلد رو نما ہوا ہو تو بیاری کے کم ہونے کی دلیل ہے۔ ان صفات کے بر عکس ہوتو اس بات کی علامت ہوگا کہ مرض فقط طول تھنچے گابشر طیکہ نفث صرف نا پختگی کی حد تک ہولی جن براق کے بعد بر عکس کیفیات کم ہوں، جیسا کہ آگے ہم بیان کریں گے یا پھر وہ اس بات کی علامت ہوگا کہ موت قریب ہے۔ ایسا اس وقت ہوگا جب نا پختہ ہونے کے ساتھ "نفث" ردی اور خبیث ہوگا۔ (مؤلف)

جن چیزوں کو 'تفت'' کہتے ہیں ان میں شوخ سرخ رنگ، زر درنگ، جھاگ داریا پتلااس بات
کی علامت ہے کہ محض نفیج نہیں ہو سکتا ہے۔ ان سے کسی خطرہ کا اندازہ نہیں ہوتا مگر جس نفث کارنگ
نہایت سرخ، نہایت زرد، نہایت سبز، بیحد جھاگ دار، لیسدار، یا گول ہوگا وہ ردی ہونے کی علامت
ہے۔ ان میں جو زیادہ سیاہ ہوگا وہ اور زیادہ ردی ہوگا۔ ای کے ساتھ یہ دیکھیں کہ تنفس میں آسانی
ہورہی ہے مشکل۔ اگر اخراج بسہولت ہورہا ہے تو عمدہ اور محمود اور برکس ہے تو ردی
ہوگا۔ (جالینوس)

اخراج میں آسان ہونا عدہ ہونے کی علامت ہے، خارج ہونے والی شئے کا عدہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ سبزیا سیاہ نفث بسہولت خارج ہور ہا ہو تواس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ نفث محمود ہے۔ اخراج کی جہت محمود ہے۔ مثلاً دونفث خراب ہونے میں برابر ہوں مگرایک زیادہ آسانی سے خارج ہور ہا ہو تو اس کے اندر فساد کم ہوگا۔ بر عکس صورت حال بر عکس ہوگی۔ (مؤلف)

تقدمہ المعرفۃ میں بقراط کا ایک بیان ہے کہ اے یہاں میں پیش کررہا ہوں، وہ لکھتا ہے کہ " "سینہ پھیپیر ااور پسلیوں کے تمام در دوں میں براق کو بہ آسانی خارج ہونا چاہیئے۔ سرخ رنگ براق کے اندر بری طرح شامل ہوگا"۔

اس گفتگونے ثابت کردیا ہے کہ بقراط کے نزدیک ایک ندکورہ بالا''نفث طبعی'' یہ ہے کہ سرخ رنگ اس کے اندرا چھی طرح شامل ہو۔ (جالینوس)

ند کورہ گفتگوے واضح ہو گیاہے کہ عمدہ اور قابل تعریف ''نفٹ''اس بیماری کے اندروہ نہیں ہے جس کے اندر سرخی اور کوئی تبدیلی موجو د ہو بلکہ وہ ہے جس میں تھوڑی سرخی اچھی طرح ملی جلی

ہو۔ عمدہ قشم کا اختلاط طاقت میں زیادہ ہونے کا پنۃ دیتا ہے۔ اختلاط جس قدر عمدہ ہوگا ای قدر نفث ردی ہونے سے دور ہوگا۔ برعکس صورت برعکس ہوگی۔اور جو شئے بزاق سے اچھی طرح ملی جلی نہ ہوگی وہ ردی ہوگی۔(مؤلف)

بقراط کا خیال ہے کہ تمام چیزوں کے اندراختلاط غیر مساوی اور مختلف ہی اختلاط ہوگا۔ تجربہ سے اس کی شہادت ملتی ہے کیو نکہ سرخ رنگ اگر خالص ہے تو یہ خطرے کی علامت ہوتا ہے۔

"خالص" ہے اس کی مرادیہ ہے کہ براق کے اندر طی جلی نہ ہو۔اس کے بعد اس نے بیعد خراب نفث کا تذکرہ کہ لیسدار سفید اور گول"نفث "غیر مفید ہے۔اس کے بعد آگے اس نے بیعد خراب نفث کا تذکرہ گرتے ہوئے لکھا ہے کہ نفث جب بیعد سبزیا جھاگ دار ہواور نہایت خالص ہو حتی کہ ساہ ہونے کا گمان پیدا کرنے گھا تو یہ نہ کورہ نکٹوں ہے بیعد خراب ہے۔ اس مثال پر اس نے ذات الجنب سے خصوصیت رکھنے والی چیز کا استد لال کیا ہے۔انہی کے ساتھ تیز امراض کے ساتھ اس کی عموی چیزوں پر بھی غور کریں۔عمدہ علامتیں یہ ہیں کہ مریض مرض کو برداشت کرلے، تنفس صبح ہو، دردنہ ہو، برناق بہ آسانی خارج ہو، جسم متوازن طور پر گرم ہو، نرم ہو، پیاس نہ ہو، بول و برنار، نینداور پین محمود ہو۔ آلات تنفس کی مخصوص عمدہ اور تمام تیزامراض کی مشتر کے علامات کا تذکرہ ہم کر چے ہیں۔ محمود ہو۔ آلات تنفس کی مخصوص عمدہ اور تمام تیزامراض کی مشتر کے علامات کا تذکرہ ہم کر چے ہیں۔ اس کے بعد بقراط نے ردی علامات کا تذکرہ کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ "ردی علامات سے ہیں کہ بیاری کو برداشت کرنا مریض کے لئے گرال ثابت ہو۔تنفس عظیم متواتر ہو، درد کے اندر سکون نہ ہو۔(جالینوس)

مرادوہ در دہے جو چیجن کی طرح پہلومیں محسوس ہو تاہے۔(مؤلف) بزاق کااخراج بمشقت ہو،زور دار چھینک آتی ہو چسم کے اندر بخار کی حرارت مختلف ہو، شکم اور دونووں پہلو بیحد گرم ہوں، پیشانی دونوں ہاتھ اور پیرسر دہوں، بول و بزار، نینداور پسینہ سب خراب اور نامحمود ہوں۔

سیاہ نفث نا پختہ ہونے کے علاوہ موت اور ہلاکت کی علامت بھی ہے۔ ذات الجنب کے مریض ہیں نفث تیزی ہے اور متد اول طور پر رو نما ہو تو مرض کی مدت کم ہوتی ہے لیکن یہ بیاری کے آخر ہیں رو نما ہو تو بیاری طویل ہوگی۔ ذات الجنب میں آنے والے بخار بالعموم ناغہ دیکر آتے ہیں۔ بھی کوئی بھی علامت نظر آئے جو دوسر ی باری کے آنے سے پہلے رہی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مرض کی مدت کم اور مریض محفوظ رہے گا۔ تندر ستوں کے براق سے مشابہ براق مالاست بخاط ہوگاای آلات تغض کے بیحد محفوظ ہونے کے علامت ہے۔ اس کے مخالف براق جس قدر مخالف ہوگاای

قدر آلات خض متاثر ہوں گے۔ طبعی بزاق کے بر عکس بزاق اس بات کی علامت ہے کہ مادہ نا پختہ ہے نیزید کہ آلات تنفس بیحد کمزور ہیں۔اس کے اندر کوئی ردی چیز بھی موجود ہو تو یہ موت کی علامت ہے۔(جالینوس) علامت ہے۔(جالینوس)

ورم جس مقام پر ہوتا ہے وہ مقام پسلیوں پر استر کرنے والی جملی ہوتا ہے۔ ورم کی وجہ سے
یہاں در دہوتا ہے جو چھنے والا ہوتا ہے اور اس کا حلقہ پھیلا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ورم جملی کے مقام پر
ہوتا ہے اور حساس جھلیوں میں ورم کی بہی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ علاہ ازیں جملی آلات تنفس کا چز
ہوتی ہے۔ تنفس کے اندراس پہلو ہے تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ یہ دل ہے قریب ہوتا ہے لہذاورم کی
التہائی کیفیت ہے دل کو تھوڑا نقصان پہونچتا ہے۔ قلب کو اس طرح کا التہائی اثر بہونچنے ہے بخار کا
ہوجانالازم ہوتا ہے۔ مقام تنفس پھیپر سے بھی قریب ہوتا ہے۔ پھیپر سے کے اندر چونکہ تخلیل،
نرمی، دفت اور ہر مرطوب جو ہرکی یہ آسانی اور بہ سرعت قبول کرلینے کی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے
جملی کے اندر جو رطوب موجود ہوتی ہے پھیپر الازمی طور پر اس کا پکھے حصہ قبول کرلیتا ہے ایس

صورت میں لازما کھانی پیدا ہوگ۔ عام حالات میں بہ ضروری نہیں ہے کہ پچھ اخراج بھی ہو، البتہ عضائی ورم کی وجہ سے پھیپھڑے کی جانب بہ کثرت غلظ مادہ بہہ کر آر ہا ہو تو کھانی کے ساتھ اخراج بھی ہوگا۔ مادہ تھوڑااور رقیق ہوگا تو بیجان تو پیدا کرے گا۔ کھانی بھی آئے گی گر اجتماع مادہ اور گئے ہی ہوگا۔ ذات الجنب چو نکہ ایک کے بغیر اخراج نہ ہوسکے گا۔ اس طرح اس میں اضافہ اور گاڑھا پن پیدا ہوگا۔ ذات الجنب چو نکہ ایک ایسے عضوکے ورم کانام ہے جو سخت، تنگ، اور اپنا اندر کی تمام رطوبتوں کو محبوس کر لیتا ہاس لئے شروع میں اخراج نہیں ہوتا گریہ عضوز م ہو کر ڈھیلا پڑتا ہے اور کوئی چیز پھیپھڑے کی جانب بہہ کر آنے لگتی ہوتو کھانی بڑھ جاتی ہے اور اس وقت اخراج ہونے لگتا ہے۔ نکلنے والے مادہ کے بہہ کر آنے لگتی ہوتی ہوتا ہے تو مادہ موزی ہوتا ہے تو مادہ موزی ہوتا ہے تو مادہ صفر اوی ہوتا ہے۔ اس طرح مائل بہ سخت زردی ہوتا ہے تو اس بات کی مائل بہ سخی ہوتا ہے تو مادہ مائل بہ سخت زردی ہوتا ہے تو اس بات کی زردی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالص مر ارہ کے اندر جور طوبت شامل ہوگئی ہیں۔ یہ مادہ مائل بہ باریک زردی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالص مر ارہ کے اندر جور طوبت شامل ہوگئی ہیں۔ یہ مادہ می زردی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالص مر ارہ کے اندر جور طوبت شامل ہوگئی ہیں۔ یہ مادہ موٹی ہے وہ خالص مر ارہ کے اندر جور طوبت شامل ہوگئی ہیں۔ یہ مارہ ہی اندر جور طوبت شامل ہوگئی ہے۔

مادہ سیاہ ہو تا ہے تو خلط ماکل بہ سیابی ہوتی ہے۔ شوخ سرخی کی جانب ماکل ہو تا ہے تو زیادہ تر شوخ رنگ کا میلان رکھتا ہے۔ یہ زیادہ تر خون اور کم تر صفر اء ہو تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کا مادہ کم تکلیف دہ اور ہلا کت کا زیادہ رجی ان رکھتا ہے۔ ند کورہ اعراض یعنی چیجن، بخار، ضیق تنفس کی قوت مریض کی قوت کا پتہ دیتی ہے۔ یہ اعراض کم زور ہیں تو مریض کے کمزور ہونے کا پتہ چاتا ہے۔ ذات الجنب میں نبض تناؤ کے ساتھ صلب ہوتی ہے کیونکہ کسی عصوکی بیماری مساوی ہوا کرتی ہے۔ بیماری یہاں ورم کی ہوتی ہے چونکہ اس کے ساتھ شدید بخار ہو تا ہے اس لئے نبض سر بع متواتر اور بیماری یہاں ورم کی ہوتی ہے چونکہ اس کے ساتھ شدید بخار ہو تا ہے اس لئے نبض سر بع متواتر اور بیماری یہاں ورم کی ہوتی ہے جونکہ اس کے ساتھ شدید بخار ہو تا ہے اس لئے نبض سر بع متواتر اور بیماری کے سخت ہونے کا پیتہ دیتی ہے۔ بیکس صورت سے برعکس حالت کا پتہ چاتا ہے۔ (جالینوس)

# سینہ اور پھیچرے کے ورم کو پکانے کیلئے قرص کاعمدہ نسخہ:

تخم تحظمی، خیار، خبازی، خریزہ، کدو، رب السوس، کلی ناخونہ، بنفشہ، کیترا، لعاب مخم کتال میں قرص تیار کریں اور عرق انجیر کے ساتھ استعمال کریں۔ (جالینوس)

بھے کا پتہ دینے والا براق پھر بھی براق سفید، لیسدار، مائل بہ زردی یاخون آمیز نہیں ہواکر تا۔ ان برا قول کے اندر بعض خطرہ کی علامت ہیں مثلاً مائل بہ زردی اور پان کے رنگ کا براق۔ تھوڑا سیاہ

براق بھی موت کی بڑی علامت ہوتا ہے بشرطیکہ ساہ ہونے کے ساتھ بدبودار بھی ہو۔ پچھ براق موت کی ہلکی علامت ہوتے ہیں۔ مثلاً ساہ جو بدبودار نہ ہو۔ یہ ہیں ہر خارج ہونے والے مادہ کی چار علامتیں۔خارج ہونے والی اشیاء جو منجمد ہوتی ہیں، میں مقدار، کیفیت اور اخراج مادہ کا وقت اور اخراج دیکھا جاتا ہے۔مقدار کم بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی۔ کیفیت کا جہال تک تعلق ہے اس کی چار فشمیں ہوتی ہیں۔

ا۔ قوام یہ غلیظ پانی ہو تاہے۔ ۲۔رقیق(پتلا)۔

سررنگ مفید - آتشی، سخت سرخیاسیاه ہوسکتا ہے۔

سے بو۔ بد بودار یاغیر بد بودار ہوگی۔ شکل گول یا گول نہیں ہوگ۔اخراج مادہ کاونت ابتدامیں ہو تا ہے اور انتہامیں بھی۔طریق اخراج یہ ہے کہ کھانسی کے بغیر مادہ بہ آسانی یا سخت کھانسی کے ساتھ خارج ہو تا ہے۔

### ماده کی قشمیں تین ہیں:

ا۔ پختہ بید ایک ہی قتم کا ہوتا ہے۔ ۲۔ تا پختہ اس کی بے شار مختلف تیمیں ہیں۔ قوام اور رنگ۔ قوام پتلا اور گاڑھادونوں ہوتا ہے۔ بید دونوں اس بات کی علامت ہیں کہ مادہ تھوڑا ہے۔ رنگ سرخ یا بے حد آتش ہوتا ہے۔ دونوں ہی بڑے خطرے کی علامت ہیں، کچھ رنگ ایسے ہیں جو موت کا پتہ دیتے ہیں۔

تھوکئے سے براق کا تھوڑااور پختہ خارج ہو تو ایسی صورت میں بیاری کے اعراض بھی موجود رہیں تو بیاری میں اضافہ ہوگا۔ بر عکس ازیں اعراض میں سکون ہو تو انحطاط مرض کی دلیل ہے۔ (جالینوس)

ذات الجنب میں جس چیز کا اخراج ہوتا ہے وہ ورم پیدا کرنے والی خلط کی پیپ ہوتی ہے۔ دستور کے مطابق سے پیپ جاری نہیں ہوتی تو اس کا ترشح ہونے لگتا ہے۔ نکلنے والی چیز جمعی سیاہ ہوتی ہے جو ابتدامیں نہیں ہوتی بلکہ مرض پر ایک مدت گزر جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بالعموم زر دچیز کا اخراج ہوتا ہے۔ (جالینوس)

ذات الجنب میں ورم حار ضربان (تڑپ) ہے محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ورم پسلیوں کو استر کرنے والی جعلی میں ہوتا ہے اور اس سے شریانوں کی ملاقات مدافعت کی حد تک نہیں ہوا کرتی۔ورم حاراگر

پسلیوں کے مابین عضلہ کے اندر ہو تا ہے تواس کی موجود گی میں در دناک حد تک تڑپ موجود ہوتی ہے کیونکہ شریانوں کے انبساط ہے ورم پر دباؤ پڑتا ہے۔(جالینوس)

اس مقام پر تڑپ کا ہونااس بات کی دلیل ہے کہ ورم باہر کی جانب مائل ہے۔لہذا یہ ذات الجحب نہیں ہوتا۔ ہوسکتا ہے اس کامنہ باہر کی جانب کھل جائے۔ کھانسی کے ساتھ تھوڑی چجن بھی ہو جو سخت اور در دناک حد تک نہ ہو، خیت تنفس اور بخار بھی ہو تواس کا مطلب یہ ہے کہ ورم اندر سے پسلیوں کوڈھا نکنے والی جھلی کے اندر ہے۔ یہ قیقی ذات الجنب ہو تا ہے۔باہر کی جانب پھٹ کر بہنے کی اس سے امیدر کھنا مناسب نہیں ہے۔ (مؤلف)

کیونکہ پہلیوں کو استر کرنے والی جملی پہلیوں کے سروں کے نیچے سے چل کر ہنلی تک پہو پختی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذات الجنب میں در دیمھی ہنلی کی جانب ہو تا ہے۔ایبااس وقت ہو تا ہے جب ورم ادھر کے اجزاء میں ہو تا ہے۔ در دیمھی حجاب کے نزدیک ہو تا ہے۔ یہ اس وقت ہو تا ہے۔ جب کہ ورم نجلے اجزاء کے اندر ہو تا ہے۔

ذات الجنب کے مریض سینہ کے اندر بوجھ اور ایک ایبا درد محسوس کرتے ہیں جو غیر صدری حصہ سے شروع ہو کرعظم القص کے گوشہ تک اور یہال سے پشت کی ہڈی تک جاتا ہے، ساتھ میں تیز بخار، چیجن والا درد، رنگین یا جھاگ دار مادہ خارج ہوتا ہے۔ بالعموم مادہ کے اوپر مرادیت غالب ہوتی ہے۔

فرض کرلیں کہ کوئی مختص تنفس کے وقت پیچھے کی پسلیوں میں درد محسوس کررہا ہے اس پر ذات الجعب کے ہونے کا حکم لگانا مناسب نہیں ہے۔ یہاں یہ دیکھیں کہ مریض کھانتے وقت کوئی چیز خاری کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی چیز نہ کورہ بیان کے مطابق تبدیل شدہ رنگ کے ساتھ خارج کرتا ہے تو ذات الجعب کا فیصلہ کریں گے۔ کھانتی بالکل نہ آتی ہو تو ذات الجعب کا ہونا جائز ہے۔ الا یہ کہ ورم میں نفخ نہ ہوا ہو ، مادہ بیجد کثافت کے ساتھ جملی کے اندر محسبس ہو حتی کہ کسی چیز کار شح نہ ہو تا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیچھے کی پسلیوں میں جو در داٹھ رہا ہو وہ ورم کبد کے نتیجہ میں ہو۔ ہو تا یہ ہے کہ جگر میں معلق ہونے والے اعضاء جو بعض جسمول کے اندر پسلیوں کے ساتھ مر بوط ہوتے ہیں وہ اندر کی معلق ہونے والے اعضاء جو بعض جسمول کے اندر پسلیوں کے ساتھ مر بوط ہوتے ہیں وہ اندر کی جانب کھینچے اور پھیلتے ہیں تو اس سے یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ درد پسلیوں پر استر کرنے والی جعلی عباب بھی ہونچتا ہے۔ البتہ ذات الجب رگوں کی نبض ، ورم کبد کے اندر بیدا ہونے والی نبض سے مشابہ نہیں ہوتی۔ اس طرح ہے کہ جو چیزیں ورم کبد میں براز کے اندر خارج ہوتی ہیں وہ ذات الجب میں خارج نہیں ہوتیں البتہ اس طرح کے استفر اغات اور اور ام کبدی میں ہمیشہ نہیں بلکہ ضعف کبدگی خارج نہیں ہو تیں البتہ اس طرح کے استفر اغات اور اور ام کبدی میں ہمیشہ نہیں بلکہ ضعف کبدگی

موجودگی میں پائے جاتے ہیں۔ایسی صورت میں داہنی جانب شؤل کر دیکھیں، ورم ہے تو فبہا، جگر متورم ہوگا۔ورم محسوس نہ ہو تو ممکن ہے کہ حمد میں ورم ہو مگر مقعر حصہ میں یامحد ب حصہ میں اس مقام پر ہو جے پیچھے کی پسلیاں پوشیدہ رکھتی ہیں۔ایسی صورت میں مریض کو حکم دیں جس قدر ہو سکے لمباسانس لے۔اس کے بعد پوچھیں کر تقل بالائی اعضاء میں معلق ہے یاان اعضاء کے اندر کسی مقام پر محسوس کر رہاہے جو جگر پر مشتمل ہیں۔(جالینوس)

ٹھیک ہے لیے سانس پر مریض ثقل محسوس کرے توبہ ورم بحد کی،اور در دمحسوس کرے تو ذات الجنب کی علامت ہے۔ بھی تنگی تنفس بھی ہوتی ہے کیونکہ ورم بحد سے حجاب پر دباؤ پڑتا ہے۔ حجاب اس کی مزاحمت کرتا ہے اور مریض کچھ کھانسے لگتا ہے گر نبض سے امتیاز ہو جائے گاذات الجنب میں نبض صلب مساوی اور ورم بحد میں لین ہوتی ہے۔ (مؤلف)

(جالینوس) نے وہ علامات پیش نہیں کی ہیں جن کے ذریعہ ورم تحید اور ذات الجنب میں امتیاز قائم کرنا ممکن ہو کیو نکہ ورم کی موجود گی میں کھانسی، ضیق تنفس، پیچھے کی پسلیوں میں در داور بخار بھی ہو سکتا ہے۔ میں سے کہتا ہوں کہ بید در دچھنے والا بھی نہیں ہو تا۔ (مؤلف)

مرض طویل ہو جاتا ہے تواصل بات روشنی میں آتی ہے۔ورم تحدیمیں زبان سیاہ ،اور ذات الجنب کا متیجہ یہ ہو تاہے کہ پورے جسم میں تغیر واقع ہو جاتا ہے (جالینوس)

### ذات الجنب ميں پيپ كى علامات:

تنفس سے ربو کے مریض کی طرح سینہ بری طرح پھیلٹا، تیزاور متواتر ہو تا ہے۔ بخاراوراس کی شدت ہو، پسلیول کے اندر مریض بوجھ کا اثر محسوس کرتا ہو،ایک پہلو ہو تیزی سے دوسر اپہلو بدلے تو پیپ کی آواز میں اضطراب پیدا ہوتا ہو، بھی سے آواز خود نہیں بلکہ مریض سن لیتا ہو، تو سمجھ لیس پیپ پیدا ہوگئی ہے۔اس کا یقین اس طرح ہوجاتا ہے کہ مریض کی بیاری سخت تو ہو مگروہ کوئی لا کُق اعتنا چیز نہ تھو کتا ہو۔(جالینوس)

ورم اگر پسلیوں پر چیکنے والے ظاہری عضلات ہو تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی زخم ہو جسے حس لاحق ہوتی ہو، ورم اگر پسلیوں کے مابین واقع ہونے والے عضلات کے اندر ہو تو دبانے پر مریض درد محسوس کرے گا۔ چیس ، بخار، اور تنگی تنفس کا احساس ویسانہ ہوگا جیسا پسلیوں پر استر کرنے والی جعلی کے اندر ورم ہوتا والی جعلی کے اندر ورم ہوتا ہے۔ پسلیوں پر استر کنے والی جعلی کے اندر ورم ہوتا ہے تو مریض حس کے ذریعہ درد محسوس نہیں کرتا۔ خالص ذات الجنب یہ ہے کہ یہ جملی مریض

ہوجائے (جالینوس)

بربات رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ جعلی متورم نہیں ہوتی بلکہ عضلاتی سطح متورم ہوتی ہے جو اس جعلی سے اتصال رکھتی ہے۔ (مؤلف)

بیاری اس جھلی کے اندر دوسر ہے بالائی حصہ میں ہوتی ہے تو دردسینہ کی ہڈیوں تک ہو پختا ہے۔ نیلے حصوں میں ہوتا ہے تو درد پسلیوں کے سروں تک ہمو پختا ہے۔ ان تمام ور موں میں لازی طور پر تیز بخار ہوتا ہے کیونکہ بید دل ہے قریب ہوتے ہیں۔ وجہ بیہ کہ پسلیوں پر استر کرنے والی جھلی غلاف قلب ہے متصل ہوتی ہے نبض ہے پہ چلے گاکہ ورم پسلیوں کوڈھا نکنے والی جھلی میں ہے۔ یاس جھلی غلاف قلب متصل ہوتی ہے نبض ہے بہتی ہے لئدر صلابت اور پھیلاؤ جھلی کے اندر ورم ہونے کی علامت ہے۔ ورم غضاء اور ورم رئے کے درمیان فرق بیہ ہے کہ ورم رئے کے اندر نبض کے اندر صلابت نہ ہوگی۔ اس ورم ہے جو پیپ بہتی ہے وہ پھیپھرٹ کے اندر داخل ہوتی ہے اور کھائی اندر صلابت نہ ہوگی۔ اس ورم ہے جو پیپ بہتی ہے وہ پھیپھرٹ کے اندر داخل ہوتی ہے اور کھائی کے ذریعہ رفع ہوجاتی ہے۔ اس ہے یہ چانا ہے کہ بیاری کے باعث خلط کارنگ کیا ہے۔ طاقتور اور سخت بیپ تھو کئے والے کی پیپ کو جمع کیا جائے تو آٹھ قوطولی وزن ہوگا۔ ایک شخت بیاری کے اندر سخت بیپ تھو کئے والے کی پیپ کو جمع کیا جائے تو آٹھ قوطولی وزن ہوگا۔ ایک شخت بیاری کے اندر سخت بیپ تھو کئے والے کی پیپ کو جمع کیا جائے تو آٹھ قوطولی وزن ہوگا۔ ایک تو طولی ہوتی ہے۔

which a decimal the scale of the state of the state of

الماله بالمحالية بالمالية بالمالية

# جهاباب

## سینے کی فضاہے پھیپھراے کے اندر پیپ داخل ہونے کا سبب

اعضاء آلمہ کے پانچویں مقالہ کے اندرا تھی طرح اور مکمل طور پربیان کیا جاچکا ہے۔
پہلیوں پر استر کرنے والی جعلی اور اس سے چپنے والے عضلات کے اندر ورم ذات الجنب کی
بیاری میں لاحق ہوتے ہیں۔ اس بیاری کے کچھ لازی عوارض ہوتے ہیں۔ مثلاً تیز بخار، چیخے والا
درد، تناؤ تنفس صغیر اور متواتر، نبض صلب اور متمدد، کھانسی جو بالعموم رکلین تھوک کے ساتھ ہوتی
ہے کبھی تھوک کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ یہ کیفیت فوری موت کا باعث ہوتی ہے یادوسری بیاری کے
مقابلہ میں زیادہ طویل ہوتی ہے۔، تھوک کی عدم موجودگی کبھی فقط قلت مادہ کی وجہ سے ہوتی ہے،
بیاری کی خبات وجہ خبیں ہوتی ہے۔، تھوک کی علامت یہ ہے کہ در داور بخار میں شدت ہوتی ہے۔
اس بیاری کی خبات وجہ خبیں ہوتی۔ خبین ہوتی۔ خبین ہوتا۔ در داو پر اٹھ کر ہنسلی کی ہڈیوں تک
بہو پختا ہے یا نیور درد ہوتا ہے گر کسی مادہ کا اخراج خبیں ہوتا۔ در داو پر اٹھ کر ہنسلی کی ہڈیوں تک

پہلیوں کے اندر دیگر اورام بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ بخار ہوتا ہے،ان میں تنف بھی متوار اور صغیر ہوتا ہے۔البتہ مریض کو چیز تھو کتا نہیں ہے۔ یہ کیفیت خالص ذات الجنب جس کے ہمراہ اخراج ہادہ نہیں ہوتا کے لئے انتہا ہوتی ہے۔ دونوں کیفیتوں میں فرق یہ ہے کہ خالص ذات الجنب میں گومریض کچھ تھو کتا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ خٹک کھانسی لازما ہوتی ہے ند کورہ کیفیت الجنب میں گومریض کچھ تھو کتا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ خٹک کھانسی لازما ہوتی ہے ند کورہ کیفیت میں کھانسی شروع میں ہوتی ہے، نبض کے اندر صلابت ہوتی ہے نہ تدد، بخار تیز ہوتا ہے، تنگی تنفس کم ہوتی ہے، پسلیوں پر دبانے سے در دپیدا ہوتا ہے بچوڑ اپیر ونی کی جانب ماکل ہوتا ہے۔ بختہ ہوجائے اور پیپ نہ پڑے تو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے (جالینوس)

یہ ہے خالص ذات الجنب جس میں ورم پسلیوں پر چیکنے والے عضلات کے اندر ہو تاہے۔ (مؤلف)

ذات الجنب میں تڑپ (ضربان) پیدا نہیں ہوتی، گوورم حاربی کیوں نہ ہو کیو نکہ پسلیوں پر استر کرنے والی جھلی کے اندر تڑینے والی کوئی رگ نہیں ہوتی۔ (جالینوس)

اس میں چھن ہوتی ہے۔ چھن بھلیوں کے در دول میں خصوصیت ہوتی ہے۔ ذات الجنب کے اندر ورم پسلیوں پر استر کرنے والی جھل کے بالکل بالائی جزء میں ہو تو یہاں ہنلی کی ہڈی اپنی صلابت کے باعث درد کا سب بنتی ہے۔ درد نجلے جزء کے اندر ہو تواس کا سب اپنی حرکت کی وجہ حجاب بنتا ہے۔ ذات الجنب میں نبض منشاری ہوتی ہے کیونکہ ورم سخت جھلی کے اندر ہو تا ہے۔ ذات الجنب اور ورم جگر میں ہنلی کی ہڈی نیچ کی جانب تھینج کھتی ہے۔ ذات الجنب میں اے پسلیوں پر استر کرنے ولی جھلی تھینچتی ہے اور ورم جگر میں ورید اجو ف کیونکہ یہ جب سخت ہوتی ہے تو ہنلی کی ہڈی پر اپنے اٹھتی ہے۔ پھیپھڑے کے اندر پیپ تب ہی داخل ہوتی ہے جب اپر سینہ کا دباؤ نہایت سخت اور کیٹ ایک اندر پیپ تب ہی داخل ہوتی ہے جب اپر سینہ کا دباؤ نہایت سخت اور تیز ہو جاتا ہے۔ طبیعت طاقتور ہوتی ہے توا نے دفاع کے لئے الیا کرتی ہے جب کہ موذی اشیاء کو دفع کرتے وقت طبی تو تیس ماشر اپیدا کر دیتی ہیں۔ بھی اور چھنک کی اور چھنک کی اور جیس کے اندر سخت طاقت موجود ہو۔ بہی وجہ ہی کہ بی دفع ہو سکتی ہے ، ایبا اسی وقت ممکن ہے جب جسم کے اندر سخت طاقت موجود ہو۔ بہی وجہ ہی طاقت کر ور ہوتی ہوتی ہوتی ہونی مر جاتے ہیں کیونکہ شدید دباؤ سخت طاقت کے بغیر ممکن طاقت کر ور ہوتی ہو تبی ہوتا دواکٹر مریض مر جاتے ہیں کیونکہ شدید دباؤ سخت طاقت کے بغیر ممکن میں میں وتا۔ (مؤلف)

ورم داخلی عضلات میں ہوتا ہے تواس کے ساتھ مریض تھوکتا ہے کیونکہ اس میں بھی مادہ بہہ کر جعلی اور معدہ تک آتا ہے۔ دبانے پر در دبہت کم گرسانس لیتے وقت تیز ہوتا ہے۔ نبض میں زیادہ صلابت ذات الجنب خالص میں ہوتی ہے۔ پھر ان ور مول میں ہوتی ہے جو جملی ہے متصل عضلات کے اندر ہوتے ہیں۔ تنگی تنفس، کھانسی اور صلابت نبض بہت کم ہوتی ہے جی کہ صلابت بالکل ہی نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ در دان ور مول میں ہوتا ہے جو ہیر ونی عضلات میں ہوتے ہیں۔ جملی ہی نہیں ہوتی ہے متصل عضلہ کے اشتر اک اور جملی میں در دمتھلہ عضلہ کے اشتر اک ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ متصل عضلہ کے اشتر اک ہوتا ہے۔

### ذات الجنب اور ذات الرئه ميس فرق:

عشر من کھانی، تھو کی جانے والی شہ کے رنگ میں تغیر اور بخار میں دونوں مشتر ک ہیں گر ذات الجنب میں در دیجنے ذات الجنب میں در دیجنے والا اور ذات الرئے میں ور دسینہ کے اندر ہو تا ہے۔ ذات الجنب میں در دیجنے والا اور ذات الرئے میں فقط بیاری کی حد تک ہو تا ہے۔ ذات الجنب میں بنض صلب اور منشاری مگر ذات الرئے میں موجی اور لین ہوتی ہے۔ ذات الجنب میں ورم بالعموم مر اری ہو تا ہے کیونکہ ماؤف جملی صرف الربے میں موجی اور لین ہوتی ہے۔ ذات الجنب میں ورم بالعموم مر اری ہو تا ہے کیونکہ ماؤف جملی صرف

لطیف خلط کو قبول کرتی ہے۔ورم اگر جھلی ہے خالی مقام پر ہو تو فصد کھولیں۔علامت بیہ ہے کہ در د پیچیے کی پسلیوں میں ہو تا ہے۔ورم پسلیوں کو ڈھانکنے والی جملی میں نہ ہو بلکہ پسلیوں سے جیکنے والے گوشت کے اند رہو تو نبض صلب اور منشاری نہ ہو گی۔ نہ ہی بخار زیادہ ہو گا، نہ ہی تنگی تنفس سخت ہوگی، مُوْلِنے پرورم کانکلا ہواسر امحسوس ہوگا۔ (جالینوس)

بقراط کہتاہے کہ ذات البحب کے اندر در دپسلیوں کے سروں کے پنچے ہو، مریض ہنسلی کی ہڈی میں کوئی تکلیف محسوس نہ کرے تو خربق سیاہ یا بلیون دے کر شکم کوزم کریں۔ (جالینوس)

بليون حب النسيل كوكهتي بين اس مين شكب (مؤلف)

خارج ہونے والی بزاق تندرست انسانوں کے بزاق سے غایت درجہ مشابہت رکھتا ہو تو بیہ آلات تنفس کی حد درجہ صحت کی علامت ہو تا ہے۔ تندرستوں کے بزاق سے مشابہت جس قدر کم ہو گی اسی قدر آلات تنفس طبعی حالت ہے دور ہول گے ۔ ناپختہ تھوک، پیشتر اعضاء تنفس کے ضعف کی علامت ہوتے ہیں۔اس کے ساتھ "نفث سیاہ" جیسی ردی علامت بھی ہو تو ہلاکت کی پیہ نهایت زور دارعلامت ہو گی۔ (جالینوس)

ذات الجنب کے بارے میں ایک مثال پیش کرنا جا ہتا ہوں، اس پر دیگر امر اض کی پیشکی دریافت پر قیاس کیاجاسکتا ہے۔اس جھلی کے اندر پیدا ہونے والاور م خالص د موی ہواکر تاہے البتہ یہ ورم حار ہو تا ہے۔ دم صفراوی اور دم بلغمی ہے بھی ہیہ ورم ہو تا ہے۔ دم بلغمی سے پیداشدہ، جھاگ دار ہو گا۔ دم سوداوی ہے بھی ہوتا ہے۔الیی صورت میں وہ"ائبر وس(۱)" ہوتا ہے۔

دم سوداوی ہے ہونے والا ورم میلنے میں د شوار اور طویل المدت ہو تا ہے۔ تحلیل بھی دیر میں ہوتا ہے۔ حتی کہ بیاری کے شروع میں کھانسی کے ذریعہ جو تھوک خارج ہوتا ہے اس کارنگ بھی تبدیل نہیں ہو تا۔ تبدیل ہو تا بھی ہے تو بہت تھوڑا۔ کیونکہ تا پختہ ورم ہے کسی چیز کار شح بالکل نہیں ہوا کر تا۔ زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد مریض" نفٹ سیاہ" خارج کر تا ہے۔ سیاہی ، خون کے اندر سوداء کاجس قدر غلبہ ہو گاای قدر ہو گی۔ بھی نفث مقدرامیں کم اور بھی زیادہ ہو تا ہے۔خون پر جب بھی مرہ صفراء کا غلبہ ہو گا نفث کارنگ زردیا زردی ہے مشابہہ یا پیپ کے رنگ کی حد تک شوخ زردی سے ملا جلا ہو گا۔ شوخ رنگ لاز ماتمام قسموں میں زیادہ سخت ہو تا ہے اس لئے زیادہ ردی ہو تا ہے۔خون پر بلغم کاغلبہ ہو گاتو نفث جھاگ کے مشابہ ہوگا۔ نفث سرخ اس وقت ہوتا ہے جب ورم فلغمونی ہو تا ہے۔، نفث، بیاری کے شروع میں یا آخر میں ، آسان یاد شوار ، کم یا بیش ہو تا ہے۔ ذات

الجنب کی اس بیماری میں بھی تناؤ چھن سے زیادہ اور بھی چھن زیادہ ہوتی ہے۔ چھن میں سوزش اور بخار بھی ہوتو یہ بیماری کے حسب حال ہوگا۔ یعنی بیماری جس قدر زیادہ ہوگی ای قدر سوزش اور بخار بھی ہوگا۔ ای طرح جس قدر بیماری زیادہ ہوگی پیاس میں شدت بھی ای قدر ہوگی۔ بے خوابی، فساد عقل، ضعف قوت اور استر خائی کیفیت سب بیماری کے حسب حال ہوں گے۔لہذا اان تمام باتوں کو نظر میں رکھیں۔ نجات کی علامتیں غالب ہوں گی تو مریض نیج جائے گا۔ برعکس صورت برعکس انجام کی ذمہ دار ہوگی۔ بخار، بے خوابی، پیاس، فساد عقل، ضعف قوت، بھوک کے اندر گراوٹ، دشواری تنفس، اور نفث کے اندر بیحد مذموم علامتیں ہوتی ہیں۔ برعکس علامات محود ہوتی ہیں۔

موجبورم خلط کی خرابی اور کشرت ردی علامات ہیں، برعکس کیفیت، عمدہ علامت ہے۔خرابی کی پہچان نفث کے رنگ ہے گر مقدار کی پہچان نفث کی مقدار ہے نہ ہوگی، ہوتا ہے کہ ابتداء میں مریض زیادہ چیز خارج نہیں کرتا کیونکہ یہ چیز پختہ ہورہی ہوتی ہے۔خلط بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر مریض آخر میں زیادہ چیز خارج کرنے لگتا ہے۔خلط بھی کم ہوتی ہے۔گرنفث شروع میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ شروع ہی میں مریض کل کاکل خارج کر دیتا ہے یہ صورت عمدہ ہوتی ہے۔ پہلی صورت سے کیونکہ شروع ہی میں مریض کل کاکل خارج کر دیتا ہے یہ صورت عمدہ ہوتی ہے۔ پہلی صورت

خلط کی مقدار کتنی ہے؟ اے یہ دیکھ کر معلوم کریں کہ "نفٹ" کے ساتھ فیج (پختگی) ہو چکا ہے۔ حتی کہ نفث گوسیاہ ہو مگر پختہ براق کے ساتھ ملا جلا ہو اور کھانسی ہے بہ آسانی اوپر آجا تا ہو۔ تنفس آسان ہو، در د تھوڑ ااور بے خوابی کم ہو۔ نفٹ شر وع ہونے سے پہلے براق میں ملی جلی کیفیت ہو تو یہ کیفیت کم اور پھر بالکل ختم ہو جائے گی۔ سب سے بردی علامت یہ ہے کہ نفث کے لئے مریض بلکا ہوگا، اسے برادشت کرے گا، جسم اور حرکتیں ہلکی ہوں گی۔

خلط زیادہ ہو جائے گی تو یہ نا پختہ تھوک کے ہمراہ ملے گی، بزاق میں ملی جلی نہ ہوگی، عشض ہوگا، بخار آئے گا، سھر اور فساد عقل لاحق ہوگا۔ یا پھر مریض بحالہ باقی رہے گااور آخر میں مریض کی قوت برادشت اور طافت گھٹ جائے گی۔ایس کیفیت کو نبض سے پہچانا جاسکتا ہے۔

لبذا علامتوں کی طاقت پر نظر کریں۔ ذات الجنب کے مریض میں درد سینہ کے سب سے شریف حصہ اور دل سے قریب ہو،اس کے ساتھ عسر تنفس شدید، بخار تیز، بے خوابی، درد، زوال اشتقااور فساد عقل بھی موجود ہو، ساتھ میں نفث سیاہ ہو،نہ مراری شوخ، بلکہ شروع میں سرخ، زردیا جھاگ در د ہو تو تھوڑی ہی مدت کے بعد تبدیلی ہو کر نج کی جانب مائل ہوگا۔ایس حالت کے اندر یہ مناسب نہیں ہے کہ ان بیاریوں کی شدت سے بھراا نھیں۔یہ یادر کھیں کہ یہ سب بھے اس لئے ہے مناسب نہیں ہے کہ ان بیاریوں کی شدت سے بھراا نھیں۔یہ یادر کھیں کہ یہ سب بھے اس لئے ہے

کہ ورم نے پیپ جمع کر لی ہے۔ بقر اطاکا قول ہے کہ پیپ کی پیدائش کے وقت در داور بخار بہت زیادہ اور خراب علامتیں ملنے لگئی ہیں۔ قوت معاونت کرتی ہے تو صحیح نفث ہو تا ہے، مریض صحتیاب ہونے لگتا ہے، چنانچہ نہایت پختہ مادہ خارج کرتا ہے۔ اور پھر نہ کورہ اعراض سب کے سب ساکن ہونے لگتے ہیں۔ ہو تا ہہے کہ نضح سرعت بخران کا پنہ دیتی ہاری کے اور صحت کی حقیقت کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ لہذا نفث کے اندر ضح کی طاقت کو دیکھیں کہ اس بیاری کے اندر کس طرح وہ نہ کورہ علامات پر غالب ہے۔ یہی بات ہر اس بیاری کے اندر دیکھیں جہال نضج مطلوب ہو تا ہے کیو نکہ سینہ کے جوامر اض بھی ہیں ان میں یہی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ یعنی نفث کا نضج طاقت میں تمام ردی علامتوں ہے مقدم ہوتی ہے۔ قوت ادادی معاونت کرتی ہے تو مریض پختہ مادہ سب کا سب خارج کرنے لگتا ہے۔ اس طرح نفح تمام کو پہنچتا ہے۔ قوت مساعدت میں کرتی تو قوت طبیعیہ کا کیا فرض ہے وہ معلوم ہے۔ یہ بات ان مراض کے اندر ہوتی ہے جن کا شخ ہو تا ہے۔ بات ان امراض کی اندر ہوتی ہے جن کا شخ ہو تا ہے۔ باتی وہ امراض جن میں فتح کے بعد فضلات کا اخراج طبیعی قوت کے ذریعہ ہو تا ہے تو ان میں ایسا نہیں ہے۔ نفخ انچی طرح ممل ہو جاتا ہیں گرسید اور پھیچوں کے اندر جو چیز نفخ فضلات کا اخراج طبیعی قوت کے ذریعہ ہو تا ہے تو ان میں ایسا نہیں ہے۔ نفخ انچی طرح ممل ہو جاتا ہیں گرسید اور پھیچوں کے اندر جو چیز نفخ فضلات ایک طاقتور قوت کے ذریعہ ہو تا ہے تو ان میں ایسا نہیں ہے۔ نفخ انجی طرح ممل ہو جاتا ہی گرسید اور پھیچوں کے اندر جو چیز نفخ بیاتی ہو ان کی صوت کی محتاج ہوا گرتی ہواتی ہوائی ہورہ کی محت کی محتاج ہوائی ہوائی ہو

'' ذات الجنب میں موجب مرض، مراری خلط ہوتی ہے تو فصد کھولناممنوع ہے۔ مراری خلط کا علم ''نفٹ''(تھو کی جانے والی شئے) ہے ہو گا۔ (جالینوس)

بربات محل نظرب (مؤلف)

بعض حضرات ہیہ کہتے ہیں کہ نفث د موی ہو تا ہے پھر مر اری ہو جاتا ہے تو بیاری بحر ان کی جانب روال دوال ہو تی ہے۔(جالینوس) میہ بھی محل نظر ہے۔(مؤلف)

سینہ، پھپیرا،اور پسلیوں پر ہونے والی تمام بیار یوں میں مناسب ہے کہ "براق" نفث، سہل اور تیزی سے خارج ہو۔ تیزی سے خارج ہونے کا مطلب ہے کہ ابتداء مرض میں ایسا ہو، نفث جب اس کیفیت کا حامل ہوگا تو بالعموم سہل اور آسان ہوگا۔ براق کا خارج کرنا مشکل اس لئے ہوتا ہے کہ سینہ میں دردکی تکلیف ہوتی ہے۔ لہذار قبق ہونے کی وجہ سے اور ضعف قوت کے باعث براق منجمد نبیس ہویا تا، یا پھر یہ کیفیت غلیظ مادہ کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ غلیظ مادہ چیکتا ہے اور توڑنے کے لئے شدید طاقت درکار ہوتی ہے۔ یااس کی وجہ رقیق مادہ ہوتا ہے کیونکہ رقیق مادہ محرک ہوا کے ذریعہ

نہیں ہو تا۔ یہ ہوا کے اثرے آزاد رہتا ہے اور ہوا کے اردگرد آسانی سے بہتار ہتا ہے۔ پس آسانی کے ساتھ نفث کا ہونا ند کورہ بالا آفات سے محفوظ ہونے کی علامت ہے اور اس کا تیزی سے خارج ہونا بیاری کی مدت کے کم ہونے کی بثارت دیتا ہے۔

نفٹ کے اندرایک سرخی نظر آئے گی جو تھوک ہے بری طرح ملی جلی ہوگی۔ مرارہ جو خارج ہوتا ہے وہ بزاق کے اندر بری طرح ملاجلا ہوتا ہے، یہ خالص نہیں ہوتا کیونکہ خالص ہوتا باری کی خرابی اور کثرت کی علامت ہے۔ ابتدائے مرض میں بیحد تاخیر سے ہونے والانفث سرخ اور خالص زر دہو تا ہے۔ یہ سخت کھالسی کے ذریعہ خارج ہو تا ہے اور ردی ہو تا ہے۔ سرخ جب خالص ہو تا ہے تور دی ہواکر تا ہے۔ سفید ،لیسد ار ،اور گول عمدہ نہیں ہو تا کیونکہ بیہ سوختہ بلغم سے بنتا ہے۔مادہ جسقد ر خبیث ہو گاای قدر خبیث اس سے پیدا ہونے والاور م ہو گا۔ بلغم طبعی سے جسلار ہٹا ہوایہ بلغم ہو گاای قدر اس سے بننے والا ورم خراب ہو گا۔ الغرض دموی اور بلغمی مادہ نسبتہ کم خراب ہوتے ہیں۔ صفر اوی اور سوداوی دونول خراب ہوتے ہیں کیونکہ اعضاء کو فاسد کردیتے ہیں۔ صفر اوی سخت بخارول کے ہمراہ اور سوداوی د شوار اور طویل المدت ہوتا ہے۔ سبز جھاگ دار بھی خراب ہوتا ہے کیونکہ سبز زنجاری پیپ کا بتیجہ ہو تا ہے۔ جھاگ دار کثرت رطوبت کی آئینہ وار ہو تا ہے۔اس کے ساتھ شدید اضطراب اور اضطرابی حرارت بھی ہوتی ہے۔ان سب سے زیادہ خراب، سیاہ ہوتا ہے۔ پھیپر سے خلط خارج نہ ہوتی ہو بلکہ پھیپر سے اندر بھری ہوتی ہے اور حلق کے اندر جوش کی کیفیت پیدا کرتی ہو تو یہ بھی خراب ہوتی ہے۔ کوئی بھی نفث ہواس کے ذریعہ در دمیں سکون نہ ہو تا ہو تو خراب ہوتا ہے بالخصوص نفث سیاہ۔اور ہر وہ نفث جس کے ذریعہ درد کے اندر سکون ہو جاتا ہو وہ محمود ہو تاہے کیونکہ در د کے اندر سکون ہو جانا ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز جسم سے خارج ہو کر صاف ہور ہی ہے۔ مذکورہ بالا تمام کیفیتوں کے اندر سکون نفث ہے ہو تا ہونہ اسہال شکم ہے نہ فصدے، نبه علاج بالادویہ ہے، توانجام یہ ہے کہ ورم کے اندر پیپ پڑ کررہے گی۔ (جالینوس) واصحرب کہ بیہ حالت اس ورم حار کی طرح ہے جس کی تڑپ بالکل خاموش نہیں ہوتی۔جس طرح یہ حالت موت وہلاکت کی بچی علامت ہے۔ای طرح ند کورہ کیفیت بھی موت کی علامت ہے۔ یہ صورت حال ذات الجنب میں ویکھیں تو یقین کرلیں کہ یا تو پیپ پڑے گی یا مریض ہلاک ہوجائے گا۔ (مؤلف)

یہ بیاری خراب اور خبیث الخلط نہ ہو تو انجام یہ ہے کہ پیپ پڑے گی اور ردی ہونے کی صورت میں مہلک ہوتی ہے۔

پیپ پڑجائے اور براق اس پر مرارہ کے بعد غالب ہوجائے اور مراری نفث اور پیپ دونوں
کے اخراج ایک ساتھ ہونے لگیں تو یہ حالت بیحد خراب ہے۔ لیکن نفث مراری اور پیپ کے بعد
دیگرے خارج ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خلط ردی ہے کچھ تو بھی پا پھی ہے اور بقیہ کے لئے
موافق حالات نہیں پار بی ہے۔ طبیعت بھی پیدا کرنا چاہتی ہے گراس کے لئے موقع میس نہیں ہوتا۔
بالحضوص اس وقت جب کہ ساتویں دن پیپ ظاہر ہواور ساتھ میں مراری تفث بھی موجود
ہو۔ ایسے مریضوں کی موت چود ہویں دن متوقع ہے۔ الایہ کہ اس کے بعد کوئی بہتر حالت رونما
ہوجائے۔ (جالینوس)

بہتر حالت ہے کہ بیاری میں ہکا پن آ جائے، در دکے اندر سکون بید اہو جائے، اعراض کم اور
کمزور ہوجا میں، نفث عمدہ ہو جائے۔ برعس ازیں حالات کے اندر موت بردی تیزی ہے آئے گی کیو نکہ
ساتویں دن ردی تغیر ات رو نما ہوں گے۔ عمدہ اور فد موم علامات کے ظاہر ہونے کے مطابق موت
مقدم اور مؤخر ہو سکتی ہے۔ فرض کرلیں کہ ساتویں دن مریض نے پیپ اور مر ارہ دونوں یکجا خارج
کیا، حالات سب کے سب در میانی ہیں نہ خراب ہیں نہ اچھے ہیں۔ اس وقت موت کے وقت در میانی
ہوگا یعنی چود ہویں دن۔ ساتویں دن کے بعد آٹھویں یا نویں دن ساہ نفث ظاہر ہوگیا تو مریض
گیار ہویں دن مرجائے گا اگر کوئی انچھی علامت رو نما ہوگی تو اس علامت کے اندر جتنی قوت ہوگ
موت میں اتن ہی تاخیر ہوگ۔ واضح رہے کہ نجات کے لئے قوت سب سے بردی علامت ہے۔ اس ک

پیپ کا خالص نفث (تھوک) ذات الجنب کے اندر غیر خالص نفث سے زیادہ عمدہ ہو تا ہے۔ (مؤلف)

اطباء كا آخرى اتفاقى فيصله:

ایک دوسرے مقام پراس نے یہ کہا ہے کہ اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ پیپ جب بن چکتی ہے تو بخار اور در دہیں سکون ہو جاتا ہے۔ در داور بخار اس وقت سب نیادہ ہوتا ہے جب پیپ بن رہی ہوتی ہے لیکن بن کھلنے کے بعد بخار اور در دہیں سکون ہو جاتا ہے۔ اس کی جگہ ثقل پیدا ہو جاتا ہے ۔ بیپ جب بچھٹتی ہے تو کیکی اور سخت بخار ہوتا ہے کیونکہ پیپ سے ان اعضاء کے اندر سوزش پیدا ہوتی ہے جن پروہ گرتی ہے۔ فلط فہمی نام میں اشتر اک ہوجانے سے بیدا ہوئی ہے۔ اس نے تھے کالفظ استعال کیا ہے اور کہتا ہے کہ '' تھے کے وقت '' تھے اس طرح کا ہوتا ہے۔ اس نے واضح نہیں کیا کہ تھے سے مراد پیپ کا جمع ہونایا پھٹنا ہے(۱) (مؤلف)

یہ ظاہر ہے کہ لیے ہے ہیپ کا پھٹناہی مراد ہے کیونکہ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ مریض اگر کسی پہلو ہو جھ محسوس کرتا ہے تو تقیمو ہیں ہوگا۔ پھراس کے پچھ دیر بعد لکھتا ہے کہ تقیم کے بعد شفس تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ جس فضاء کے اندر پھیپھرا اہو تا ہے وہ پیپ کے انصباب سے تنگ ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر لکھتا ہے کہ تقیم پیدا ہو جانے کے بعد وہی مریض محفوظ رہتے ہیں جن کا بخار جاتا رہتا ہے اور بھوک لگناشر وع ہوتی ہے۔ اس کے چند فصلوں کے بعد جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل واضح ہے جو کوئی پڑھنا چاھتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھ کر دیکھ لے۔ معلوم ہو جائے گا کہ جالینوس بلاکل واضح ہے جو کوئی پڑھنا چاھتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھ کر دیکھ لے۔ معلوم ہو جائے گا کہ جالینوس بلاکل واضح ہے جمع ہونے کے لئے نہیں پھٹنے کے لئے استعال کرتا ہے۔ (مؤلف)

تقی (پیپ کا ٹھینا) کس جانب ہے اے اس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ پہلوزیادہ گرم ہوگا،
مریض تندرست پہلوپر سوئے گا تو ایبا معلوم ہوگا کہ ماؤف پہلوے کوئی چیز معلق ہے۔ (جالینوس)
پیپ کا انصباب سینہ کی کسی ایک تجویف میں ہوتا ہے۔ پھیپھرمے کی بیاریوں میں دونوں
طرف ہوتا ہے۔ پیپ کیس پہلوہ اس کا ندازہ گرمی اور ثقل ہے ہوگا۔ (جالینوس)
اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ درد کا ہونا شروع ہی میں امتیاز پیدا کر دیتا ہے کہ پھوڑا

ہ من من سرورت میں ہے میں ہوت روز ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہور ہوتا ہے۔ پھیپر سے کے اندر ہے یا سینہ کی جھلی میں۔ در داور دیگر علامات سے اس کا انداز ہ بخو بی ہو جائے گا۔ (مؤلف)

سل كاعلامت:

بقراط کا قول ہے کہ پیپ کے مریضوں کو حسب ذیل علامات سے پیچانیں۔ ہلکا بخار برابررہ،

<sup>(</sup>۱) عبارت سے بیر بیان مؤلف کا معلوم ہو تا ہے۔ اس لئے ہم نے اس مؤلف کی جانب منسوب کر دیا ہے۔ جالینوس نے اصل میں اطباء کا اخری اتفاق چیش کیا ہے۔ اس لئے آگر اس نے کسی اور جگد اطباء کا اتفاق چیش کیا ہے تو فد کوروبیان سے اس اتفاق سے ان کار جوع ثابت ہو تا ہے۔ (مترجم)

شب میں تیز ہوگا۔ کثرت سے پسینہ آئے گا، کھانی سے سکون ملے گا گر کوئی قابل ذکر مواد خارج نہ ہوگا۔ آئکھیں دھنسی ہول گی۔ رخسار سرخ ہول گے، ناخون بڑے ہوجائیں گے، انگلیال بالحضوص ان کے کنارے گرم ہول گے، جسم میں پہلے ورم پیدا ہول گے پھریہ چپ کراندرونی طور پر پیدا ہول گے، بھوک غائب ہوگی، جسم کے اند چھالے پڑجائیں گے۔ (جالینوس)

پیپ بھٹ کر سینہ کی فضامیں جنب بھی پہونچ گیاور آسانی سے اور بہ سرعت خارج نہ ہوگی تو انجام سل ہو گااور مریض ہلاک ہو جائے گا۔ سل کے شروع ہی سے مسلسل ہلکار بخار رھتا ہے جو رات میں خاصح تیز ہو جاتا ہے۔ یہ خصوصیت ان تمام مریضوں کی ہوتی ہے جو دق کے بخار میں مبتلا ہوتے ہیں۔ (جالینوس)

کیونکہ رات میں جم مرطوب ہوجاتا ہے، ایسے ہی جیسے غذا لینے کے بعد جسم مرطوب ہوتا ہے۔ مریف کو مختلف او قات میں معمول کے مطابق جب بھی غذادیں گے بخار تیز ہوجائے گا۔ پینہ ضعف کی وجہ ہے ہوتا ہے کیونکہ ایسے مریفوں کی غذا تیزی ہے تحلیل ہوجاتی ہے۔ کھانی کی خواہش اس لئے ہوتی ہے کہ پیپ سے چیمن پیدا ہوتی ہے۔ کوئی مادہ خارج اس لئے نہیں ہوتا کہ کوئی قائل قدر چیز خارج ہوجائے تو پیپ کا صفایا ہوجائے گا گر ایسااس لئے نہیں ہوتا کہ پیپ لیسدار ہوتی ہے، غلیظ اور کثیف ہوتی ہے اور مریف کمزور بھی ہوتا ہے۔ آئسیں اس لئے دھنس جاتی ہیں کہ مز من بخاروں کے تمام مریفوں کا یہ ایک لازی عرض ہوتا ہوتا ہے۔ آئسیں اس لئے دھنس جاتی ہیں کہ مز من بخاروں کے تمام مریفوں کا یہ ایک لازی عرض ہوتا ہوتا ہے۔ چہرہ ہوتا ہے خاصر جن بخاروں کی خطکی بالکل ظاہر ہوتی ہے ان میں یہ کیفیت اور زیادہ ملتی ہے۔ چہرہ سرخ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چیپھراگر م ہوتا ہے۔ کھانی اس لئے آتی ہے کہ جم کی جانب چیپھرا ہوتی ہے بخارات اٹھ کر آنے لگتے ہیں۔

علاوہ ازیں کھانسی چہرے کے اندر خون کی کثرت کو دہا بھی دیت ہے۔ ناخون ٹیڑھے اس لئے ہو جاتے ہیں کہ جو گوشت اے دونوں جانب ہے مضبوطی کے ساتھ گرفت میں رکھتا ہے وہ پکھل جاتا ہے انگلیال گوبالعموم مزمن امراض کے اندر سر دہوتی ہیں مگر دتی بخاروں میں گرم رہ جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بخار اصلی اعضاء کے اندر ہواکر تاہے۔ بہاری پر عرصہ گذر جاتا ہے تو پیر متورم ہوجاتے ہیں کیونکہ یہ عضوچو نکہ دل ہے دور ہو تا ہے اس لئے اس کی موت جلد شروع ہوجاتی ہے۔ اس وقت ہوک جاتی رہتی ہے کیونکہ قوت غاذیہ میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر چھالے اس لئے پڑتے ہیں کہ اکال قسم کی خلطیں مجتمع ہوجاتی ہیں۔ (مؤلف)

سینہ کی فضامیں پیپ کا انصباب جب عرصہ سے ہو تار ہتا ہے تو ند کورہ علامات نمو دار ہوتی

ہیں گر ابتدامیں کپکی اور شدید بخار ہو تا ہے۔ ثقل اور سانس میں تنگی ہوتی ہے کیونکہ سینہ کی فضامیں جب پیپ کا انصباب ہو تا ہے تو پھیپھڑے کی نالیوں کے تنگ ہوجانے سے سانس کے اندر تنگی پیدا ہوجاتی ہے۔ اس کی وجہ سے نیز پیپ کی سوزش سے مریض کھانسی کا مشاق ہوجا تا ہے۔ کپکی کیوں پیدا ہوتی ہے اس کا سبب بیان کیاجا چکا ہے۔ (مؤلف)

ورم پیدا ہو جاتا ہے تو ذات الجنب کے او قات اور حدود ہواکرتے ہیں۔اس وقت مناسب سے

ہے کہ ورم کوروکا جائے اور مادہ کا امالہ کیا جائے۔ورم ہو جانے کی صورت میں اسے نینج دینا اور نفث

ہے ذریعہ اس کا سفتہ کر دینا ضروری ہو تا ہے۔اس سلسلہ میں سرعت سے کام لیا جائے۔ نینج و سفتہ کا انجھار خلط کے عمدہ ہونے، طبیعت کی قوت اور طبیب کے ایسے عمل پر ہے جس کے ذریعہ وہ نینج دے

سکے اور قوت کی حفاظت کر سکے اور غذا کی مقدار میں اس سے غلطی سر زدنہ ہو سکے۔اگر نفث رک جائے، کوئی قابل قدر چیز خارج نہ ہو، پہلے سے بخار زیادہ ہو جائے اور در د بھی ہو تو اس کا مطلب سے

ہے کہ پیپ بنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ بخار کی تیزی اس کے بعد جاتی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھوڑا

کہ پیپ بن چکی ہے۔ کیکی آنے گئے اور اس کے بعد بخار بھی آ جائے تو اس کا مطلب سے ہے کہ پھوڑا

ہیں جو تا چاہتی ہے اس کی علامت سے ہے کہ نفث تھوڑا، در داور بخار تیز ہوگا۔ بر عکس کیفیت بر عکس
علامات کا مظہر ہوگی۔(مؤلف)

پیپ بنے کا عمل تیز ہو تا ہیاست، اس کا ندازہ درد، عرشن ، تھوک اور کھائی ہے ہوگا۔
تفصیل ہے ہے کہ یہ علامات مسلسل، تیز اور طاقتور ہوں گی تو جس پیپ بننے کا عمل تکمل ہوا ہے۔ اس
دن ہے لیکر بیسویں دن یا اس ہے کم تک پھوڑے کے پھٹنے کی توقع کریں اور یہ علامات کم تر ہوں تو
ای کے مطابق ذات الرئے میں پیپ ہے متاثر بوڑھے اور ذات الجنب میں اس ہے متاثر نوجوان زیادہ
مریں گے۔ پیپ پھٹ کر جن کے پسینوں میں داخل ہوتی ہے ان میں ہے اکثر وہ حضرات محفوظ
رہے جن بی جنھیں پیپ پھٹنے کے بعد بخار تیزی ہے چھوڑ دیتا ہے اور بھوک لگناشر وع ہوجاتی ہے۔ جن
حضرات کے پہلومیں پھوڑے نکلتے ہیں او پھٹ کر نواھیر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں وہ نجات پاتے
ہیں۔ ذات الجنب اور ذات الرئے کے مریضوں میں اگر در داور بخار نہیں جاتا اور وہ کوئی قابل قدر چیز
خارج بھی نہیں کریاتے، شکم بھی بار بار نہیں چلتے، پیشاب بھی زیادہ نہیں ہو تانہ اس میں کثرت سے
خارج بھی نہیں کریاتے، شکم بھی بار بار نہیں چلتے، پیشاب بھی زیادہ نہیں ہو تانہ اس میں کثرت سے
حارب پائے جائیں۔ بایں محفوظ ہونے کی تمام علامات بھی ملتی ہوں تویادر تھیں کہ ورم پھوڑے کی جانب پھوٹے کی تمام علامات بھی ملتی ہوں تویادر تھیں کہ ورم پھوڑے کی جانب بھوٹے کی تمام علامات بھی ملتی ہوں تویادر تھیں کہ ورم پھوڑے کی جانب پھوٹے کی تمام علامات بھی ملتی ہوں تویادر تھیں کہ ورم پھوڑے کی جانب بھوٹے کی تمام علامات بھی ملتی ہوں تویادر تھیں کہ ورم پھوڑے کی جانب مائل ہو کر باہر کی جانب پھوٹ کی تمام علامات بھی ملتی ہوں تویادر تھیں کہ ورم پھوڑے کی جانب بائی ہو کر باہر کی جانب پھوٹ کی تمام علامات بھی ملتی ہوں تویاد کھیں کہ ورم پھوڑے کی جانب بھوٹ کی تمام علامات بھی ملتی ہوں تویادر کھیں کہ ورم پھوڑے کی جانب بھوٹ کی تمام علامات بھی ملتی ہوں تویاد کو تویادر کھیں کہ ورم پھوڑے کی جانب بھوٹ کی تمام علامات بھی ملتی ہوں تویاد کی جانب بھوٹ کی تمام علامات بھی ملتی ہوں تویاد کی جانب بھوٹ کی تمام علامات بھی ملتی ہوں تویاد کی جانب بھوٹ کی تمام علامات بھی ملتی ہوں تویاد کی جانب بھوٹ کی تو تا کی تو تا کی جانب بھوٹ کی تھوٹ کی تھوٹ کی تارہ کی جانب بھوٹ کی تو تا کی تو تارہ ہوں تارہ ہوں تو تارہ ہوں تو تارہ ہوں تارہ کی تارہ کی تارہ ہوں تو تارہ ہوں تو تارہ ہوں تارہ ہوں تو تارہ ہوں تارہ ہوں تارہ تو تارہ ہوں تو تارہ

کیونکہ ان علامات سے بیہ پہتہ چلتا ہے کہ خلط کااستنظر اغ نہیں ہور ہاہے۔ان علامات کے ساتھ سلامتی کی علامات نہ ہول تو موت کا پہتہ چلتا ہے۔ورم اندر کی جانب مائل ہو گیا ہو۔بصورت دیگر بیہ اس بات کی علامت ہے کہ ورم باہر کی جانب پھٹے گا۔ (مؤلف)

مجھی نفث پختہ ہوتا ہے اور ضعف توت یا مادہ کے گاڑھے ہونے کی وجہ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ مجھی نفث زیادہ ہوتا ہے مگر پختہ نہیں ہوتا۔ صحتیابی کے لئے ضروری بیہ ہے کہ وہ پختہ ہواور نکل جائے اور کثرت سے نکلے تاکہ سفیہ ہوجائے۔ ہلاکت کیلئے بس بیرکانی ہے کہ نفث نا پختہ ہو۔ (جالینوس)

ذات الجنب کی ابتدامیں مقصودیہ ہو تا ہے کہ ورم کو بننے ہے روکا جائے ،اس کے لئے فصد اور استفر اغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر چین تیز ہو، بخار اور اعراض بھی لاحق ہول تو پھر اس بیاری کو وجو دمیں آنے ہے روکنا ممکن نہیں ہو تا۔ ایس صورت میں کثرت سے خون خارج کرنا ضروری نہیں ہو تا کیونکہ اس سے طاقت کم ہو جائے گی اور نضج کا معاملہ مؤخر ہو جائے گا۔ نفث بھی کرور ہوگا۔ ورم پختہ ہو جائے کے بعد پیپ بن جاتی ہو تا ہے۔ پیپ بن جاتی ہو تا کہ فرور ہوگا۔ ورم پختہ ہو جائے کے بعد پیپ بن جاتی ہو تا ہے۔ ایسے مریضوں مقصود نفث کے ذریعہ پھیپر مورے کے فاصد ہونے سے پہلے پہلے پیپ کا شقیہ ہو تا ہے۔ ایسے مریضوں کیلئے تدبیر وہی کی جاتی ہے۔ یعنی ماء الشعیر ، اور ماء العمل وغیر ہو بیاتا ہے۔ (مؤلف)

ذات الجنب خشک ہو،نفٹ تھوڑا آتا ہو، مریض پرمسہل اور فصد کا فوری عمل بھی کر بچے ہوں اوراہ صبح وشام ماءالشعیر دوبار باب الامراض الحادہ کے مطابق دیناضر وری ہو تو دوسری باراہ کم مقدار میں دیں۔اس سے پہلے ماءالعسل یاسفیدر قبق شراب جو بھی زیادہ مفید ہو جیسا کہ آگے ہم بیان کریں گے اس کے مطابق دیں کیونکہ جن مریضوں کی بیاری زیادہ خشک ہوتی ہے ان کی بیاری طول کریں گے اس کے مطابق دیں کیونکہ جن مریضوں کی بیاری مرطوب اور نفث بہ سہولت ہوتا ہے ان کی بیاری مرطوب اور نفث بہ سہولت ہوتا ہے ان کی کے اندر حرارت آسانی اور تیزی ہے آتی ہے۔

جس قدرنفٹ زیادہ ہو مریض کو غذائے ذریعہ زیادہ سے زیادہ طاقت پہونچا کیں کیونکہ نفٹ کی زیادتی میں مریض خطرے کی زدپر ہو تا ہے۔اس وقت اے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فضلہ کو دفع کر سکے۔

تھوک کے ذریعہ ضروری صد تک نفث ہو جائے، فصد، اسہاں اور حقنہ کی ضرورت باتی نہ ہوتو مریض کوغذامیں جو کی دلیہ دیں مگر فصد واسہال اور حقنہ کی ضرورت ہوتو اسے نہ دیں نہ اس کاپانی دیں حتی کہ نہ کورہ تدبیر وں کا اثر مکمل ہو جائے۔ اس کی ضروری ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں شک ہو جائے

تو دلیہ کاپانی دیں تاکہ معاملہ واضح ہو جائے، پھر جیساحال ہواس کے مطابق تدبیر اختیار کریں۔ بزاق کے ذریعہ مناسب نفث ہور ہاہو اور مریض کو کسی دوایا حقنہ کی ضرورت نہ ہو تو بقر اط جو کی دلیہ کھلانے کا تھم دیا کرتا تھا۔ضرورت کے مطابق جو کی دلیہ دینے سے مریضوں کانفث آسانی سے ہو تا ہے۔اس میں سکون ہو تا ہے، تنقیہ ہو تا ہے، بحر ان تیزی سے آتا ہے۔ پیپ بھی آجاتی ہے تو دوسری تدبیروں کے مقابلہ میں اس تدبیر کی وجہ ہے بیحد کم ہوتی ہے کیونکہ جو کی دلیہ رطوبت پیدا كرتى ہے اور ان اخلاط كو توڑ ديتى ہے جن كا خراج ضرورى ہوتا ہے چنانچہ نفث بہ آساني ہونے لگتا ہے۔ بایں ہمہ طاقت بھی پیدا کرتی ہے۔ ماءالعسل گور طوبت پیدا کر تا ہے مگر دلیہ کی طرح طاقت نہیں پیدا کر تا۔ گاڑھی غذائیں گو طافت زیادہ پیدا کرتی ہیں مگریہ نفث کو گاڑھا بنا کر اخراج کے اندر مشكل بيداكرتى بين، لبذاان سے ير بيز كرنا لازم بے كيونكه مكمل انحطاط كے بعد حتى كه اخلاط كے اخراج کے سواکسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ طبیب اگر شوصہ کے مریض کوسر کہ کے اندر بھگوئی ہوئی مسور دے دیتاہے تواس سے نفث رک جاتا ہے اور مریض مر جاتا ہے کیونکہ دوسری شب میں اے اختتاق ہو جاتا ہے مگر ماءالشعیر اور جو کی دلیہ اخلاط کے اندر کثافت نہیں رطوبت پیدا کرتی ہاورانھیں توڑ کرر کھ دیتی ہے۔ مریض کوزیادہ طاقت کی ضرورت ہو تواس کے لئے سب سے زیادہ موزوں چٹانوں کی مجھلی ہے جے پانی، کراث (گندیا) شبث (سویا) نمک، اور تھوڑے معتدل روغن کے ذریعہ تیار کیا گیا ہو۔اس سے پہلے مریض کو سلجبین دیں۔الایہ کہ مریض کے اعصاب کمزوراور بیار ہوں اور مریض عورت ہو تو اس کار حم کمزور ہو۔ ایسی صورت میں سلخبین کی جگہ فراسیون، اور اصل السوس سے تیار شدہ دوادیں کیونکہ تنہایہی دواماءالعسل کے ساتھ جب بھی پی جائے گی توسینہ کے فضلات خارج ہو جائیں گے۔ تھوک کے ذریعہ نفث آسان ہو جائے گا۔ اعصابی بیاری نہ ہو تو بخبین اخلاط کو توڑ دینے کے لئے کافی ہو گی بایں ہمہ معدہ کے لئے مصر نہیں ہوتی۔

نہایت عمدہ جوکا دلیہ لیں اور اچھی طرح اے پکالیں کیونکہ کینے ہے یہ اور زیادہ عمدہ ہو جاتا ہے۔ مری کے اندرر کتا نہیں نہ ہی یہاں پر چپکا ہے۔ بر عکس ازیں گاڑھی غذاؤں کا حال ہواکر تا ہے۔ ذات الجنب کی بیماری میں یہ بیحد نفع کرتی ہے کیونکہ ذات الجنب اور ذات الرئہ میں حرارت سینہ کے اندر کوئی چیز چپک جائے گی تو تیزی ہے خشک ہو جائے گی اور کرب بیدا کرے گیا اس کازائل ہونا مشکل ہوگا۔ متیجہ میں بیاس اور غم لاحق ہوگا۔

جو کادلیہ بیاس زائل کر تاہے بھسلتاہے اور تیزی ہے ہضم ہو جاتا ہے بشر طیکہ اچھی طرح پکایا سمیا ہو۔ ضروری حد تک استعمال کیا جائے تو بیحد نفع کر تاہے۔ اب میں یہ بتاؤں گا کہ کیے اس کا استعال ہوگا۔ مریض کے شکم میں کھانے کا بوجھ زیادہ عرصہ سے ہواورانی حالت استفراغ ہے پہلے ہو تو لازی طور پریہ ضروری ہے کہ اس کی وجہ ہے امعاء کے اندر پیداشدہ سدوں کے باعث پانگانہ خٹک ہو جائے اور آنتوں کے اندر محبوس ہو کررہ جائے کیو نکہ دلیہ لینے کے بعد ریاح خارج ہونے کے لئے نیچے نہیں جاسے گی بلکہ سب سے نیچے مقام تک یہ ریاح خراب حالت میں مہونچ گی۔ چنانچہ لاز فادر دسخت ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لئے اس میں سکون بھی ہوگا تو پھر دوبارہ ہونے لگے گا۔ اور ماضی میں قطعی طور پر ساکن رہا ہو تواب اور زیادہ تیزی سے ہونے لگے گا کے اور ماضی میں قطعی طور پر ساکن رہا ہو تواب اور زیادہ تیزی سے ہونے لگے گا کے وار خارج نہ ہو سکیں گی۔ پائٹانہ کے ابخر اب بھار پہلو میں بہو نچیں گے اور در دیدا کریں گے۔ شدت سے در دیدا کریں گے۔ شدت در دی وجہ سے تفس متواتر ہو جائے گا۔ تنفس کے اندر جتنی شدت سے تواتر ہو گا اتن ہی متواتر حرکت کی وجہ سے آلات تنفس میں حرارت پیدا ہوگی اور پھیچھڑ ااور تجاب خشک ہوگا۔ دور داور زیادہ بڑھے گا۔

بقراط کہتا ہے کہ ''ذات الجنب کا در دسینکنے سے ہلکانہ ہو اور تھوک خارج نہ ہو بلکہ اور زیادہ لیسدار ہو جائے اور شکم کونر م کرنے اور ضرورت کی حد تک فصد کھولنے اور ماءالشعیر دینے کے باوجود در دزائل نہ ہو تو مریض اس حالت میں جلد مرجائے گا۔''

بزاق (تھوک) کے اندر کی بڑھ جائے اور مشکل ہو جائے۔نفٹ نہ ہو تو یہ روی شوصہ کی علامتیں ہول گی۔لیسدار نفٹ کے اندر تھوڑی لی بھی پیدا ہو جاتی ہے گر بہت زیادہ لی پیدا نہیں ہوتی۔ بایں ہمہ افراج بھی آسان ہوتا ہے۔ گرنفٹ مسلسل لیسدار ہوتا جائے اور اس کے ساتھ افراج بھی مشکل ہو جائے تو یہ ایک فیمیٹ اور ردی علامت ہے۔شوصہ کا در دسینکائی، فصد، یا تلیین شکم سے زائل ہو جاتا ہے۔اگر ان باتوں سے زائل نہ ہوسکے تو ردی ہوتا ہے۔اس حالت میں ازالہ دردے پہلے جو کا دلیہ دیدیا گیاتو مریض تیزی سے مرجائے گا۔محذر ادویات سے شوصہ کا در داس لئے ساکن نہیں ہوتا کہ فاعلی سبب کا از الہ ہو جاتا ہے بلکہ اس لئے ہوتا ہے کہ من زائل ہوجاتی ہے۔

(جالینوس)

جالینوس کے دوران کلام میں یہ بات آتی ہے کہ حالت سخت ہو تو محذر ادویات استعال کی جاستی ہیں۔(مؤلف)

ند کورہ حالات کے اندر جو کادلیہ استعال کیا گیا تو مریض ساتویں دن مرجائے گا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی مرسکتا ہے۔ بعض مریضوں کے اندر فساد عقل اور بعض کو اختتاق ہو جاتا ہے۔ اس اس وقت ہو تاہے کہ جب تھوک کے اندر لسی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ لسی اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب تفض میں تواتر زیادہ ہو جاتا ہے۔ در دبیحد زیادہ اور خراب ہوتا ہے تو مرنے کے بعد مریف کا پہلو ہز ہو جاتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے چوٹ کی جگہ سبز ہو جاتی ہے کیو نکہ مریض مرتا ہے تواس مقام پر آنے والا خون مر جاتا ہے چنانچہ سبز ہو جاتا ہے۔ ایسا اس گئے ہوتا ہے کہ از الد در دسے پہلے ہی مریض مرجاتے ہیں کیونکہ ان کا تنفس عظیم اور متواتر ہو جاتا ہے۔ تھوک کے اندر لسی پیدا ہو جاتی ہے اور تیزی سے ان کا گلا گھٹ جاتا ہے۔ نہ کورہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی معاون ہوتی ہیں۔ تھوک کارک جاتا تنفس کو عظیم اور متواتر کر دیتا ہے اور تنفس کا عظیم اور متواتر ہونا، تھوک کے اندر لسی برحادیتا ہے۔ محبوس ہونے کی صورت میں لسی کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ تھوک بیر جب بھی رک جائے گا قصبة الرئہ تنگ ہو جائے گا اور مریض عظیم اور متواتر تنفس کے لئے مجبور ہو جائے گا۔ اخلاط شدت سے ختک ہو جائیں گے۔ اخلاط شدت سے ختک ہو جائیں گے تولی اور زیادہ ہو جائے گا۔ اضلاط شدت سے ختک ہو جائیں گے تولی اور زیادہ ہو جائے گا۔ اس طرح دور چلتار ہے گا۔

بقراط کہتا ہے''ناوفت جو کادلیہ استعمال کرنے ہی ہے یہ صورت نہیں پیدا ہوتی بلکہ دیگر اشیاء کے استعمال ہے بھی جو دلیہ کے مقابلہ میں کم موافق ہوتی ہیں یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔الغرض جب بھی پہلومیں چیجن کے ساتھ بخار شروع ہواور مریض نے کھانا جلد ہی لیا ہواور شکم کااستفراغ نہ ہوا ہو تواہے قطعی طور پر حیاء دیں تاکہ کھانا نیچے اتر سکے۔(جالینوس)

نیز تاکه در د کے اندر سکون ہو جائے۔ (مؤلف)

فرض کرلیں کہ ایک ایسا مخص ہے جس کا جسم کثیف، قویٰ خٹک، رگیں کشادہ، قوت حیوانی میں بھوک براداشت کرنے کی اہلیت موجو دہے وہ ایک ایسے وقت میں بھار ہو تاہے جس میں اس کا فم معد دہ زیادہ سر د نہیں ہو تا۔ بھار ہونے سے پہلے وہ کثیر الغذا کھانے استعال کر تارہاہے۔

ایک دوسر المحض مرطوب الجسم ہے، جسم کے اندر تخلیل کھے، رکیس نگ ہیں، قوت اور فم معدہ کمزور ہیں۔ یہ گرم موسم میں بہار ہوتا ہے۔ قبل ازیں وہ قلیل الغذ اکھلانے استعال کرتارہا ہے فرص کرلیں دونوں ذات الجنب کے مریض ہوتے ہیں، پہلے مریض کو آپ غذانہ دیں اور صرف مشروبات پر اکتفاکریں۔ یہ طریقہ اسوقت اختیار کریں جبکہ آپ کو امید ہوکہ مرض کی انتقااس سے زیادہ مؤخر نہیں ہوگے۔ دوسر مر سے مریض کو آپ شروع ہوگی دلیہ دیں۔ توالیم صور توں میں آپ کا طریقہ بالکل صحیح ہوگا۔ یہ دونوں مرض کے آپ فرائی گا تیزی سے گر تدبیر الٹ دیں گے تو ساتویں دن سے پہلے پہلے دونوں کو مارڈالیس کے۔ ان میں ایک کا گا تیزی سے گھٹ جائے گا، دوسر سے پرغشی طاری ہوجائے گا، دوسر امریض بچے ہوالی کو موت نہایت تیزی سے آپ گیا۔ میں بوڑھااور دوسر امریض بچے ہوالی کو موت نہایت تیزی سے آپ گی۔

آنتوں کے اندررکاہوا تقل (فضلہ) موجود ہو، دوسر اکھانا قریب ہی مریض نے کھایا ہواوروہ نوجوان ہوتو حقنہ دے دیں۔ پچہ ہوتو شیاف دیں۔ الایہ کہ کھانا خود سے نیچے آجائے اورا چھی طرح نیچے آجائے۔ تکمید سے مقام ہاؤف ہلکا ہو کر تحلیل ہوجا تا ہے۔ ورم حار میں اس سے خون لطیف اور پتلا ہوجا تا ہے، بعض کا استفراغ ہوجا تا ہے، چنانچہ تناؤ کم ہوجا تا ہے اور در دے اندر سکون پیدا ہوجا تا ہے۔ تکمید کایہ اثر نہ ہویا در دبڑھ جائے تو یہ سمجھیں کہ جسم اخلاط سے پر ہے اور تحلیل سے زیادہ مختلف مقامات سے مادے جذب کررہا ہے۔ ایس صورت میں فصدیا مسہل کے ذریعہ جیسی ضرورت ہو پوری طاقت سے استفراغ کر دیں۔ (جالینوس)

یعنی بیاری اوپر ہو تو فصد کے ذریعہ استفراغ کریں۔اور نجلی پسلیوں میں ہو مسہل دیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کہ اچھی طرح استفراغ کے بعد ہی چمید کریں۔(مؤلف)

مثانہ ماؤف ہو تو تھمید گرم پانی ،اسفنج یا پیتل کے برتن کے ذریعہ کریں۔ورم سبب تلاش کریں، سبب آگر سرخی ہو تو مرطوب تھمید زیادہ بہتر ہے۔فلقمونی ہو تو خشک تھمید عمدہ ہے۔اس کا اندازہ نفث اور وقت سے ہوگا۔

یہ اورام چو نکہ اندر کی جانب دور ہوتے ہیں اس لئے طاقت ور خشک تئمید استعال کریں۔ در د میں سکون نہ ہو تو جسم کا استفراغ کریں۔ البتہ مر طوب تئمید کا استعال مفید نہیں ہو تا تو زیادہ مضر بھی نہیں ہو تا۔ خشک تئمید میں بہت زیادہ مضرت ہوتی ہے۔ طاقتور تئمید وہ ہوتی ہے جو سر کہ اور کر سنہ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ ہوشیار رہیں کہ تئمید کے وقت مریض کے چبرے تک بہ کثرت بخارات نہ اٹھنے لگیں کیونکہ اس سے کرب اور تنفس میں تنگی پیدا ہوگی۔ البتہ بیاری شدید خشکی والی ہو تو اس

وقت اس کا تھوڑا فائدہ ہو گا چنانچہ مریض مرطوب بخار سانس کے ذریعہ اندر لے جائے گا جس سے نفٹ میں اس کومد دیلے گی۔ (بقراط)

اس تکتہ ہے وہ یہ بتانا چاھتا ہے کہ شوصہ کا مریفن گرم پانی کا بھپارہ لینے یا باب التہمید کے مطابق سر کہ اور کرسنہ کے ذریعہ سنکائی کا مختاج ہو تا ہے۔ یہ ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب قیاس آرائی میں یہ بات آ جائے کہ اخلاط گاڑھے اور لیسدار ہیں ورنہ تہمید جاور س اور نمک کے ذریعہ ہوگی۔لہذا تہمید ہے پسلیوں کے در دکااز الہ ہو تا ہے خواہوہ او پر کی ہوں یا نیچے گی۔فصد کے ذریعہ در د کااز الہ تب ہی ہو تا ہے جب در داو پر ہنملی کی ہڑیوں تک جاتا ہو۔ تہمید ہے در دز اکل نہ ہو دیر تک اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس ہے چھپھڑ ہے کے اندر خشکی پیدا ہوتی ہے اور پیپ اکٹھا ہونے لگتی ہے۔ ورم پسلیوں پر استر کرنے والی جمل کے بالائی حصوں میں ہوتا ہے تو در دمیں ہنملی کی ہڑی، باز واور چھاتی بھی شریک ہوجاتی ہے۔ زیریں حصول میں ہوتا ہے تو در دمیں تجاب حاجز اور پسلیوں کے سروں کے نچلے جھے شریک ہوجاتے ہیں۔ بالائی اعضاء کی جانب در دائھ رہا ہو تو باسلین کی فصد کے لیس ایس ایس کی فصد کھولیں جو ممکن حد تک کولیں۔ایس صورت میں مناسب یہ ہے کہ ماجنی رگوں میں اس رک کی فصد کھولیں جو ممکن حد تک عضوہ اؤ ف سے خون کھینچ کر اس جہت کے مخالف کر دے جس کی جانب خون مائل ہوتا ہے۔

(جالينوس)

بنا برای مخالف کی فصد کھولی جائے گریہ بات کتاب الفصد میں دیئے گئے بیان کے مخالف ہے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تاکہ خربق کو اسی جہت کے مخالف تھینچ لے جس کی جانب وہ ماکل ہوتا ہے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تاکہ خربق وغیرہ کے ذریعہ مسہل دیں۔فصد باسلیق کا سبب کتاب التشر تے میں ہے کیونکہ اسی جگہ اس نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ اعضاء کہاں سے سیراب ہوتے ہیں۔وہ کہتا ہے کہ اس رگ کھول دینا بیحد نفع بخش ہے۔اس کا سبب تشریحی ہے۔جہاں مناسب ہوگا اس کا تذکرہ ہم کریں گے۔(مؤلف)

خون کا اخراج اس حد تک ہوگا کہ رنگ اس کا بدل جائے کیو نکہ رنگ کی تبدیلی اس بات کی علامت ہے کہ متورم عضو کے اندر جو کچھ موجود ہاور چپاہوا ہے اس کا استفراغ ہوگیا ہے۔ ورم کو بالعموم زیادہ سرخ اور کم تربیاہ پائیں گے حتی کہ پورے جسم کاخون بلغمی بھی ہو تو بھی یہ خون مائل بہ سرخی وسیا ھی ہوگا کیو نکہ جس جگہ یہ چپاہو تا ہے وہاں حرارت آ جاتی ہے۔ لہذا خون کی تبدیلی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں جو موجود آ چکا ہے اس کا استفراغ ہوگیا ہے گر چو نکہ مریض کی طاقت بھی اس استفراغ ہوگیا ہے گر چو نکہ مریض کی طاقت بھی اس استفراغ کی راہ میں جائل ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ چھوڑدیا جائے۔ ایس صورت میں طاقت بھی اس استفراغ کی راہ میں جائل ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ چھوڑدیا جائے۔ ایس صورت میں

فائدہ کم ہوگا۔ مگر طافت کے گرجانے کے اندیشہ سے یہ مناسب نہیں ہے کہ اسے اختیار کیا جائے۔ اگر یہ رگ ظاہر نہ ہو بازو کے اندرونی شعبوں میں ابطی نام کی رگ کھولیں۔ یہ بھی ظاہر نہ ہو تواکل کی فصد کھولیں۔ یہ بھی ظاہر نہ ہو تو بہر حال قیفال کی فصد اپنی زبردستی سے کھول دیں۔ فائدہ ست اور کم ہوگا۔

سینہ کے بالائی گوشہ کی جانب ورم کے میلان کی علامات یہ ہیں کہ ہسلی، بازواور چھاتی کے اندر ثقل ہوگا۔ سینہ کے زیریں گوشہ میں پیدا ہونے والاورم تجاب حاجز کے قریب ہوتا ہے۔اس کی مثال وہی ہے جواس حصہ کے اندر پیداشدہ در دول کی ہے۔لہذا فصد کے لئے پسلیوں کے سرول سے مثال وہی ہے جواس حصہ کے اندر ہاتھ کے مابض کی فصد کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ قلب ان دونوں کے بچ میں ہوتا ہے۔ سینہ کے نیچ گوشہ میں جورگ ہوتی ہے وہ قلب سے متصل ہونے ان دونوں کے بہلے وریداعظم سے نکلتی ہے۔(جالینوس)

غالبًا گھنے کے مابض کی فصداس جگہ مفید ہوتی ہو۔ (مؤلف)

درداگر پسلیوں کے سرول کی جانب ہو تو خربق سیاہ کا مسہل دیں۔

شوصہ کے ہمراہ درد، اور شدید بخار ہو تو دواء مسہل ہر گز ہر گز نہ دیں۔ فصد کے ذریعہ استفراغ کریں۔ درد زیریں حصول میں ہو تو منق ادویہ دیں۔ اسہال کے مقابلہ میں فصد کے اندر کم خطرہ ہو تو زیادہ احتیاط اور اعتماد کی بات یہ ہے کہ فصد کولیں بلکہ فصد کے اندر کوئی بڑا خطرہ نہیں ہو تا۔ بالحضوص جبکہ مریض کا مزاج معلوم نہ ہوادر یہ بھی معلوم نہ ہو کہ دواء مسبل کی کتی مقداد دی جائے۔ مسبل دینا، کی ایسی چیز کو حرکت دینا جو خارج نہ ہوسکے اور کشرت سے استفراغ کرانا یہ سماری باتیں برے نقصانات کا باعث ہیں۔ بیار کا مزاج معلوم ہواور بخار زیادہ تیزنہ ہو تو مسبل دیں یا تو وہ سہل کر سے ساری باتیں برے نقصانات کا باعث ہیں۔ بیار کا مزاج معلوم ہواور بخار زیادہ تیزنہ ہو تو مسبل دیں یا تو وہ سہل کی بیادوسر اکوئی، سب سے عمدہ دوالیارج ہے جس میں خربق شامل ہواور سقمونیا شامل نہ ہو۔ دوادیے کے ایک گھنٹ بعد ماءالشعیر دیں کیونکہ اس سے اسہال خربی سامن کے ماتھ ماءالشعیر دینے کے سامل کا نقصان رفع ہو جاتا ہے اور اسھال تیزی در کہ جائے گا۔ سہال شروع ہو گیا ہواور ماءالشعیر دینے ہو جاتا ہے اور اسھال تیزی سے موتا ہے اور الیسدار) ایسی چیزوں کے سے ہو تا ہے۔ اسہال شروع ہو گیا ہواور ماءالشعیر دید یا جائے تو اسہال رک جائے گا۔ (جالینوس) سیدنہ کے اندر اخلاط غلیظ صفائی کے مختاج ہوتے ہیں اور اخلاط لزچہ (لیسدار) ایسی چیزوں کے سیدنہ کے اندر اخلاط غلیظ صفائی کے مختاج ہوتے ہیں اور اخلاط لزچہ (لیسدار) ایسی چیزوں کے سیدنہ کے اندر اخلاط غلیظ صفائی کے مختاج ہوتے ہیں اور اخلاط لزچہ (لیسدار) ایسی چیزوں کے سیدنہ کے اندر اخلاط غلیظ صفائی کے مختاج ہوتے ہیں اور اخلاط لزچہ (لیسدار) ایسی چیزوں کے سیدنہ کے اندر اخلاط غلیظ صفائی کے مختاج ہوتے ہیں اور اخلاط لزچہ (لیسدار) ایسی چیزوں کے

سینہ کے اندراخلاط غلیظہ صفائی کے متاج ہوتے ہیں اور اخلاط لزجہ (لیسدار) ایسی چیزوں کے متاج ہوتے ہیں اور اخلاط لزجہ (لیسدار) ایسی چیزوں کے متاج ہوتے ہیں جو انحیس توڑدیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماء العسل بصاق (تھوک) کے ذریعہ اخلاط غلیظہ کے اخراج کے لئے بیحد موافق ہے اور سیجنین اخلاط لزجہ کے لئے موافق ہے۔ماء العسل کے اخلاط

غلظ کو صاف کرنے میں ماء الضعیر پھر شراب شیری کا نمبر ہے۔ شراب اس وقت پینا ضروری ہے جب پھیچر اے اور پہلو میں ورم پختہ ہو جائے۔ الناورام کے سخت اور متورم ہونے کے وقت نہیں پینا چاہئے۔ شراب شیریں کے پہنے ہے بیار کو پیاس لگتی ہو تو یہ کم موافق ہو گی۔ الغرض گرم امراض کے اندر بزاق کے ذریعہ ضروری مادہ کو خارج کرنے کے لئے شراب شیریں موافق ہے کیونکہ یہ رطوبت اور اعتدال کے ساتھ جلاپیدا کرتی ہے۔ نیز مقوی بھی ہے۔ وہ ایسی بات میں بھی مفید ہم جس کا سینہ اور پھیپوٹے سے پھی خارج کرنے والا محتاج ہوتا ہے۔ تھوڑا اس سے شکم بھی چال ہوتا ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے اس سے فساد عقل کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے اس سے فساد عقل کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے اس سے فساد عقل کا اندیشہ نہیں مشروب کی کوئی اور قتم نہیں ہے۔ ناموافقت کم ہوتی ہے، پیاس اور گری کم لاتی ہے البتہ جگر اور تلی مریض ہوں تو ایسی صورت میں یہ ردی ہے۔ شہد کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ یہ صفراء پیدا کرتی ہم مطابق عمل کریں۔ مراری (صفراوی) جسموں کے باب میں اس سے زیادہ ہوشیار رہیں۔ شراب مطابق عمل کریں۔ مراری (صفراوی) جسموں کے باب میں اس سے زیادہ ہوشیار رہیں۔ شراب شیریں گاڑھی نہ ہو تو نفث کے لئے معین وید دگار ہوتی ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ شیریں گاڑھی نہ ہو تو نفث کے لئے معین وید دگار ہوتی ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کا نمبر ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کی میں دور ہو تو اس کے بیت ہیں کی دور کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سفید مائی شراب کی دور کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سفید میں کی دور کی ہوتی ہے۔ اس کے بیت سے بیت کی دور کی ہوتی ہے۔

شراب شیری سے بیاس لگی ہو تو شراب ابیض، شیری کے مقابلہ میں نفث کے لئے زیادہ معین ثابت ہوگی کیونکہ بیاس سے تھوک میں بیجد لی پیدا ہوتی ہے۔ سیاہ قابض اور خوصی شراب کا استعمال اس بیماری میں اس وقت تصبیح ہے جب سر میں ثقل نہ ہواور یہ اندیشہ بھی نہ ہو کہ فساد عقل لاحق ہوگا۔ نفث کے اندر لی پیدا ہوگی اور پیشاب میں دشواری لاحق ہوگی۔ ماءالعسل شوصہ کے مریضوں کے لئے عمدہ ہے۔ الایہ کہ احثاء میں ورم ہواور مزاج شدیدگر م ہوں۔ احشاء میں ورم ہواو مزاج شدیدگر م ہوں۔ احشاء میں ورم ہواتو ہو تو اسے نہ دیں محرور المزاج مریضوں کے لئے اس میں تھوڑی ملاوٹ کردیں حتی کہ پانی کے قریب ہوجائے۔ ماءالعسل بالعموم، شراب شیریں کے مقابلہ میں کم پیاس لا تا ہے۔ اس سے نفث میں اعتدال کے ساتھ معاونت ہوتی ہے۔ کھانی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ البتہ مریض اگر اس میں و کچی رکھتا ہے تواسے پیاس لگے گیاور تھوک میں لی پیدا ہوگی۔ (جالینوس)

ا پی رفت اور کثرت مائیت کے سبب ماءالعسل، شر اب ابیض کے مقابلہ میں کم پیاس لا تا ہے۔ البتہ اگر معدہ میں پڑا رہے تو پیاس لا تا ہے۔ نفث کے لئے سنجبین کے مقابلہ میں اس سے طاقتور معاونت حاصل نہیں ہوتی۔ سنجین بصاق (تھوک) کے ذریعہ ضروری نفث کے لئے معین ہوتی ہے اور تنفس میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ یہ وہی سخبین ہے جو ماء العسل اور تھوڑے سرکہ سے تیار کی جاتی ہے۔ کھٹی طاقتور ہوتی ہے اور اخلاط کا اخراج زیادہ کرتی ہے۔ اخراج کی قدرت نہ ہو تو لسی میں اضافہ کردیت ہے۔ کسی بصاف کو لیسد ارکر کے نقصان پہونچاتی ہے کیونکہ سرکہ اخلاط کو لطیف کر دیتا ہے مگر خشک کرتا ہے۔ پس سخبین کے اندر کسی قدر ترشی ہو۔ البتہ وہ اس حد تک نہیں بہونچی کہ بیار جو پچھ خارج کرتا ہے اے تو ژدے۔ اگریہ ترش نہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ ترش ہونے کی صورت میں لطافت پیدا نہیں کرسی ہے۔ البتہ تھوک کو خشک کردے گی کیونکہ سرکہ سے خشکی پیدا ہوتی ہے۔ (جالینوس) کیونکہ سرکہ تو ژدیتا ہے، نیز سرکہ کے ہمراہ خشک کردینے کا اثر ہوتا ہے۔ اخلاط اگر بیحد غلیظ ہوں حتی کہ کیونکہ سرکہ تو ژدیتا ہے، نیز سرکہ کے ہمراہ خشک کردینے کا اثر ہوتا ہے۔ اخلاط اگر بیحد غلیظ ہوں حتی کہ خبین حامض نفث کے ذرایعہ ان کو خارج کرنے سے عاجز ہو تو ایسی صورت میں زیادہ ردی ہوگے۔ کیونکہ خشکی پیدا کرے گی۔ (مؤلف)

سنجبین ترش سے بالعموم بیاری کے اندرخرابی اور خباشت پیدا ہوتی ہے لہذا الیمی صورت میں بیار
کی تمام علامات پر غور کر کے دیکھیں گے کہ وہ نکل سکتا ہے یا نہیں کیو تکہ خراب بیاریوں کے اندر
سنجنین ترش اگر خلط کو لطیف کر کے نفث کے ذریعہ خارج نہ کرسکی تو اس کے اندر اور زیادہ گاڑھا پن
پیدا کردے گی اور اگر اپنی طاقت سے وہ خلط توڑسکی تو توڑی ہوئی خلط کو خارج کرنے کے لئے اور زیادہ
طاقت کی ضرورت ہوگی ورنہ گلا گھٹ کر مریض کی موت واقع ہو جائے گی۔

جن مریضوں کی بیاری خراب اور پختہ ہوئے میں دشوار ہو مناسب یہ ہے کہ انہیں سیجبین ترش نیم گرم تھوڑی تھوڑا تھاڑا تھوڑا تھاڑا تھوڑا تھوڑ

یہ واضح ہے کہ ماء العسل کے اندر تھوڑا سرکہ شامل کردیا جائے تو یہ مرکب بیحد مفید ہوجاتا ہے کیونکہ اس سے ماء العسل کی خوبیال باقی رہتی ہیں۔ نیز اس سے نفث بہ آسانی ہوتا ہے ، نہ حد سے زیادہ ہوتا ہے نہ ہی اس کے اندر کسی رہ جاتی ہے۔ صفراء کے اندر تحریک بھی نہیں ہوتی۔ احشاء کے لئے غیر مصر ہے، ریاح اور پیشاب فارج کر دیتا ہے۔ البتہ خراش پیدا کرتا ہے۔ ماء الشعیر کے ساتھ اسے پلانا چاہیں تو دو گھنٹہ یااس سے زیادہ وقفہ کے بعد پلائیں کیونکہ اس مدت میں وہ ضروری

مقامات تک مبو پی سر ایت کر چکا ہوگا۔ ماء الشعیر کے ہمراہ اے پلانا خراب ہے۔ اضطراب بیدا کرتا ہے۔ سنجین کا استعال اسوفت ضروری ہے جب ماء العسل ہے کرب اور بیاس لاحق ہوتی ہو، خارج ہونے والے مادہ میں کسی زیادہ ہو۔ ماء العسل میں تھوڑا سرکہ شامل کرکے جوش دے لیں۔ ایسی صورت میں اس کا نقصان کم ہوجا تا ہے۔ (جالینوس)

ماءالعسل کے بجائے جلاب کا استعال مناسب ہے۔ جلاب کے پیاس لگتی ہو تو اس میں پچھے سر کہ ملالیں، دوبارہ پکالیں حتی کہ مؤثر ہوجائے۔ پھر پلائیں۔ جس سنجبین کا تذکرہ بقراط نے کیا ہے وہ ماء العسل اور سركہ سے تيار كى جاتى ہے۔اس كے استعال كا تحكم اس نے اسوقت ديا ہے جب ماء العسل ہے پیاس لگتی ہواور زیادہ اخراج مادہ کی ضرورت ہو۔ پانی سے اخلاطرکے اخراج میں مدد ملتی ہے نہ ہی اس سے پیاس کے اندر تسکین ہوتی ہے بشر طیکہ تنہا پیاجائے۔البتہ سنجبین اور ماءالعسل کے در میانی و قفہ میں پیاجائے تو اخراج مادہ میں معین ہو تاہے۔اس جہت کے سوااور کسی چیز میں مفید نہیں ہے۔ اس سے پیاس میں اضافہ ہو تا ہے اور احثاء بردھ جاتے ہیں کیونکہ شکم میں دیر تک رکتا ہے۔لہذا بہت زیادہ گرمی پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیاس میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ پھر اعضاء کے اندر تیزی ہے سر ایت بھی نہیں کرتا کہ انھیں مرطوب کر دے۔ زیادہ دیریک رکتا ہے۔اعضاء کے اندر ڈھیلاپن پیدا کر دیتا ہے۔ سنجبین کی طرح اس کے اندر پیاس بجھانے کی طاقت نہیں ہوتی۔اس لئے اس کاڈ صلا پن اعضاء کے اندر باتی رہتا ہے۔ سلخبین کااڑ بر عکس ہے، یہ رطوبتوں کولیکر سرعت ہے جسم کے دور در از حصول تک پہونے جاتی ہے اور مادہ کو توڑدیتی ہے۔ حمام سے پہلو کے در دمیں تسکین ہوتی ہے۔ اس سے اخلاط کے اخراج میں مدد ملتی ہے تنفس بہتر ہوتا ہے، پہلو، سینہ کی ہڈی اور شانوں کے اندر عارض ہونے والے در دمیں سکون ہو جاتا ہے۔لہذاؤات الجنب اور ذات الرئد کے مریضوں کے لئے یہ بیحد مفید ہے جو مریض بحالت صحت حمام کے عادی ہوں انھیں دوبار حمام کرائیں۔ حمام کی برادشت سب سے زیادہ ان مریضوں کے اندر ہوتی ہے جن کی بیاری زیادہ گرم نہیں ہوتی۔اورنہ ہی باب الحمام کے مطابق ساقط القوت ہوتے ہیں۔ورم کے پختہ ہونے سے پہلے اگر بیاری بیحد گرم نہیں ہے تو کو طاقت گری ہوئی ہو مرض ہلکا ہو اور غذاؤل کا استعال جاری ہو تو جمام سے فائدہ پہو پختا ہے کیونکہ اس سے در دمیں سکون ہوتا ہے،مادہ پختہ ہوتا ہے اور اس کے اخراج میں آسانی ہوتی ہے۔ البت یہ ضروری ہے کہ اس کا استعال جسمانی استفراغ کے بعد ہی ہو کیونکہ قبل استفراغ، حمام ہے مواد مھنج كرماؤف مقامات تك آنے لگتے ہیں۔استفراغ كے بعداس كے استعال سے مادہ كے پختہ ہونے میں مدد ملتی ہے۔ پختہ ہونے کے بعد اس کا استعال توبے خطرہے، اخلاط کے اخراج میں بھی اس سے بیحد

مددملتى ب\_(مؤلف)

ان بیار یوں کے اندر اخراج اخلاط کے ساتھ ہی مرض انتہا پر آجاتا ہے کیونکہ یہ وقت پختگی کا ہو تا ہے اور مادہ خارج ہونے کے بعد اعراض کے اندراضافہ قطعاً نہیں ہو تا۔ (جالینوس)

ذات الجنب میں مادہ کا اخراج بسر عت ہو تو بیاری کی مدت مختفر ہوگ۔ تاخیر ہے ہو تو بیاری دراز ہوگ۔ کتاب ابیذ یمیا میں فہ کورہ مریض آٹھویں دن تک کوئی شئے خارج نہ کر سکنے کی وجہ سے پلٹ گیااور خٹک کھانسی کھانستار ہاتواس کی بیاری چو نتیس دن تک باقی رہے گی حالا نکہ ذات الجنب کا بخران بالعوم چود ہویں دن شروع ہوجاتا ہے۔ اس لئے آگے تو بیسویں دن لا محالہ آئے گا۔ بیاری کے تیسرے دن سے مریض مادے کا اخراج کرنے لگا ہو تو بح ان ساتویں اور نویں دن اور زیادہ سے زیادہ گیار ہویں دن آکر رہتا ہے۔ تیسرے دن مادہ کا اخراج ہونا شروع ہو تو بیاری چودہ دن سے آگے نتیس سے تیسرے دن مادہ کا اخراج ہونا شروع ہو تو بیاری چودہ دن سے آگے نتیس کے تیسرے دن مادہ کا اخراج ہونا شروع ہو تو بیاری چودہ دن سے آگے نیسویں دن آکر رہتا ہے۔ تیسرے دن مادہ کا اخراج ہونا شروع ہو تو بیاری چودہ دن سے آگے نیسویں دن آکر رہتا ہے۔ تیسرے دن مادہ کا اخراج ہونا شروع ہو تو بیاری چودہ دن سے آگے دیسویں دن آکر رہتا ہے۔ تیسرے دن مادہ کا اخراج ہونا شروع ہو تو بیاری چودہ دن سے آگے دیسویں دن آکر رہتا ہونا شروع ہو تو بیاری چودہ دن سے آگے دیسویں دن آکر رہتا ہونا شروع ہونا شروع ہونا کی دن سے محتم ہونا شروع ہونے ہونا شروع ہونا کی ہونا شروع ہونے گیا۔

ذات الجنب ایک ورم ہے۔ مریض کوئی چیز خارج نہ کرے اور کھانی خٹک ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ورم ہیں بیخ قطعاً نہیں آیا ہے۔ یہ عدم بیخ کا پہلاا سینج ہو تا ہو گرر قیل ہو تا ہو گا۔ یہ بھی بیخ کی علامت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کے مقابلہ میں یہ کم درجہ رکھتا ہو۔ مریض اگر گاڑھا مادہ خارج کررہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیخ شروع ہو چکا ہیں یہ کہ درجہ رکھتا ہو۔ مریض اگر گاڑھا مادہ خارج کررہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیخ شروع ہو چکا ہو اور غلظت اپنے کمال کو مہو نی جائے تو یہ کمال بیخ کی علامت ہے۔ ایسی صورت میں بیاری ساتویں دن ہے آگے نہیں بڑھے گی۔ بیاری کس قدر مختم اور کتنی دراز ہوگی اس کا انحصار لاز ما بیجی مقد ارداس کی تا خیر برے۔

ذات الجنب میں کمال بھے کی علامت ہے کہ مریض سفید، مساوی اجزا کا اور متوسط القوام تھوک خارج کرے گا۔ گاڑھے پن کی جانب اس تھوک کا میلان ہوگا، بالکل ہی گاڑھانہ ہوگا۔ بہی کیفیت بیاری کے تمام ایام میں ہوگی۔ پتلا اخراج اس بات کی علامت ہے کہ بھی ہاکا اور پوشیدہ ہے۔ خالص سرخ وزر دمادہ کا اخراج تا محمود ہے۔ خاکستری سیاہ اور زنجاری قتم کا مادہ موت کی علامت ہے۔ ماوف پہلو کے بل مریض کا آسانی ہے سونا نیز بیاری کے زیادہ ہونے اور خراب ہونے کی صورت میں مریض کا بیاری سے مریض کا بیاری ہونے کی صورت میں مریض کا بیار پہلو کے بل بہ آسانی آرام کرنا بیاری کے کم ہونے کی دلیل ہے۔ بریکس ازیں بریکس حالت کی علامت ہے۔ (بقراط)

بیاری کے زیادہ اور خراب ہونے کی جملہ علامات یہ ہیں کہ کیفیت کے اعتبار سے بخار نہایت تیز ہوگا، تنفس میں شدت ہوگ۔ شدید چھن کے ساتھ در د ہوگاجو بسلی کی ہڈیوں سے شر وع ہو کر

پیچے کی پہلیوں تک جائے گا۔ پیاس سخت ہوگی، التھاب ہوگا۔ شکم میں حرارت زیادہ اور ہاتھ پیر شخنڈے ہوں گے۔اضطراب اور بے چینی کے ساتھ شدت کا در د ہوگا بیار پہلو پر لیٹنے سے در د ہوگا۔ عرصہ تک خٹک کھانسی آئیگی۔ کھانسی بھی نامحمود اور بمشکل اخراج مادہ کے بعد آئیگی۔ فساد عقل اور بے خوالی پائی جائے گی۔ (مؤلف)

ذات الجنب اور نفث دونوں باہم متضاد ہیں۔ ایک ہی آدمی کو دونوں بیاریاں لاحق ہوں تو ان میں سب سے خطر ناک بیاری کی جانب تو جہ دینے کی ضرورت ہو گی۔ (بقراط)

متضاداس کئے کہاہے کہ نفث الام میں غلظت (گاڑھاپن)اور تغریبہ (پاکش چڑھانا) کی اور ذات الجنب میں نظی، جلاءاور قطع مادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ (مؤلف)

ذات الجنب كے مريض چودہ دنول كے اندراخراج مواد كے ذريعہ صاف نہيں ہوگئے تو پيپ آجائے گی۔ پيپ زدہ مريض پيپ كے بھٹنے سے ليكر چاليس دنول كے اندر صاف نہيں ہوئے توسل ميں مبتلا ہو جائيں گے كيونكہ ندكورہ مدت سے آگے بڑھ گی تو پيپ سے پھپچرم سے كے اندر فساد پيدا ہو جائے گا۔

زیادہ اور کم ہونے کی صورت میں، پہلیوں کے اندر درد کتنا ہورہا ہے اس کی مقدار معلوم کریں کیو تکہ پہلیوں کے اندر جب بھی چھنے والا در دزیادہ ہوگا تو سب سے پہلی ہات جو معلوم کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیاری تب ہی لاحق ہوئی ہے جب پہلیوں کے ساتھ پہلیوں پر استر کرنے والی جعلی کے اندر بھی لاحت ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے بیاری خطرہ سے باہر نہیں ہے۔ تیسر سے یہ علامات کی وجہ سے طاقتور اخراج کی مختاج ہے۔ در داٹھ کر بہلی کی ہڈیوں تک پہونچ رہا ہو تو فصد کی ضرورت ہوگی گر پہلیوں کے سروں سے آگے نہیں بڑھ رہا ہو تو مسہل کی ضرورت ہوگی۔ پہلیوں کے اندر تھوڑا ہو بایں چھن نہ ہو نیز بہلی کی ہڈی تک پہونچ نہ ہی نیچ پہلیوں کے سروں تک آئے تو یہ ممکن ہے کہ پہلیوں کے اندر موجود محمی اعضاء کے اندر بیاری ہو، یہ بے خطر ہے۔ سی بڑے علاج کی ضرورت نہ ہوگی۔

ذات الجنب یاذات الرئه کے مریض کومرض متحکم ہوجانے کے بعد کھانے وغیرہ کے اسباب کے بغیر دست آنے گئے تو یہ ردی ہے کیو نکہ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جگر کمزور ہوچکا ہے ابندا کیلوس جذب نہیں کررہا ہے یا معدہ بھی طول مرض کی وجہ سے کمزور ہوچکا ہے بیاری کے شروع میں دست کا آنا مفید ہے۔ بالخصوص جبکہ مرض کے بعد آئے۔ پیپ زدہ مریضوں کو داغنے کے بعد ایک بیپ کا اخراج زیادہ ہوجائے تو ہلاک ہوجائیں گے۔

پیپ زدہ مریض وہی ہوتے ہیں جن کے سینوں کی فضامیں پیپ اکٹھا ہو چکی ہو۔ان میں وہ مریض داغنے کے ضرورت مند ہوتے ہیں جن میں پیپ زیادہ ہو حتی کہ منہ سے اخراج مایوس کن ہو۔ ایسے مریضوں کو نہایت سخت فتم کا ضیق شخس لاحق ہو تا ہے۔ ضیق شخس کی وجہ سے مجبور اُانھیں داغاجا تا ہے۔ کشھی ڈکار والے مریضوں کو ذات الجنب کم ہو تا ہے کیونکہ کشھی ڈکار انہیں کو آتی ہے جن کے مزاج بلغمی ہوتے ہیں۔ ذات الجنب نام ہے پسلیوں پر استر کرنے والی جعلی کے ورم کا۔ یہ جعلی اپنی گافت کے ہاعث بلغمی خلط کو کم ہی ہلاک کریاتی ہے۔ (بقراط)

ند کورہ بیان سے بیہ ظاہر ہوا کہ صفر اوی حضرات اس بیاری کے لئے مستعدر ہے ہیں۔ د

(مؤلف)

ذات الجنب ہے ذات الرئد ہو جائے توردی ہے کیونکہ ایسات ہی ہوگا جب ذات الجنب کی خلط
اتنی زیادہ ہو کہ سینہ اور پھیپرٹ کی در میانی فضا صدے زیادہ پر ہو جائے۔ چنانچہ لازی طور پر یہ خلط
پھیپرٹ کے اندر داخل ہوگ۔اس طری ذات الجنب سے ذات الرئہ تو بیدا ہو سکتا ہے گر ذات الرئه
سے ذات الجنب پیدانہ ہوگا کیونکہ ذات الرئہ سخت ہے تو مریض کا گلا قبل اس کے کہ بیاری کا اثر سینہ
میں پہونچے گھٹ جائے گا۔اس طرح اگر ذات الرئہ کی خلط تھوڑی ہے اور کمزور ہے تو مریض تھوڑی
کھانسی کے ذریعہ اسے خارج کر دے گا۔

پیپ زدہ مریضوں کو داغنے کے بعد پیپ صاف سفید خارج ہو تو یہ سلامتی اور بدبودار سیاہ خارج ہو تو ہلاکت کی علامت ہے۔(بقراط)

یہ بات ہر پھوڑے کے باب میں لازم ہے، صرف سینہ ہی کی حد تک نہیں بلکہ تمام اعضاء کے سلسلہ میں یہ عام قانون ہے۔ یہاں پیپ زدہ لوگوں کا اضافہ کیا گیاہے جن کے سینوں کی فضا میں پیپ اکٹھار ہتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے باب میں کی کا استعمال قدیم اطباء کا معمول رہا ہے۔ (جالینوس)

ذات الجنب اور ذات الرئه كى بماريول ميں ردى مونے كى علامات حسب ذيل ميں:

ا۔ سیاہ تھوک ۲۔ نہایت سرخ تھوک ۳۔ جھاگ دار تھوک ۴۔ بدبودار تھوک۵۔ شدید در دیا سوء تنفس کے ساتھ مشکل کے ساتھ تھوک کااخراج۔ (جالینوس)

ذات الجنب اور ذات الرئه اور ای جیسی بیاری میں امتلائی علامت ظاہر ہوتی رہی ہو تو موسم بہار میں فصد یا دواء کے ذریعہ استفراغ کریں۔ خواہ جسم کے اندر امتلائی کیفیت بظاہر موجود نہ ہو۔

شوصہ کے مریض میں فصد متورم پہلوکے محاذ میں کھولی جائے تواس کا فائدہ بہت ہوگا مگر مقام مرض کے مقابل ہاتھ میں فصد کرناپوشیدہ فائدہ رکھتاہے، یہ فائدہ ایک زمانہ کے بعد ظاہر ہوگا۔ (جالینوس) ذات الجنب کا مریض پیپ تھو کتا ہو اور چودہ دنوں کے اندر شفایاب نہیں ہوتا تواس کے پھیپھرٹ کے اندر پیپ جمع ہو جائے گااور سل کاشکار ہو کر فوت ہو جائے گا۔ (جالینوس) بات یوں نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ذات الجنب کا مریض اخراج کے ذریعہ صاف نہ کیا جائے تو پیپ میں جتلا ہو جاتا ہے۔ پیپ ہونے کی صورت میں یا چالیس دن تک سے نہ کرنے کی شکل میں پھیپھرڈاز خمی ہو جائےگا۔ (مؤلف)

جس مریض کے حجاب حاجز میں غلیظ ورم ہو اور اس کا اخراج بلا کسی سبب کے غائب ہو تو وہ ورم پھیپھڑے کی جانب منتقل ہو جاتا ہے اور مریض سات دن سے پہلے مر جاتا ہے۔ ذات الجنب اور ذات الرئے کے مریض کا شکم چلنے لگے تو بیہ ردی ہے کیونکہ بیہ قوت طبیعی کی موت کی علامت ہے۔ ذات الرئے کے مریض کا شکم چلنے لگے تو بیہ ردی ہے کیونکہ بیہ قوت طبیعی کی موت کی علامت ہے۔ شفاخانہ میں ایک ایسے بچے کو تشنج ہو گیا جے ذات الجنب تھا۔ ذات الجنب پختہ ہو چکا تھا۔ بہیپ کا اخراج بو تک تھا۔ ذات الجنب پختہ ہو چکا تھا۔ بہیپ کا اخراج بہ آسانی ہور ہا تھا اس لئے ہمیں اس کے نی جانے اخراج بو تک مدبہ آسانی ہور ہا تھا اس لئے ہمیں اس کے نی جانے کی اسد تھی۔

ذات الجنب اور ذات الرئد كزاز كامو جانامبلك ٢- (جالينوس)

## ذات الجنب كي علامات حسب ذيل بين:

تیز بخار، پہلیوں کے اندر چیمی جو بہنلی کی ہڈی اور پہلیوں کے سر وں تک پہو پنجی ہے، سکی انفر من مر وع میں ختک کھانی پھر جھاگ وارشتے کا افراج جو پیپ کی جانب ماکل ہوتی ہے۔ بیار پہلو پر سونہ سکنا، بے خوابی، زبان میں خشکی اور کھر در این، در دبڑھ جانے کی صورت میں ہاتھ پیر مختلا ہے، رخسار کی ہڈیاں اور آ تکھیں سرخ، رہ رہ کر پسینہ آتا ہے، پیٹ چلنے لگتا ہے، کسی پبلو مریض لیٹ نہیں سکتا، بیاری بڑھ جانے کی صورت میں تفض تیز، اور پہلیوں کے سرے پھیل جاتے ہیں، نبض مختلف ہوتی ہے۔ خارج ہونے والی شئے سیاہ یا گلابی رنگ کے مشابہ یا بد بودار ہوتی ہے۔ تفض سخت ہوجاتا ہے۔ بعض اطباء کا قول ہے کہ ہائیں پہلو میں ورم ہوگا تو قلب سے قربت کی وجہ سے تنفس نہایت ہے۔ بوجاتا ہوگا۔ کو جہ سے تنفس نہایت ہوجاتا ہے۔ بھو جاتے ہیں۔ مریض ہمیشہ گدی کے مشابہ یا دوجاتے ہیں۔ مریض ہمیشہ گدی کے مجتمع ہو جانے کی جانب منتقل ہو جاتی ہے تو نہ کورہ اعراض ساکن ہو جاتے ہیں۔ مریض ہمیشہ گدی کے مجتمع ہو جاتے ہیں۔ مریض ہمیشہ گدی کے مجتمع ہو جاتے کی جانب منتقل ہو جاتی ہیں اور ر خسار کی ہڈیاں سرخ ہو جاتی ہیں۔ (جالینوس)

### تج بول كى روشنى ميں:

تیز بخار ، تنگی تنفس ، ذات الجنب اور ذات الرئه میں تکمین مادہ کا نگلنا عام ہے۔ چیجن کا در د بھی پسلیوں کے اندر ہونے گئے اور نبف کے اندر صلابت پیدا ہوجائے تو یہ ذات الجنب ہوگا۔ اس کے ہاتھ نبض کے اندر نرمی یا عدم صلابت یائی جائے ، انتہائی تنفس ہو ، مریض کو ایسی تنگی محسوس ہو نے گئے جیسے اس کا گلا گھٹ جائے گا تو یقین کرلیس کہ یہ ذات الرئه کی بیماری ہے۔ (جالینوس)

ذات الجنب میں ورم صفراوی ہو توگرم قتم کے آتشی ابخر اب انھیں گے۔اس کی وجہ سے فساد عقل ہوجا تا ہے۔ورم بلغمی ہو گا تو بخار زیادہ نرم، اور ساکن ہو گا۔ بخارات مر طوب اور روشن انھیں گے، نینداور بے خوابی دونوں ہوں گی۔ (جالینوس)

کوئی ایبا مریض جس کی نبض بیحد صلب رہی ہو حتی کہ صلابت کے سبب ذات الجنب کے مریضوں کی نبض ہے بھی زیادہ صغیر ہوگئی ہواہ موت سے نبیات نبیں دیکھا۔ (جالینوس) مریضوں کی نبض سے بھی زیادہ صغیر ہوگئی ہواہ موت سے نبات پاتے نبیں دیکھا۔ (جالینوس) فساد عقل، پہلیوں کو استر کرنے والی جعلی کے ورم کے مقابلہ میں ورم تجاب سے زیادہ ہوتا ہے وہ دماغ سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے۔ (جالینوس) ہوتا ہے وہ دماغ سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے۔ (جالینوس) پہلومیں گہرا در دہو تو زیادہ تر پچند لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ البعد درد کے بعد ورم نہ ہوگیا ہو

پہریں ہروررہ وریوہ روپہ تا ہو۔ اس مل کے بعد پیند لگانے کی افادیت بہت زیادہ اور انتہا کے بعد پیند لگانے کی افادیت بہت زیادہ برہ جاتی ہے کیو نکہ اس ہے مرش پسلیوں پر استر کرنے والی جعلی ہے دور ہوجاتا ہے اور تھنچ کر جلدگی جانب آ جاتا ہے اور اس طرح باہر نکل جاتا ہے۔ اس گوشہ میں پہو نچنے کے بعد اے تحلیل کردینا ممکن ہوتا ہے پھر بھی باتی رہے اور تحلیل نہ ہوسکے تو بھی ان مقامات کے نرم ہونے کی وجہ ہے درد کم ہوگا۔ علاوہ ازیں یہاں اعصاب بھی کم ہوتے ہیں جبکہ پسلیوں کے در میان اعصاب زیادہ ہوتے ہیں۔ نیز اس لئے بھی کہ مرض ہڑی ہے دور ہوجاتا ہے کیو نکہ ہڑیاں ورم سے مزاحت کرتی ہیں چنانچہ اس سے دردا ٹھنے لگتا ہے ویسے ہی جیسے داخس (Whitlow) ہیں گوشت سے ناخن کی مزاحمت ہوتی اس سے دردد تیز ہونے لگتا ہے ویسے ہی جیسے داخس (Whitlow) ہیں گوشت سے ناخن کی مزاحمت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہونی اس سے دردد تیز ہونے لگتا ہے۔ (جالینوس)

ب مجتمع کرلیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس سے داخلی طور پر اجتماع سے محفوظ رہا جاسکتا ہے اور ورم پھٹ کر سینہ کی فضامیں پیپ داخل نہیں کر سکتا۔ (مؤلف)

بیخے ہے اور اس بات ہے زیادہ مفید کوئی اور چیز نہیں ہے کہ بہ کثرت تنقیہ کرنے کے بعد مقام در دکو ظاہر میں نرم کرلیا جائے تاکہ خلط کو ہیر ون کی جانب جذب کیا جاسکے اے انجام دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ای طرح میرایہ خیال بھی ہے کہ جو پھوڑے تجویفوں پر ہوتے ہیں انھیں باہر کی جانب ممکن حد تک پھیلایا جائے۔

ذات الجنب میں سب سے کمزور حالت وہ ہوتی ہے جس میں اخراج مادہ نہیں ہوتا۔ (جالینوس)

ایما قلت غذا کے باعث ہوتا ہے نہ کہ امتاعی طور پر۔اے اسطرح سمجھا جاتا ہے کہ اس کے
ساتھ کوئی دردنہ ہواورنہ ہی مرض کے اعراض کی کوئی مقدار موجود ہو۔ مرض کے اعراض زیادہ
ہول ہنفس نہ ہوتو یہ عدم نفجی وجہ ہے ہوتا ہے نہ کہ بیاری کے ضعف اور قلت کی وجہ ہے۔
(مؤلف)

''برزاق''جوگول شکل اختیار کرلیتا ہے فساد ذھن کا پیتہ دیتا ہے۔ گول شکل اس لئے اختیار کرلیتا ہے کہ اخلاط کے اندر گاڑھا پن اور لسی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر قصبۃ الرئہ میں اس کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ سبب فاعلی اس کا بیہ کہ ند کورہ مقامات پر حرارت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میر امشاہدہ ہے کہ جب بیہ پیدا ہو تا ہے اور عرصہ تک موجو در ہتا ہے توسل کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔ خلطی علامات کے ہمراہ ہو تا ہے تو فساد ذھن کا پیتہ دیتا ہے۔ تنہا ہو تا ہے تو اسپر اعتماد نہ کریں۔ ینچے کی رگول میں پیپ پڑجائے تو ذات الرئہ ہے آدمی محفوظ رھتا ہے۔ (جالینوس)

تجاب کے اندرورم ہو، بایں ہمہ سخت عمر تنفن اور کرب ہو پھر فساد عقل بھی لاحق ہو جائے تو مریض چو بھے دن انتقال کر جائے گا۔ بیاری کے اندر مریض کا ہونٹ اور باک کا کنارہ سبز ہو جائے اور بیش جو بھے دن انتقال کر جائے گا۔ بیاری کے اندر مریض کا ہونٹ اور باک کا کنارہ سبز ہو جائے گا۔ موت اور بیشاب بیاری کے شروع میں سخت سرخ ہو تو باک کے سبز ہوتے ہی مریض مر جائے گا۔ موت چھٹے یاساتویں دن واقع ہوگی۔ ذات الجنب کے ساتھ سخت عشی ہواور مسلسل اس کا حملہ ہو تو یہ کیفیت مہلک ہے۔ (یہودی)

ذات الجنب سے بوڑھے بالعموم مرجاتے ہیں کیونکہ ضعف قوت کے باعث اخراج کے ذریعہ وہ خلط کا تنقیہ کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ ذات الجنب خالص ہیں ورم ان عضلات کے اندر ہوتا ہے جو داخلی طور پر پسلیول سے چکے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ در دان مریضوں کو ہوتا ہے جنہیں یہ بیاری صفراء کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ سخت بیاری وہ ہوتی ہے جو بچ میں تاخیر کرتی ہے۔

ذات الجنب میں پیش آنے والے نامانوں خراب اعراض حسب ذیل ہیں: عشی، زبان کی خشکی، بے خواتی، فساد عقل، اختلاج قلب۔ ایسی حالت میں مناسب طریقہ ہے ان اعراض کا مقابلہ کریں۔ یہ ضروری ہے۔ (اھرن) ذات الجنب کے ہمراہ مسلسل بخار، بسلی کی بڑی اور پسلیوں کے سرول تک ورد، کھالی، و شواری تنفس،اور پسلیول کے نیچے سخت جیسے والا در د ہو تا ہے۔ یہ تمام اعر اض ورم حمد حار میں بھی ہوتے ہیں۔ البتہ ذات الجنب میں در د چھنے والا اور نبض صلب ہوتی ہے۔ جگر کی بیاری میں جو کھانسی ہوتی ہے اس میں اخراج مادہ بھی نہیں ہو تا۔ شوصہ کی حالت میں شر وع میں ایسا ہو تاہے ورم حمد میں چرہ نہایت زرداور خراب ہوتا ہے۔ورم اگر پیلیول پر چیکنے والے عضلات کے اندر باہر سے ہوتا ہے تو ذات الجنب غیر سیحے ہو تا ہے۔اس حالت میں کھانسی، بیکی،اور صلب نبض نہیں ہوتی۔ دبانے پر در دہوتا ہے۔ تحلیل نہیں ہوتا تو اس کاسر باہر نکل آتا ہے۔اس وقت آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ذات الجنب خالص میں کبھی نہیں ہوتی۔ ذات الجنب کا پھوڑا اندر کو پھو ٹنا ہے۔ در دہنسلی کی بڑی تک پہو نختاہو تو فصد کردینااولی ہے مگر پسلیوں کے سروں کے نیچے تک جارہا ہو تومسہل دینا جاہئے۔ تا تجر بہ کاراطباء ایسے تمام مریضوں کو خراب کر دیتے ہیں کیونکہ اسھال سے جو اضطراب اوربے چینی پیدا ہوتی ہے اس ہے وہ ڈر جاتے ہیں۔ضعف توت کے سبب فصد اور اسھال نہ ہو سکے تواہیے مسہل حفے استعال کریں جن کے اندر حدت ہو، پھر ماءالعسل اور ماءالشعیر دیں حتی کہ بیاری میں انحطاط آ جائے۔انحطاط پر ند کورہ اشیاء میں کراٹ اور فوذنج شامل کر کے یکالیں۔ تخم انجرہ ہمراہ شھد چٹائیں، پہلومیں شدید در د ہو توروغن، نخالہ، گرم د جھیوںاور گرمیانی کی تکمیدکریں۔شیریں نیم گرم روغن نمکین پانی اور دریا کے پانی میں اون ڈبو کر رکھیں۔اس اون پر کبریت چھڑک لیس یاوہ صاد استعال کریں جو پانی کے ہمراہ بزورے تیار کیا جاتا ہے۔ پانی کے اندر بابونہ، محظمی اور تمام مرخی اور محلل ادویه شامل کرلی گئی ہوں۔ مریضوں کو چو د ہویں دن تک صرف ماءالشعیریا ماء العسل دیں اس کے بعد بادام، حب القریص اور شہد ہے تیار کر دہیا ہی جیسے منفث وملین لعوق چٹا ئیں۔رات میں منہہ کے اندر وہ گولیاں رکھیں جو کھانسی کے لئے تیار کی جاتی ہیں۔ چربیوں، لعابوں اور تخموں جیسے نرم منضجات کا صاد مقام ماؤف پر رتھیں۔ بے خوابی ہو تو لعوق خشخاش استعال کریں۔ چو د ہویں دن پینہ لگادیں۔ تدابیر میں لطافت پیدا کریں حتی کہ مرض میں انحطاط واضح طور پر آجائے۔اس کے بعد مریض کو حمام کرائیں۔ مصندے یانی ہے پر ہیز کرائیں۔ تدابیر میں تھوڑی غلظت بیدا کریں۔ (بعنی کھانے پینے کی اشیاء میں ذراموئی غذائیں دیں) پھوڑ ابڑھ کرپیپ پیدا کرے تواس کاعلاج وہی ند کورہ بالا ہے۔ پہلومیں ریاحی درو بخار کے بغیر ہوتو محلل ریاح ادویہ استعمال کریں۔ (بولس) فصد کرے جم کو صاف کرلیں اور پھر مقام ور دیر پہند لگادیں تو فوری شفاکا جرتناک منظر د یکھیں گے۔ کسی اور علاج کی ضرورت محسوس نہ کریں گے۔ در د بالکلیہ جاتارہے گا۔ تج بہ سے بیا

علاج مفید پاکر آرمینیا کے غیر طبیب حضرات تک نے اس پر اعتاد کیا ہے۔ مرخی صادوں اور تہمید کا بھی بہی اثر ہے۔ تہمید سے در د میں اضافہ ہو تو اے استعال نہ کریں کیو نکہ جم میں امتال کی کیفیت ہوگی۔ غذامیں ماءالعسل پر اکتفاکریں۔ اس سے زیادہ مفید اور کوئی شئے نہیں ہے۔ بخار التہابی فتم کا ہو تو ماءالشعیر دیں۔ بے خوابی زیادہ ہو تو تھوڑا خشخاش دیں ور نہ نہ دیں کیو نکہ اس سے اخلاط میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کے لئے ماءالشعیر عمدہ پکا ہوا ہو نا چاہئے۔ بنج پیدا کرنے والی چیزیں بیحد مضر ہیں۔ عصار ہ بادام اور روٹی کے جھکے ضعف کی حالت میں دیں۔ انار سے پر ہیز کریں۔ نہ کورہ حالت کے لئے خراب ہوتا ہے۔ نیز تمام سر دچیز وں اور مھنڈے پائی سے پر ہیز کریں۔ نہ کورہ حالت کے ساتھ دست آرہے ہوں تو فصد نہ کریں، شکم کا علاج کریں حتی کہ دستوں کا آنا بند ہوجائے۔ ذات ساتھ دست آرہے ہوں تو فصد نہ کریں، شکم کا علاج کریں حتی کہ دستوں کا آنا بند ہوجائے۔ ذات الجنب خالص میں جس کے ساتھ بخار ہو فصد اور نرمی سے اسحال کے ذریعہ تھمید لازم ہے۔ غیر خالص میں مقامات ماؤف پر زفت کے ذریعہ صاد رکھ کر مالش کریں، چپخ لگائیں تاکہ پھوڑے کو ہیر ونی جانب تھینے لیں، بیج کرنب جلا کر چر بی میں گو نہ لیں اور صاد کریں۔ (اسکندر)

پیپ کے اخراج میں د شواری ہو تو تکمیداور نطول زیادہ کریں۔(شمعون) ذات الجنب میں در دبیحد کم ہواور مریض خون جیسی چیز خارج کر رہا ہو تو یہ جائز ہے کہ فصد نہ کھولیس کیونکہ بید دیگر دوسر سے علاجول کے ساتھ چلتی ہے۔(جالینوس)

## ذات الجنب اور کھانسی کے لئے مفید ضاد کا نسخہ۔

پیہ بط، پیہ مرغ، گائے کا تھی، بحری کا تھی، زوفائے تر، نیز مخم کتان، حلب، ناخونہ، محظمی، کلی نورستہ اذخر، بابونہ، آر درجور پیٹی کیڑے سے چھانا ہوا، پانی اور روغن شیرج یاروغن نرگس میں اگر بلغمی ہو پکا کرایک دھجی پر طلاء کریں اور پہلو پر رکھیں۔خارج ہونے والا مادہ صاف سفید ہو اور اس میں خون شامل ہو تو در د کا سبب خون ہوتا ہے۔ (تیاذوق)

بقراط کا قول ہے کہ حجاب میں در د ہواور مریض ہنلی کی ہڈی میں کسی طرح کا اثر محسوس نہ کر ہے تو خربق سیاہ اور بقلہ بریہ کے ذریعہ شکم کونرم کریں۔(جالینوس) یہ دواایک زہرہے(۱)۔(مؤلف)

<sup>(</sup>۱) الفظ يتوع استعال ہوا ہے۔ يتوع ہر اس بہنے والے دودھ کو کہتے ہیں جو جسم کوز خمی کردیتا ہو۔ مثلاً سقمونیا شرم لاعیہ۔اس کی سات قسمیں ہیں۔

### ذات الجنب اور در د جگر میں فرق:

پیلیوں کے اندر در داور کھائی ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ذات الجنب ہو۔البتہ اس کے ساتھ رنگین مادہ بھی خارج ہو توذات الجنب ہوگا۔اخراج مادہ نہ ہو تو ممکن ہے کہ ذات الجنب ہیں بھی خارج ہو تو ذات الجنب ہیں بھی جو ہو ہو ہو ہو گو اخراج مادہ نہ ہو تو و ممکن ہے کہ دات الجنب ہیں بھی ہو ہو ہو ہو گو اور ہو اور اللہ بیں جب تناوی پیدا ہو تا ہے تو تجاب، پیلیوں اور الن کی جعلی سب کے اندر در د ہونے لگتا ہے۔ گر ذات الجنب میں نبض صلب ہوتی ہو تی ورم تھر کی طرح شکم سے نہیں ابھرتی۔ شکم سے کوئی چیز بہہ رہی ہو تو اس کے بعد غالبًا ورم تعبد نہ ہوگا۔ حراق کو شؤلیں،اگریہ بات ہو تو ورم جگر ہوگا۔ کوئی چیز بہہ رہی ہو تو اس کے بعد غالبًا ورم تعبد نہ ہوگا۔ حراق کوشؤلیں،اگریہ بات ہو تو ورم جگر ہوگا۔ ہوتا ہو تا ہے دیکھوں کے گوشہ اور بہنی میں کوئی ہوجھال کئی ہوئی چیز تو مریض محسوس نہیں ہوتا ہے دیکھوں کہ پسلیوں کے گوشہ اور بہنی میں کوئی ہوجھال کئی ہوئی چیز تو مریض محسوس نہیں کر رہا ہے کیونکہ ورم تعبد ، تجاب پر تعبد کے دباؤ پڑنے سے پیدا شدہ سی تھی تشروع میں یہ حالت کر دہا ہے۔ ڈور ایوں کے در داور دغد غہ سے کھائی کی تح کے بعد انکشاف ہوتا ہے کوئکہ ورم تحبد میں زبان دات الجنب سے مشابہ ہو جاتی ہے۔ عرصہ گذر نے کے بعد انکشاف ہوتا ہے کیونکہ ورم تعبد میں زبان ساویاس خ ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ کوئکہ ورم تعبد میں زبان ساویاس خ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ (ابن سرایون)

جلد کے رنگ، غذائی تدبیر اور دردکی نوعیت نے فرق قائم کرناممکن ہے۔ ورم جگر میں رنگ خراب ہوتا ہے، غذائی تدبیر مولد سوادء رہی ہوگی، در دحد سے زیادہ اور بوجھل متم کا ہوگا۔ ذات الجنب میں رنگ سرخ ہوگا کیو نکہ یہ بیماری الن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو شراب پیلتے ہیں اور جن میں خون زیادہ ہوتا ہے در دسخت ہو جائے گا۔ (مؤلف) ہوتا ہے در دسخت ہو جائے گا۔ (مؤلف)

### ذات الجنب کے بارے میں:

ذات الجنب سیح اور غیر سیح ہوتا ہے۔ سیح وہ ہوتا ہے جس میں ورم داخلی طور پر پسلیوں سے چکے وہ ہوتا ہے جس میں ورم پسلیوں کے مابین عضلات کے اندر ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ذات الجنب سیح میں در دینز چینے والا ہوتا ہے کیونکہ ورم جملی کے ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ذات الجنب سیح میں در دینز چینے والا ہوتا ہے کیونکہ ورم جملی کے اندر ہوتا ہے۔ ذات الجنب غیر سیح میں در د چینے والا اور تیز نہیں ہوتا بلکہ تڑپ ہوتی ہے کیونکہ یہ ورم جملی کے اندر نہیں گوشت کے اندر ہوتا ہے، نیز ذات الجنب سیح میں در د ہو جمل قسم کا ہوتا ہے، فیر سیح میں تڑپ پسلیوں کی کی ایک جگہ پر مستقل ہوتا ہے۔ سیح میں نبض بیحد صلب اور منشاری

ہوتی ہے۔غیر صحیح میں صلابت نہیں ہوتی۔علاوہ ازیں کھانسی کے ساتھ مادہ بھی خارج ہورہا ہو توبیہ ذات الجنب صیح ہے۔ مادہ خارج نہ ہو تو یہ غیر صحیح ہو گا۔انگلیوں سے مقام ماؤف چھونے پر در د ہو تو ذات الجنب غیر صحیح ہے، در دنہ ہو تو صحیح ہے۔ مادہ کی پہچان رنگ ہے ہو گی۔اس کی لمبائی اور حجھوٹائی کی پہچان اخراج مادہ کی تیزی ستی، یتلے بن اور گاڑھے بن ہے ہو گی۔ای طرح ذات الجنب کے اعراض یعنی بخار ، چیجن کا در داور تنگی تنفس ذات الجنب صحیح میں زیادہ سخت ہو گی۔بالحضوص جبکہ مریض کا تقیہ نہ ہو گا تواہے سل کی بیاری ہو جائے گی۔ میر اخیال ہے کہ بیاری ابتدائی مرحلہ میں ہو تو مخالف میں فصد کھول دی جائے۔ مادہ کا استفراغ ہو جانے کے بعد خود ماؤف پہلو کی جانب کھولیں۔ در د جگر اور بسلی کے گوشوں میں مہونچ رہا ہو تو فصد اور نیجے اُر رہا ہو تو مسہل استعال کریں۔اس کے بعد عناب، سیستال، انجیر، خشخاش، کیترا، بنفشه مُر بی اور روغن بادام کاجوشانده صبح کو پلائیں۔مریض بہتر حالت میں آجائے تو ماء الشعیر دیں۔اس طرح کھانی کے اندر تسکین بھی ہوگی اور مادہ بہ آسانی خارج بھی ہو گااور حرارت کے اندر سکون بھی ہو گا۔ چو تھے ،یا چھٹے یااس کے لگ بھگ دنول کے بعد جو شاندہ کے اندراصل اسوس،اور پر سیاد شال ڈال دیں تلیین طبع کی ضرورت محسوس ہو تو بنفشہ جوش ويكراس ميں خيار شمز اور فانيذ املائيں اور مريض كوديں۔ زيادہ مشكل ہو تو نرم حقنہ ديں بالخضوص جبكه در دینچے کی جانب تھیل رہاہو۔ سینہ شمع مصفی ،روغن بنفشہ اور حتیر اکی قیر وطی ملیں۔ آخر میں جب بھج تکمل ہو جائے ، حرارت اوپر آ جائے توماءالعسل پلائیں۔ سینہ پر بابونہ ، بیخ تحظمی ، بنفشہ ، آرد جو ،روغن حل کا صادر تھیں۔ غذامیں بیار کی ابتداہے لیکر آخر تک پنم گرم مرطوب اشیاء دیں تاکہ بھجاور اخراج ماده میں مدد ملے۔ سخت بخار نہ ہو تو شہد شامل کرلیں۔ شدید بخار کی صورت میں فائیذ، روغن بادام شریں، باب السعال میں مذکورہ سزیوں کے ساتھ آپ نخالہ (سبوس گندم کایانی) شامل کریں۔ شر اب ریحانی اور اس جیسی دوسری شر اب استعال نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ یانی کے ساتھ ماءالعسل دی چرارت اور حدت ہو تو جلاب اور شربت بنفشہ استعال کریں۔ سخت در داور بے خوابی ہو تو شربت خشخاش دیں۔

اخراج، مادہ شروع ہو گیا ہو تو شربت خشخاش استعال نہ کریں کیونکہ یہ مانع ہے پھر اس سلسلہ میں بیحد ردی ہے۔ جگر قلیل الحس ہو تا ہے۔ تنگی شفس اور بخار کے ساتھ پسلیوں کے اندر در دناک صد تک سخت چین بھی ہو تو یہ درد ذات الجنب کا ہوگا کیونکہ ورم سجد میں درد محض سخت ہوتا ہے۔ (مؤلف)

پلیوں کے مابین عضلات کے اندرورم حار ہو تومریض کودر دناک ٹیس محسوس ہوگی کیونکہ

یہاں نبض کی حرکت محسوس ہوتی ہے اگریہ ٹیس اور تڑپ زیادہ تیز ہوگی تو پیپ پڑے بغیر نہیں رہ علق لیکن ورم پسلیوں پر استر کرنے والی جعلی کے اندر ہو گاتو تڑپمحسوس نہ ہوگی کیو نکہ یہاں شریا نیس کشادہ ہوتی ہیں ،اور دبتی نہیں ہیں۔ (جالینوس)

ذات الجنب كاذب كی مخصوص علامت اس کے علاوہ اور پچھ نہیں ہے کہ کھانی نہیں ہوگ۔

تاہم چونکہ ایی صورت میں ذات الجنب صحیح بھی ہو سکتا ہے، جو پختہ نہیں ہو تااس لئے کھانی نہیں

ہوتی۔اس لئے بقیہ تمام علامات کود کچھ کر فیصلہ کرناچاہئے بعنی پسلیوں پر دبا کراور دیگر نہ کورہ علامات

کے ذریعہ پچپان کرلیں۔ دوسرے یہ کہ ذات الجنب کامر خن شدت اعراض میں مساوی نہیں ہو تا۔

کہیں بیحد سخت بخار ہو تا ہے کہیں شدت کی چین ہوتی ہے بخار کم ہو تا ہے کسی میں کھانسی سخت ہوتی

ہے۔لہذاضروری ہے کہ شدت اعراض کود کھے کر مرض کے مقابلہ کے لئے دلیل فراہم کریں۔ پچھ حالتوں میں طاقت گری ہوئی ہوتی ہے لہذادن میں کئی بار تھوڑی تھوڑی غذادیے کی ضرورت ہوتی ہے۔اس طرح پر کہ اخراج مادہ میں دشواری پیدانہ ہوسکے۔(جالینوس)

مادہ خارج ہور ہاہو توذات الجنب کا بھروسہ طاقت پر ہو تاہے۔ طاقت کمزور ہوگی تومریض کچھ

بھی خارج نہ کر سکے گااور مادہ پختہ ہو گا تواسکی وجہ ہے اس کا گلا گھٹ جائے گا۔

اس کی مثال ہم نے اپنے بھائی حامد بن عباس عامل میں دیکھی ہے۔ وہ پختہ مواد خارج کررہے سے۔ یہ شخص اصل میں کمزور اور خراب مزاج کا تھا۔ اطباء کو ایک زمانہ کے بعد ہی معلوم ہو سکا کہ اے ذات الجنب ہے۔ کیونکہ وہ در دمعدہ اور در دجگر کاشکار تھا۔ ذات الجنب کا علم ہوتے ہی انہوں نے دستور کے مطابق انجانے میں فصد کھول دی، چنانچہ وہ فوت ہو گیا۔ میں نے فصد نہ کھولنے کا مشورہ دیا تھا کیونکہ مجھے نبض بیحد کمزور نظر آئی تھی۔ اے فصد کی ضرورت شروع میں تھی۔ ورم پختہ اور اخراج مادہ کا وقت غذا بہونچانی ضروری تھی تاکہ طاقت میں اضافہ ہوتا۔ فصد کی ضرورت نظر تاکی علی تعلیم طاقت میں اضافہ ہوتا۔ فصد کی ضرورت نہ تھی کیونکہ مریض کی سلامتی اس وقت اس بات میں تھی کہ کشت سے مادہ کا اخراج ہوجو سخت طاقت کے بغیر ممکن نہ تھا۔ (مؤلف)

ذات الجنب میں سنجبین بالکل آخر میں دینی چاہئے کیونکہ اس وقت کھانسی کے اندر تحریک خلط کو توڑنااور اخراج مادہ مقصود ہوا کر تا ہے۔شر وع میں جہال تسکین کی ضرورت ہوتی ہے سنجبین نہیں دینی چاہئے کیونکہ یہ کھانسی کو تحریک دیتی ہے۔ (جالینوس)

# ساتوال باب

# ذات الجنب كے مريض كى فصد كھولنے كامناسب وفت

کیش نام کے آدمی کی فصد آٹھویں دن کھولی گئی اور بہ کثرت خون حسب ضرورت خارج کر دیا گیا چنانچہ در دمیں کمی ہو گئی۔ خشک کھانسی آنے لگی کھانسی کی ابتد استر تھویں دن ہوئی۔ (جالینوس) فصد کا وقت اس بیاری میں اس وقت تک ہے جب تک تنگی تنفس اور چیجن کا اندیشہ ہونہ ہی مادہ خارج ہوناشر وع ہوا ہو۔ (مؤلف)

اخراج منہ کے ذریعہ ہوگا۔ پیپ زیادہ ہواور طاقت کم تو مریض مادہ خارج نے گابلکہ گا گھٹ کر مرجائے گا۔ علامت بیے ہے کہ مریض پھوڑا پھٹنے کی علامت کے بعد پچھ بھی منہ سے خارج نہ کرے گا، شخس شخت سے سخت ہوگا۔ مواد کا اخراج ہوگا تو متواتر ہوگا، مریض مواد کی قئے بھی کرے گااور نج جائے گا ورنہ سل میں جتلا ہو جائے گا۔ علامت بیہ کہ رنگ سرخ، شخص مسلسل اور التھائی کیفیت ہوگی۔ بید فساد کی علامت ہے۔ جو پھیپوٹ کو لاحق ہوجائے گا۔ پھوڑا پھٹنے کے بعد اس طرح کی کوئی ہات رو نمانہ ہوبلکہ مادہ کا اخراج ہو، مریض افاقہ محسوس کرے، شخص میں کشادگی ہو، حرارت اور پیاس میں سکون ہوجائے تو مریض آفاقہ محسوس کرے، شخص میں کشادگی ہو، حرارت اور پیاس میں سکون ہوجائے تو مریض نے گا، پھیپوٹ کے اندر کوئی آفت پیدانہ ہوگی۔ (مؤلف)

سخت اور د شوار ذَات الجنب میں در دینجے سے پر د و شکم تک اور او پر سے ہنسلی کی ہڈی تک پہو پختا ہے اور ماؤف پسلیول کے اندر منتقل ہو کر محفوظ پسلیول تک جاتا ہے۔ (اغلوقن)

تنگی تنفس، تڑپ اور چیبن میں جتنی شدت ہوای قدر فصد کا قصد کریں اور یہ باتیں جس قدر کم ہوں نیز بخار کی التھابی شدت موجود ہو تو فصد ہے ای قدر گریز کریں۔التھابی بخار جم ہے بہت ساری چیز ول کو تحلیل کر دیتا ہے اور طافت کو تیزی ہے زائل کر دیتا ہے۔شدید التھابی کیفیت موجود ہو تو پلانے کے لئے سب ہے عدہ چیز عناب، سپتال، اصل السوس ہے، انہیں جوش دیکر صبح ہو تو پلا عُیں۔اس کے بعد صبح میں ماءالشعیر دیں۔ حرارت ہواس میں انجیر شامل کر دیں۔ اس کے ساتھ مربی بنفشہ دیں۔ دست آ جائے تورات میں خیار شہر ،سپستال، یارب السوس کے جوشاندہ میں ملاکر دیں۔ مربی خیار شہر ،سپستال، یارب السوس کے جوشاندہ میں ملاکر دیں۔ مربی ضرورت محسوس کریں تو بنفشہ ، اصل السوس ، خیار شہر اور تر مجبین لیں۔ بنفشہ اور اصل السوس کو جوش دیکر اس میں بقیہ دونول دواؤل کو ملاکر استعال کریں۔ یہ نہایت عمدہ نسخہ ہے۔اس السوس کو جوش دیکر اس خیار شخہ ہے۔اس السوس کو جوش دیکر اس خیار ہے۔

نىخە:

اصل السوس ۳۵ گرام ، بغضہ ساڑھے ستر ہ گرام ، ۱۸۰۰ گرام پانی میں اتنا جوش دیں کد ۲۰۰۰ گرام رہ جائے۔ پھر اس میں فلوس خیار شبز ساڑھے چو ہیں گرام ، اور تر نجیین ۳۵ ساگر ام ملا کر پلائیں۔
ضرورت ہو تواس میں تربد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ (مؤلف)
ورم جگر کی جامع علامات جو کسی حال میں الگ نہیں ہو تیں۔
در د ہو جھل فتم کا۔ بعض لین ، زبان کارنگ تھوڑے عرصہ کے بعد بدل جاتا ہے۔ ذات البحب

میں چھن کادر د، نبض صلب، تھوڑے عرصہ کے بعد مادہ کااخراج، کھانی بڑھ جاتی ہے۔ (جالینوس)
دونوں بیاریوں کے اندر منگی تنفس ایک جیسی ہوتی نہ کھانی، نہ پسلیوں کے پنچ ہونے والا
درد۔ گویہ ساری علامات دونوں کی مشتر ک میں۔ ضیق النفس ذات الجنب میں زیادہ سخت ہوتا ہے۔
نصف یوم یاا یک یوم کے اندر بڑھ جاتا ہے حتی کہ سابقہ حالت ہے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے مگرور م جگر
بحالہ قائم رھتا ہے۔ بڑھتا بھی ہے تو تھوڑا تھوڑا، کھانی بھی ای طرح زیادہ سخت ہوتی ہے، تیزی
سے ابھرتی ہواور مادہ کے اخراج کا باعث ہوتی ہے۔ یہ با تیں درم جگر میں نہیں ملتیں۔ درد بھی تھوڑا
ہوتا ہے اس لئے اشتباہ ختم ہوجاتا ہے، بایں چھن کا ہوتا ہے۔ ذات الجنب کا انتیاز یہ ہے کہ دبانے پر
درد ہوگا، درد جگر میں الیا نہیں ہوتا ہے، بایں چھن کا ہوتا ہے۔ ذات الجنب کا انتیاز یہ ہے کہ دبانے پر
مؤلف نہیں ہوتی ہے۔ (مؤلف)

## شوصه كى جارفتمين بين:

ا۔ پیلیوں پر استر کرنے والی جھلی میں ورم پیدا ہو جائے۔ اس بیاری کو ذات الجنب خالص کہتے
ہیں۔ اس میں چیھن کا در د، صلب اور منشاری نبض اور تیز بخار لاز مار ہتا ہے۔ ۲۔ داخلی عضلات میں
ورم آ جائے۔ ۳۔ خارجی عضلات متورم ہو جائیں۔ ان دونوں قسموں میں ترثب ہوتی ہے، یہ ترب
اگر سانس اندر داخل کرتے وقت ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ بیاری ان بیر ونی عضلات کے اندر
ہو جو سینہ کو پھیلاتے ہیں اور اگر ترثب سانس باہر نکالنے کے وقت ہوتی ہے تو بیاری سینہ کو سکوڑنے
والے عضلات کے اندر ہوگی۔ ۳۔ وہ عضلات متورم ہو جائیں جن کا مقام پسلیوں سے باہر کا ہے۔
اس کے ساتھ جلد بھی متورم ہو جاتی ہے۔ چھونے پر ورم محسوس ہوگا۔ (جالینوس)
اس کے ساتھ جلد بھی متورم ہو جاتی ہے۔ چھونے پر ورم محسوس ہوگا۔ (جالینوس)
اور ورم جگر کے مابین امتیاز کریں۔ ورم جگر کا تذکرہ تو بار باہو چکا ہے ذات الرئے میں در د پسلیوں میں
نبیں وسط میں ہو تا ہے، چیھن نہیں ہو جھ محسوس ہو تا ہے تبغن بیحد کمز ور تنفس سے خارج ہونے والی
ہواگر م، ذات الجنب میں مجھی سر د ہوتی ہے مگر بہت کم، ر خیار کی ہڈیاں سرخ ہوتی ہیں، مریض سر د

ہوا کا خواہشند ہوتا ہے بالخصوص جبکہ ورم میں سرخی زیادہ ہوئی ہے۔ ساتھ خارج ہونے والا مادہ

بالعموم بدلا ہوا ہو تاہے، البتہ ذات الجنب کے مقابلہ میں کم ہو تاہے۔ درد سینہ کی گہرائی ہے شروع

ہو کر عظم القس کے گوشہ اور بہال سے عظم الصلب کے گوشہ تک پہو نچتا ہے۔ بخار ہو تا ہے، نبض

موجی چلتی ہے۔ذات الجنب کی نبض صلب اور منشاری ہوتی ہے۔ورم حجاب کواسی فرق سے معلوم کریں

کہ اس میں پردہ مراق اوپر کو تھنچ اٹھتا ہے۔ ذھنی فساد اور اعراض کے اندر شدت ہوتی ہے۔ سینہ پھیاتا ہوتے درد تیز ہوجا تا ہے۔ دردای گوشہ کے اندر ہو تا ہے۔ مذکورہ بالا امور کے در میان فرق کرتے ہوئے ذات الجنب کی مختلف قسموں کے در میان بھی فرق کریں۔ ذات الجنب میں خارج ہونے والے مادہ پر بالعموم جالینوس کے مطابق صفر اویت اور ذات الرئہ میں بلغمیت غالب ہوتی ہے۔ (مؤلف)

درد کم ہو، ذات الجنب کے اعراض تھوڑے ملتے ہوں، خارج ہونے والا مادہ دموی ہوتو فصد کی ضروری نہیں ہوتی۔ بقیہ دوسرے علاجوں پراکتفاکریں۔ ذات الجنب میں صفراء کو غالب دیکھیں تو فصد نہ کھولیں ای طرح وقت سخت گرم ہوتو بھی فصدے اجتناب کریں۔ (جالینوس)

اس کی علامت یہ ہے کہ بخار میں شدت، پیشاب میں سوزش، جسم میں خشکی اور ہذیانی کیفیت طاری ہوگی۔ان حالات کے اندر فصد نہ کھولیں۔ورنہ اخلاط میں خرابی جسم کے خشک ہو جانے ہے بڑھ جائے گی۔ذات الجنب زیادہ تر برف کا پانی چنے اور طاقتور خالص شراب کے مسلسل استعال ہے اور سر دملکوں کے اندر ہو تا ہے۔(مؤلف)

بیاری جب پختہ ہوجائے تو غذائی طاقت بہونچانا لازم ہے۔ غذائے اندرا تنااضافہ کریں کہ اخراج کے ذریعہ بیارا پناتیقیہ کر سکے۔ غذاہے سطیہ کے لئے مدد ملتی ہے۔ ذات الجنب میں مرطب اور اعتدال کے ساتھ قطع مادہ کرنے والی چیز ول کا استعال ضروری ہے تاکہ اخراج مادہ میں آسانی ہواس کے بعد طاقت کو بڑھا میں تاکہ مرکیض موادے خود کو صاف کرے۔ یہ دونوں خوبیال ماء الشعیر کے اندر بچاہیں۔ البتہ ماء العسل ترطیب اور قطع کرنے میں اور ماء الشعیر تقویت بہونچانے میں مؤثر دول اواکرتے ہیں۔ ذات الجنب میں نفاخ چیز ول سے پر ہیز کریں بالحضوص جبکہ طبیعت کے اندر خشکی ہو، اواکرتے ہیں۔ ذات الجنب میں نفاخ چیز ول سے پر ہیز کریں بالحضوص جبکہ طبیعت کے اندر خشکی ہو، کیونکہ غذاکی وجہ سے نفخ پیدا ہو جائے گا اور خشک فضلہ ریاح کو نیچے آنے ہو والے گا۔ من می کا انتظامی غذا کی جب نہونچا میں کیونکہ اس وقت سینہ کے اندر سختی ہوتی ہے۔ علامت یہ ہے کہ درد میں شدت اور شاسل ہو تاہے، لہذا اس وقت سینہ کے اندر سختی ہوتی ہے۔ علامت یہ ہے کہ درد میں شدت اور دیں۔ میاس ہو تاہے، لہذا اس وقت مریض کو غذانہ دیں۔ پیاس تیز ہو تو جلاب اور سختین شخشہ اگر کے دیں۔ میکن نہ ہوتو سر دیائی دیں۔ مریض کو غذانہ دیں۔ پیاس تیز ہو تو جلاب اور سختین شخشہ اگر ہوگا، تنظم میں کوئل حرج نہیں ہے کیونکہ ورم تک بہو خچتے بہو نچتے یہ موجائے گا۔ ویائیوس کوئل حرج نہیں ہے کیونکہ ورم تک بہو خچتے بہو نچتے یہ موجائے گا۔

## در د ذات الجنب كيليّ ضاد كانسخه:

اشق،زوفائے تر، نتمع، آبخورے کا میل، بکری کی مینگنی، جادشیر ، بارزد، کندر، بیہ ضادر کھ کر د یکھیں۔ مقام سرخ ہوجائے تو پھر اس پرایک گھنٹہ کے مزید ر کھدیں اور اس بار اس کے اندر بیٹ کبوتر، نظر ول اور کبریت شامل ہو (بقراط)

## شوصہ کے لئے ضاد کا نسخہ۔

بنشفہ، سبوس حوارتی، آردجو چھانا ہوا، آرد با گلی، خطمی، بابونہ، ناخونہ، ہم وزن۔ ریشمی کپڑے سے چھان کر یکجا کریں پھر موم اور روغن شرح میں ملا کر ضاد کریں۔ نفج کی ضرورت ہو تو اس میں کرنب نبطی، انجیر، حلبہ اور مختم کتان کا اضافہ کر دیا جائے۔ (قرابادین قدیم)

ذات الجنب اور ذات الرئه سب سے کمزور وہ ہو تا ہے جس میں بذریعہ منہ اخراج مادہ نہیں ہو تا۔(جالینوس)

جالینوس نے ایک دوسری جگہ کہا ہے "اخراج مادہ جھی رک جاتا ہے گر ایسامادہ کے خراب اور دشوار ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ لہذادونوں حالتوں کے در میان فرق واقبیاز قائم کریں۔ عدم اخراج یا قلت اخراج کے ساتھ بیاری ہو تونہ بخار ہوگا، نہ سخت تنگئ تنفس، نہ چیجن وغیرہ۔ مریض کو بیاری کی پرواہ نہ ہوگی۔ ایک وقت اس پر ایسا بھی آچکا ہوتا ہے کہ بیاری اس کے نزدیک پچھ نہ تھی کیونکہ یہ ابتدائی مرحلہ میں تھی۔ یہ حالت بیاری کے ملکے ہونے کے باعث تھی۔ بیکس صورت برکس حالت پیداکرتی ہے۔

حسن الحميد كوذات الجنب كى بيارى تقى، بيارى اگيار ہويں دن ميں داخل ہو چكى تقى۔ آئكھيں پھر اگئى تھيں۔ ہاتھ پر برف كى طرح سر دہتے۔ نبض بمشكل ظاہر ہوتى تقی۔ تھوك كے چپنے سے تنفس متواتر ہو چكا تھا۔ گر عقل بالكل صحيح تقی۔ اى دن اس كى موت واقع ہو گئے۔ لہذا توجہ بميشہ طبيعی اور حيوانی طاقتوں پر زيادہ رکھيں۔ نيز خاص طور پر عضوماؤف كو نگاہ ميں رکھيں۔ تنفس كا حال بيہ ہو كدر طوبت كے ساتھ سخت متواتر ہو جائے تو ہر گھڑى چپكاؤ ميں اضافہ ہوگا۔ رطوبت كے زيادہ ہونے كى علامت بيہ ہے كہ ہر گھڑى چپكاؤ بيدا ہوگا۔ تنفس كے لئے اس كا دفع ہونا مشكل ہوگا۔ چنانچہ اس كى علامت بيہ ہے كہ ہر گھڑى چپكاؤ بيدا ہوگا۔ تنفس كے لئے اس كا دفع ہونا مشكل ہوگا۔ چنانچہ اس كى علامت بيہ ہے كہ ہر گھڑى چپكاؤ بيدا ہوگا۔ تنفس كے لئے اس كا دفع ہونا مشكل ہوگا۔ چنانچہ اس كى علامت بيہ ہے كہ ہر گھڑى چپكاؤ بيدا ہوگا۔ (مؤلف)

## عمل کے لئے باب ذات الجحب كاجمله حسب ذيل ہے:

درد ہو، چیمن ہو، اور بخار کمزور ہو تو مسہل دیں ، الابیہ کہ اس کی ضرورت نہ ہو۔ فصد کی ضرورت نہ ہو۔ فصد کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ در داگر نچلے گوشہ کے اندر ہوتو مسہل دیں، بالائی گوشہ میں ہوتو فصد کھولیں۔ تکمید سے درد تیز ہوجائے تو فصد بھی کھولیں اور مسہل بھی دیں۔ اخراج مادہ خراب ہے یا عمدہ ہے، بخاروں میں شدت ہے، ان سب کا جائزہ لیں ماء الشعیر دینے سے پہلے ایسی دوادیں جس سے اخراج مادہ میں آسانی ہو۔ ذات الجنب خالص نہ ہوتو ہی نے لگائیں۔ یہ ہے جملہ حاصل۔ (مؤلف)

ذات البحب میں در دہنی تک جا پہو پختا ہے تواس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پسلیوں پر استر کرنے والی جھلی ہنسلی تک پہو پختی ہے۔ در داگر پسلیوں کے سروں کے نیچے ہور ہا ہو تواس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں جھلی تجاب پر پڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ سانس کی حرکت کے وقت یہ محسوس ہوتی ہے کیونکہ سانس لینے سے تجاب حرکت میں آتا ہے۔ در دہنسلی کے پاس اس لئے ہوتا ہے کہ اپنی صلابت کے باعث بنسلی کی ہڑی، پسلیوں پر استر کرنے والی جھلی کو تکلیف پہونچاتی ہے۔ ورم جگر میں بنسلی کے اندر در ہوتو کیفیت ہمیشہ دائنی بنسلی میں ہوتی ہے۔ ایسا ورید اجوف کے تناؤے ہوتا ہے نہ کہ جھلیوں کے تناؤے۔ والی جھلیوں کے تناؤے۔ دات الرید میں مادہ پر ہمیشہ بلغمیت غالب ہوتی ہے۔ ذات الجوب میں مرادیت (صفراویت) کا غلبہ ہوتا ہے۔ (جالینوس)

حدت اور حرارت میں دونول بیاریال مساوی ہول توابیا ہوتا ہے۔ ذات الجنب میں سنگی نفس ملتی ہے۔ (مؤلف)

وضای نام کے ایک محف کو شوصہ ہو گیا۔ اس کی فصد نہیں کھولی گئے۔ صاور کھا گیا چنانچہ در د بیں سکون ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد دن بیں کئی باراہے جوڑی بخار آنے لگا، بخاراس کے بعد موجود رہا۔ بیں نے بخار کی جانب توجہ نہیں دی کیونکہ بجھے معلوم تھا کہ بخار کیوں ہے۔ بیں نے اپنی تمام تر توجہ مریض کو قوت پہونچانے پر صرف کی کیونکہ بجھے معلوم تھا کہ جلد ہی وہ پیپ کا اخراج کرے گا۔ اے طاقتور قوت کی ضرورت ہے تاکہ تنقیہ کر سکے۔ چنانچہ اے روئی اور بھیڑ کا گوشت معتدل مقدار بیں کھلایا۔ چنانچہ وہی ہواجو میر ااندازہ تھا۔ دیگر اطباء کا خیال تھا کہ بخارایک اور بیاری ہے لہذا تدبیر بیں طافت اختیار کرنا چاہئے۔ ایسا کیا گیا ہو تا تو بجھے مریض کے مرجانے کا اندیشہ ہو تا کیونکہ اس کی طافت اخراج پیپ تک گر جاتی۔ بخار اور جوڑی کی وجہ یہ تھی کہ پھوڑا پکناشر وع ہو گیا تھا۔ پیپ بنے کا کام مکمل ہوا تو در دے اندر سکون ہو گیا۔ مزید یقین اس لئے بھی ہو گیا کہ اس کے بعد اصلاً بخار نہیں آیا۔ اے سخت بخار، بے خوابی اور ذات الجنب کے اعراض لاحق تھے۔ اس کے بعد سب بیں سکون ہو گیا۔ پھر کوئی ایسی تدبیر بھی نہیں کی گئی جس ہے کوئی اور بخار آجاتا۔ بخار آگیا تو معلوم ہوا کہ بات ہو گیا۔ پھر کوئی ایسی تدبیر بھی نہیں کی گئی جس ہے کوئی اور بخار آجاتا۔ بخار آگیا تو معلوم ہوا کہ بات

وہی صحیح تھی جس کامیں تذکرہ کرچکا ہوں۔ فصد نہیں کھولی جاتی ہے تو بھے زیادہ تر ہوتا ہے۔ شوصہ سخت ہو توضادے در دہوتا ہے۔ (مؤلف)

حمام کے باب میں بقر اطاکا قول ہے۔ شوصہ کے مریضوں کو جمام سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے در دمیں سکون اور اخراج مادہ میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے ذات الرئے کے مریض زیادہ فائدہ شخاتے ہیں اس بیاری میں جمام سے اخراج مادہ میں بیحد آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ماء الشعیر کے اندر شہد کی شمولیت زیادہ ہونی چاہئے بشر طیکہ مقصود سینہ کا تنقیہ ہو۔ یہاں شکر کا استعال زیادہ کیا جاتا ہے۔ اخراج مادہ میں آسانی کے لئے ترطیب پر اعتماد کریں۔ اس کا باقاعدہ اھمتام کریں کیونکہ خارج ہونے والے مادہ میں بیحذ شکی ہوگی تو زور دار کھانی ہی کے ذریعہ اس کا از الہ ہوسکے گا اس سے بعض نالیوں کے بھٹے کا اندیشہ ہے۔ (حنین)

شوصہ کی بیاری زیادہ خشک ہو توماءالشعیر سے پہلے جلاب دیں اور جس حد تک ممکن ہورطوبت پہونچائیں۔ماءالشعیر دیر تک پکادیا جائے تواس کے اندر سے نفخ کااثر جاتار ہتا ہے۔عمدہ طور پرنہ پکا ہو تو جس قدر پکا ہوگاای قدر نفخ پیدا کرے گا۔لہذا ذات الجنب میں بیحد مصر ہوگا۔ در داس سے بڑھ جائے گا۔ (جالینوس)

ذات الجنب میں تفض بیحد متواتر ہو تو لعوق اسپغول اور جلاب ہے مسلسل رطوبت پہونچاتے رہیں کیونکہ تفض کے متواتر ہونے سے سینہ کے اندر بیحد تشکی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے افراج مادہ رک جاتا ہے۔ تنفس صغیر یا پہلو میں شدید ور د ہو تو پہلو کی ہلکی مالش کریں، غیم گر م پانی کا نطول کریں تاکہ در د ہلکا ہو سکے اور اس طرح نفس کا تواتر جاتا رہے۔ تھوک کے لئی پیدا ہو تو امکائی صد تک رطوبت پہونچا کیں۔ صدت اور سخت پیاس کی وجہ سے ذات الجنب میں کوئی شخنڈی چیز پلانا چاہیں تو ہرودت میں وہی چیزیں پلا کی جن میں کچھ جلاء کی تاثیر بھی موجود ہو۔ مثلا آب خیار، آب فریزہ اور آب کا سی۔ آب کرفہ دیں کیونکہ بیحد کاشف ہے۔ افراج مادہ نہوں ہو رہا ہو تو مفید ہو تا ہے۔ رطوبت پہونچانے کے لئے ضروری ہے کہ مریض کوگر م پانی کا بھیارہ دیں، ہورہ ہو تا ہے۔ رطوبت پہونچانے کے لئے ضروری ہے کہ مریض کوگر م پانی کا بھیارہ دیں، ہورہ ہوتا کے اندر داخل کرنے کا حکم دیں اور اسے صاء دیں۔ اس سے افراج مادہ میں آسانی ہوتی ہوتی ہوتیا۔

، تھیدے وہ درد تخلیل ہوتے ہیں جن کامیلان نیچ کی جانب ہو تاہاس سے وہ درد کم تخلیل ہوتے ہیں جن کامیلان نیچ کی جانب ہو تاہاس سے وہ در در گاڑھے ہوتے ہیں جو اوپر کی جانب ربحان رکھتے ہیں کیونکہ ند کورہ بالا در دول کے مواد زیادہ گاڑھے ہوتے ہیں۔ فصد سے وہ درد زیادہ تخلیل ہوتے ہیں جو اوپر کی جانب ماکل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مادے

لطیف ہوتے ہیں۔ تھمید کی کثرت سے تفتیح ہوتی ہے۔ در دساکن نہ ہو تو تھمید زیادہ نہ کریں۔ ذات الجنب میں پیاس زیادہ ہو تو سلخبین استعال کریں۔ سکون ہو جائے تو فیھاور نہ خالص پانی دیں۔ پانی تھوڑا تھوڑا یکبارگی زیادہ نہ دیں۔ (جالینوس)

برسام کے مریض کو گرم پانی کئی بار جرعہ جرعہ مسلسل دیں۔اس سے پیاس میں سکون ہو گا۔ مریض کوزیادہ پینے سے روک دیں۔(اسکندر)

اس طرز تعمل سے تھوک کے اندر کسی پیدا نہیں ہوتی۔اخراج مادہ میں آسانی ہوتی ہے اور مادہ پختہ ہو تاہے۔(مؤلف)

جوامع اغلو قن میں حسب ذیل بیان نظر ہے گذر اہے۔ خارج ہونے والے مادہ کی پختگی کو دوباتوں ہے جانچیں۔ ا۔ اجزاء میں مساوی ہونا، ۲۔ قوام میں اعتدال۔ چکنا پورے امتلاء کے اندر برابر تئم کااور پتلے پن اور گاڑھے پن میں معتدل مادہ ہی پختہ ہواکر تا ہے۔ رنگ ہے مادہ کی خرابی اور عمد گی کا پیتہ چلنا ہے اور پچھ نہیں۔ ند کورہ وصف سفیدرنگ کے ہمراہ ہو تو یہ بیحد سلامتی کی دلیل ہے۔ مگر سیاہ رنگ لئے ہوئے ہو تو مہلک ہے۔ زر درنگ ہو تواس ہے کم ترہے۔ سرخ رنگ ہو تو سلامتی میں سفیدرنگ ہو تو سلامتی نہ ہوا ہو تو ہو اخراج میں پیپ پڑنے کا علم اس طرح ہوگا کہ بیاری میں مادہ کا اخراج میں سفیدرنگ ہو وجو دہو۔ (مؤلف) نہ ہوا ہو، بخار نہ ہو، زیادہ اخراج مادہ بھی نہ ہواور درد بھی ہو، پہلو میں بوجھ موجو دہو۔ (مؤلف)

شراب پلانے سے چیمن اور استحابی کیفیت میں سکون ہر گزنہ ہوگالہذااس بیاری کے اندر جبکہ چیمن اور التحابی کیفیت موجو د ہوشر اب ہر گزنہ پلائیں کیونکہ ایساکرنا جائز نہیں ہے۔ (شفاخانہ کے تجربات)

کشمی ڈکار والوں کو ذات الجنب تقریباً نہیں ہو تا کیو نکہ بلغمی حضرات تو بالعموم ذات الجنب کی شکایت نہیں ہواکر تی۔(جالینوس)

میں نے جانچ کر دیکھاہے کہ صفر اوی یاد موی حضرات کوید شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ (مؤلف)

## ذات الجنب كے در د كوسكون دينے والا ضاد:

بابونہ، شبت، مخم کتال، آر دجو، خطمی، سبوس، آر دھلہ۔ حرارت زیادہ نہ ہو توسب کو پانی میں اتناجوش دیں کہ دوائیں میں ہوٹ جائیں۔ اس کے بعد شیر ج میں ضبیص بناکر نیم گرم صاد کریں۔ کسی وقت زیادہ تحلیل کی ضرورت محسوس کریں اور ممکن بھی ہو کرنب شامل کر دیں۔ اس سے بھی زیادہ اثر مطلوب ہو تو خاکستر کرنب اور چربی شامل کریں۔ جالینوس کا قول ہے کہ خاکستر کرنب جب بھی

پرانی چربی کے ساتھ شامل کر کے استعمال کی جائے گی پسلیوں کامز من در دجا تارہے گاکیونکہ اس کے اندر تحلیل کی زبر دست قوت ہے۔ (مؤلف)

میرے خیال میں مراد گھی نہیں بالائی ہے۔ آر د جو ناخونہ اور پوست خشخاش کے ساتھ استعال کرنے سے پہلو کے درد میں سکون ہو تاہے۔(دیاستوریدوس)

میرے خیال میں خردل کا صاد جب پیپ پڑنے کا اندیشہ ہوتو بیحد مفید ہے کیونکہ یہ خلط کو ہاہر کی جانب خارج کر تا ہے۔اسے اس حد تک ہاتی رکھا جائے کہ چھالے پڑجائیں۔(مؤلف) بخار تھوڑا ٹوٹ جائے تو شوصہ کے مریض کو اس کی تمام غذائیں دیں۔روٹی ہالائی اور سکر طبر زد کے ساتھ دیں۔اس سے پختگی میں مدد ملتی ہے اور مادہ تیزی سے خارج ہوتا ہے۔(خوز)

## بقر اط اور افلاطون کے نظریات سے:

ذات الجنب کے مریض کے بارے میں بقراط نے تھم دیا ہے کہ پہلو میں درد کا احساس شروع ہوتے ہی سب سے پہلا علاج ہے کریں کہ تھمید اور گرمی پہونچانے کے بعد بھاری کی نوعیت معلوم کریں۔ اس سے اگر بھاری ٹوٹ جاتی ہے تو فیھا ورنہ پھر یہ غور کریں گے کہ درد کھانے کے بعد فور اُشروع ہوا ہے یا خالی پیٹ شروع ہوا ہے۔ نیز ساتھ میں دست آرہ ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ فصد کی ضرورت ہے یا مسہل کی۔ پچھ مریض ایسے ہول گے جنھیں ماءالشعیر یاجو کی دلیہ اور پچھا ایسے ہول گے جنھیں ماءالشعیر یاجو کی دلیہ اور پچھا ایسے ہول گے جنھیں ماءالشعیر یاجو گ

میرے خیال میں تکمید کی ضرورت اسی وقت ہے جب در دھے کھانسی ہونہ مثلًا تنفس۔ (مؤلف)

کتاب البحر ان وغیر ہیں جالینوس کی جو گفتگو درج ہے اس سے حسب ذیل وضاحت ملتی ہے: ''خارج ہونے والامادہ ذات الجنب کے اندر مائل بہ سیابی ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔اس سے غلبہ حرارت اور اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خون بیجد جل چکا ہے (مؤلف)

ابيذيمياس حب ذيل بيان إ-:

ذات الجنب ختک کے اندر حمام ، نطول ، ضاد ، دلک اور غذاء ، وہ تمام چیزیں استعال کی جا کیں جو اعتدال کے حائدر حمام ، نطول ، ضاد ، دلک اور غذاء ، وہ تمام چیزیں استعال کی جا کیں جو اعتدال کے ساتھ گرمی پہونچاتی ہیں۔ یہ طرز عمل وہاں اختیار کریں جہاں حرارت ہو گرر طوبت زیادہ اور حرارت کم ہو ۔ یہی طرز عمل ان نزلوں کے اندر بھی اختیار کریں جن کا پختہ ہونا مشکل ہو گیا ہواور کھانسی آہت آتی ہو۔ (مؤلف)

سینہ اور پھیپے رہے کی بیاریوں میں مواد کا پختہ ہو نااور بیشاب میں اس کی علامات تلاش کریں۔
بیاری سے گلوخلاصی کی بیہ نہایت زبر دست علامت ہے۔ ایک شخص ایسا ہی ذات الجنب کامریض تھا۔
اگیار ہوں دن تک وہ کوئی مادہ خارج نہ کر سکا تھا۔ بار ہویں دن اس کی فصد کھولی گئے۔ ان جانوروں کی
طرح نہیں جو تھم دیا کرتے ہیں کہ چو تھے دن فصد کھولی جائے۔ (جالینوس)

يه اصلاحی قدم ب\_ (مؤلف)

ذات الجنب شدید کھانسی ہے مریض کو بچائیں۔اس ہے بھی کو بی رگ بچے جاتی ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے۔ذات الجنب اور نفث دو نول متضاد بیاریاں ہیں کیو نکہ ایک میں اوپر چڑھنے والے مادہ کی رکاوٹ کی جاتی ہے اور دوسرے میں اس مادے کے اندر آسانی لائی جاتی ہے۔لہذا الحذر سینہ پر نطول کریں نہ ملکے طور پر اس کی مالش کریں۔ذات الجنب میں جن کی فصد نہیں کھولی جا سمتی ہوا نہیں گرم پانی جرعہ جرعہ سلسل دیں،خارج ہونے والا مادہ جس مریض کا سرخیا سفید ہو، درد تھوڑا، اعراض میں سکون ہو،وہ وہ مسہل،ماء الشعیر اور پر ہیزہے صحتیاب ہو جائے گا۔ (جالینوس)

خالص کھانسی ورم تمہد کے متیجہ میں پیدا ہوتی ہے۔ جن کھانسیوں میں مریض کو سکون ہوتا ہے وہ چھوٹی اور باہم مختلف کھانسیاں ہوتی ہیں، دو کھانسیوں کے در میان لمباوقفہ ہوتا ہے اور وہ سب ختک ہوتی ہے۔(جالینوس)

> ذات الجنب کی کھانسیاں صلب اور تواتر میں میش از میش ہوتی ہیں۔ (مؤلف) تاریخ

ہم نے تمہیں ذات الجنب میں کی نوجوان کی فصد کھولتے دیکھاہے گرنہ تمہیں نہ دوسرول کو کسی عمر دراز اور بیچے کو جو ذات الجنب کامریش رہا ہو اور ماؤف پہلو پر سو تارہا ہو تو زیادہ کھانتا اور مادہ خارج کر تارہا ہو فصد کھولتے نہیں دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ پھیچرہ موجود خلط سے چیک جاتا ہے۔ مریض اسی پر ٹھیک لگاتا ہے تو زیادہ سوزش ہوتی ہے۔ شفیہ مطلوب ہو تو ایسا کریں کیونکہ حیلہ الرء کے پانچویں مقالہ کے اندر جالینوس لکھتا ہے کہ "سینہ کے متعقن پھوڑ ول کے اندر جب ہم ماء العسل کی پیچاری کرتے ہیں تو مریض کو ماؤف پہلو پر لیننے اور کھانے کا حکم دیتے ہیں۔ کہی ہم اسے آہتہ کی پیچاری کرتے ہیں تو مریض کو ماؤف پہلو پر لیننے اور کھانے کا حکم دیتے ہیں۔ کہی ہم اسے آہتہ

ے ہلا بھی دیتے ہیں۔ بعض او قات آلہ ُ جاذبۃ القیح کے ذریعہ اس ماءالعسل کوچوس لیاجا تا ہے جے ہم مریض کے اندر داخل کر چکے ہوتے ہیں ''۔ (مؤلف)

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیپ کو دھونے واالے ماءالعسل کا تھوڑا باتی ماندہ حصہ جے چوسے

"آلہ جاذبیۃ القیح" عاجزرہ گیا ہو جب رہ جاتا تھا تو جالینوس مریض کو اس پہلوسلاتا، ہلاتا، اور کھانسے
پر مجبور کرتا تھا تا۔ کہ پھیپھڑے کے اندروہ جلد پہونج کراوپر چڑھ جائے۔ ہیں نے کئی مریضوں کو جو
ذات الجنب اور نفث الدم کے مریض تھے دیکھا ہے کہ جب تکلیف دہ پہلو کے بل سوئے تو کھانسی
انمیس زیادہ آئی۔ (مؤلف)

## ذات الجنب اور ورم حبد كافرق:

جگر کے مریض کارنگ خراب اور ذات الجنب کے مریض کارنگ نہایت عمدہ، اور خون الحجی طرح نمایاں ہوتا ہے۔ مریض جگر کا بول گاڑھا استنقاء کے مریضوں کے پیشاب کی جانب ماکل ہوتا ہے۔ ذات الجنب کے مریض کا پیشاب پختہ اور صحت کی راہوں ہے منحرف نہیں ہوتا۔ ذات الجنب میں ہڈی تھنچ المحتی ہے تاکہ ورم کو جھلی کے بالائی اجزاء کی جانب ماکل کر دے۔ ورم جگر میں ورید اجوف یعنی قیضال کا شعبہ عظمی ترقوہ (ہنلی کی ہڈی) ہے متصل ہوتا ہے۔ ورم کے ثقل سے میں ورید اجوف یعنی قیضال کا شعبہ عظمی ترقوہ (ہنلی کی ہڈی) ہے متصل ہوتا ہے۔ ورم کے ثقل ہے ترقوہ اس کے بڑھی ہوئی حالت کے اندریہ کیفیت ملتی ہے۔ (مؤلف)

ذات الجنب میں ایک نوجوان کا بخار از گیا گر حقی غل بعد از ال پیپ پڑنے کی علامات ظاہر ہوئیں۔ اور وہ پیپ تھو کئے لگا۔ ہم نے اے ایک ایس دوادی جس سے اخراج مادہ میں آسانی ہوئی۔ چنانچہ ایک یادو کھانسی سے پیپ بہ آسانی اس قدر خارج ہوئی کہ ایک تسلہ بھر گیا حتی کہ مجھے خیال آنے لگا کہ آخر پیپ کا یہ معاملہ کیا ہے۔ روزاند ایک یاد وبارای مقدار میں پیپ خارج ہوتی رہی۔ خیال آنے لگا کہ آخر پیپ کا یہ معاملہ کیا ہے۔ روزاند ایک یاد وبارای مقدار میں پیپ خارج ہوتی رہی۔ اس کے بعد کھانسی میں بالکل سکون ہوگیانو جوان کا سینہ صاف ہوگیااور بیاری سے نجات مل گئے۔ در کورہ دیگر مریضوں کو بھی دیکھا جن کے مادہ کا اخراج نہ ہوسکا تو سب کے سب مر گئے۔ فد کورہ نوجوان سے پیپ کی مقدار اندازہ کے مطابق دس کلوگر ام خارج ہوئی۔ جالینوس نے لکھا ہے کہ ذات نوجوان سے پیپ کی مقدار اندازہ کے مطابق دس کلوگر ام خارج ہوئی۔ جالینوس نے لکھا ہے کہ ذات الجنب کے مریض روزانہ ۲ سے کہ قوطول پیپ خارج کرتے ہیں۔ ایک قوطول ۹ اوقیہ (۱) کا ہوتا ہے۔ (مؤلف)

ذات الجنب مين مخدرادويه صرف حس كوسن كرتى بين \_ (جالينوس)

(١) ايك اوتي =33.33 كرام

اس گفتگو سے بیہ اشارہ مقصود ہے کہ کچھ لوگ مخد رات استعمال کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے کیو نکہ مخد رات کو دینے میں تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔وہ اس طرح پر دی جاتی ہیں کہ اگر تکلیف دہ چیز باتی بھی رہ جائے تو مخد رات نقصان دہ نہ ہو سکیں۔البتہ جہال تکلیف دہ چیز کا رہنا خطر ناک ہے وہال اس کا استعمال روا نہیں ہے۔ علاوہ ازیں بید دوا نمیں مادہ کے اخراج اور پختہ ہوئے کوروکتی بھی ہیں۔جالینوس نے کہا ہے کہ فر اسیون اور ایر ساسے بنی ہوئی دوا ماء العسل کے ہمراہ مریض کوروکتی بھی ہیں۔جالینوس نے کہا ہے کہ فر اسیون اور ایر ساسے بنی ہوئی دوا ماء العسل کے ہمراہ مریض کودینے سینہ اور پھی پھر نے کی بیاریال عمدہ طور پر پکتی ہیں اور مادہ کا اخراج بہ آسانی ہوتا ہے۔

کودینے سے سینہ اور پھی پھر نے کی بیاریال عمدہ طور پر پکتی ہیں اور مادہ کا اخراج بہ آسانی ہوتا ہے۔

ایک شخص کوذات الجنب کی شکایت تھی۔مادہ کے افراج میں بیحد آسانی ہورہی تھی گر پیشاب
میں شدت کارنگ، نبض میں سرعت اور زبان میں کھر دراین تھا۔ سخت حرارت سلسل تھی۔ کم ہوتی
تھی نہ خشک ہوتی تھی۔چود ہویں دن اس کا انتقال ہو گیا۔ بخار کے اندر مؤثر تطفیہ نہ ہو سکا۔اس شخص
کی موت حمی محرقہ کی برولت واقع ہوئی تھی نہ کہ ذات الجنب کی وجہ ہے اس کے اندر ذات الجنب کا
بخار اور رگول کے اندر سخت تعفن سب مجتمع ہوگئے تھے۔ جب طاقت گری ہے تو گومادہ سہل الخروج
تھا گر مریض اس کا اخراج نہ کر سکا۔ مریض کی فصد مرض کے شروع میں کھول دی گئی تھی۔ یہ اور برا
ہوا تھا کیونکہ حمی محرقہ کو اس سے اور زیادہ تقویت بہونچی پھر مریض نحیف و کمزور اور صفر اوی مزاج کا
حامل تھا۔ ذات الجنب کے لئے یہ بات گو مفید ہوئی تھی گر دیگر حالات کے لئے تشویش کن ثابت
ہوئی۔اسے سہل دیا گیا ہو تا اور طاقتور مطفی دواسے کام لیا گیا ہو تا تو بی جاتا۔لہذا حمی ذات الجنب ک

تیز بخارول میں بھی رکھین مادہ کا اخراج ہونے لگتا ہے۔ یہ ذات الجنب یا ذات الرہ کی بیاریال نہیں ہو تا۔ تنفس میں نہیں ہو تیں۔ دونول میں فرق یہ ہے کہ تنفس اپنی طبعی حالت سے تبدیل نہیں ہو تا۔ تنفس میں تبدیلی اسوفت رو نما ہوتی ہے جب پھیپھڑے کی جانب تھوڑے ایسے اخلاط تھنچ کر چلے آتے ہیں جنمیں پھیپھڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کرکے خارج کر تارہتا ہے۔ یہ اخلاط کی بھی عضو سے تھنچ کر آتے ہیں، بھی سر سے اخراج ہوں اور بھی پچھ پھوڑا سینہ کے بالائی مقام پر ہو جاتا ہے ایسی صورت میں سوء تنفس نہیں ہوتا۔ نہی سینہ کے اندر در دہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں اخراج مادہ اپنی حالت میں رہتا ہے۔ (جالینوس) سرخ مادہ اس بات کی علامت ہے کہ در م دموی ہے، زر دصفر ادی ادر سفید بلغی درم کا پید دیتا ہے۔ (جالینوس)

. مادہ زرد ہو تو مسہل صفراء دینے اور شدت سے تطفد کرنے کار جمان رکھیں۔ سرخ ہو تو خون

نكالنے اور سفيد ہو تو تكميد كا اہتمام كريں۔ (مؤلف)

جالینوس لکھتاہے کہ آر دجو کوناخونہ اور پوست خشخاش کے ساتھ صادبنا کر استعمال کرنے ہے پہلو کے در دمیں سکون ہوجاتا ہے۔ بہتریہ ہے کہ بنفشہ ، محظمی ، ناخونہ ، پوست خشخاش ، آر دجو ، مخم کتال ، بابونہ ، حلبہ ، آر د با گلی ، پیہ ریچھ ، کر سنہ ، استعمال کریں ۔ یہ جیرت انگیز اثر رکھتا ہے۔ مجم کے یہاں یہ نسخہ معمول ہے۔ (مؤلف)

مسے نے شوصہ میں استعال کئے جانے والے صاد کے بہت سے تسخوں کاذکر کیا ہے ایک نسخہ وہ ہے جو گرمی پیدا کئے بغیر در دکو سکون دیتا ہے۔ یہ اسوفت استعال ہو تا ہے جبکہ شوصہ میں بخار تیز ہو تا ہے۔ ایک وہ ہے جو بخار کے ملکے اور تنگئ شنس کے تیز ہونے میں ستعمل ہے۔ دواؤل میں منصحات، ملنیات، گودے، چربیال اور مقل وغیرہ شامل ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ بھی سخت شوصہ بخار کے بغیر ہوتا ہے۔ اس میں صاد زفت، فلونیا، موم اور روغن نرگس سے بناکر استعمال کریں۔ (مؤلف)

مؤخر الذكر نسخہ ان مریضوں میں استعال کرنا چاہئے جن کی تنگی تنفس سخت، چیجن ،اور بخار فرم ہواور تشنج ہو گیا ہو۔ میرے خیال میں ان کے لئے مفیدیہ ہے کہ منضج ضادول کا تحصیں بھپارہ دیں۔اس کے بعداس نے محلل صادول کا جن کے اندر ملنیات شامل ہوتی ہیں تذکرہ کیا ہے یعنی آرد فرمس،انجیراور حلبہ کاجوشاندہ۔بعدازال حب الغار، قطران، رشق کے صادول کاذکر کرتے ہوئے کیا ہے کہ یہ مز من اور سر دور دول کے لئے مفید ہیں۔(مؤلف)

# پہلوپر سخت چوٹ پڑنے کیلئے نسخہ:

خیار شتر ،روغن بادام،عرق کاسی کے ہمراہ۔(خوز)

ذات البحب كے مریض كے لئے سر دیانی بیحد نقصان دہ ہے۔ بھی اس مقام پر غلیظ ریاح تو بر تو اکتھا ہو کر ذات البحب كاشبہ بیدا کر دیتی ہیں۔ تکمید ہے یہ تحلیل ہو جائیں گ۔ ذات البحب فالص كے لئے علک البطم كر گرام، روغن بنفشہ ۱۳۳ گرام میں حل کر كے پہلو كی مالش کریں۔ یہ بیحد گرم دوا ہے۔ تکمید كے وقت ایک د ججی پراہے بھیر کرہا ندہ دینے ہے در دمیں فور أافاقہ ہو جاتا ہے۔ کمید کے وقت ایک د ججی پراہے بھیر کرہا ندہ دینے ہے در دمیں فور أافاقہ ہو جاتا ہے۔ (مخت بیثوع)

شوصہ کے مریض کو شراب ابیض الحجی طرح (Mixed) کی ہوئی پلائیں۔شوصہ کی تین قشمیں ہیں۔

ا۔ ساتھ میں جوڑی ہواور خارج ہونے والاماد ہمائل بہ زر دی سفید ہو۔

۲۔ ساتھ میں جوڑی نہ ہو،اور خارج ہونے والامادہ زر دیاسرخ ہو۔ ۳۔ خارج ہونے والامادہ نہایت سرخ ہو۔ شانوں کے در میان سرخی ہو،مادہ رک جانے پر کھانسی

سخت اور براز زر دہو جائے اور اس کے اندر بیجد بدبو پیدا ہو جائے کم ہی مریض اس میں بچتے ہیں۔

پیوڑے کا پیشناہ شوار ہو تو مریض کو خرد ل اور ماء العسل دیں اور خمکین مچھلی اور پچھ چرپی غذا کیں کھلا کیں۔ مریض کو کری پر بٹھا کر جسم کو ہلا کیں۔ شانوں کو بختی ہے جینجو ڑیں برگ موی کے دوہ ہ ہنیک دیں، پہلو کی مسلسل تکمید کریں۔ مادہ کے اخراج میں آسانی نہ پیدا ہوتی ہو تو جلد کو پھاڑ دیں اور نشتر سے کھال کو اوپر کریں تاکہ پیپ کھل جائے، پھر اُسے تھوڑا تھوڑا روز خارج کریں۔ اندر زیون اور شراب ڈال دیں۔ اور پیپ کے ساتھ نکال لیا کریں۔ پیپ عمدہ رہی اور رنگ سفید رہا تو مریض نی جائے گا۔ ردی اور خراب رہی تو ہلاک ہوجائے گا۔ آپریشن کے لئے گڑا گڑاہٹ اور درد سے ماؤف پہلو کو معلوم کرلیں۔ شقیہ ہوجائے کے لئے مند مل کریں۔

سے اوک پہو و سوم مریں۔ تھے ہوجائے سے سمدن کو الف ہو تا ہے کیو تکہ پشت میں ایسادر دہو تا ہے کہو کہ دو ہوت ہے۔

پہلوکادر دجو پشت کے گوشہ سے شر و کاول کے مخالف ہو تا ہے کیو تکہ پشت میں ایسادر دہو تا ہے جیسے اس پر چوٹ لگ گئ ہو۔ فور اُہی مادہ خارج ہونے لگتا ہے ، یکبار گی سانس خارج ہوتی ہے۔

پیشاب خون اور پیپ جیسا ہو تا ہے۔ مریض پانچویں اور بالعوم ساتویں دن مرجا تا ہے۔ نیچ گیا توزندہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ، تڑپ ہنسلی سے مراق تک بیحد سخت ہوتی ہے۔ ساتویں دن تک مریض باتی رہا تو صحتیاب ہوجا تا ہے۔ ذات الجنب کے بعد پیٹھ سرخ ، شانے گرم ہوجا ئیں ، بیٹھنا ہو جھل ہو ، پانچانہ زر دبد بودار ہو تو ساتویں دن کے آخر میں مریض مرجائے گااگر آگے بڑھ گیا تو صحتیاب ہوجائے گا۔

بہت ساری قسموں کا مادہ تیزی سے لاحق ہوجائے اور در دسخت ہو تو تیسرے دن موت واقع بہت ساری قسموں کا مادہ تیزی سے لاحق ہوجائے گا۔ جس مریض کی زبان کھر دری ہوجائے تو اس کا بیپنا نوصحتیاب ہوجائے گا۔ جس مریض کی زبان کھر دری ہوجائے تو اس کا بیپنا درہ ہوتا ہو بھذر

پیپ زدہ ہونالازم ہے۔ اس کا پچنا مشکل ہے۔ درد پسلیوں کے سروں کی جانب مائل ہو تو بقدر ضرورت حقنہ دیں۔ گرم پانی کا جمام کرائیں۔ سرکوپانی ہے بچائیں۔ اسپر گرم پانی نہ پڑنے پائے۔ مادہ کا اخراج شروع ہوجائے تو مرطب مادہ کے اخراج میں آسانی پیدا کرنے والی دوادیں۔ اچھی طرح ملائی ہوئی شراب پھیچروے کو مرطوب اور مادہ کے اخراج میں آسانی پیدا کرتی ہے اس سے درد کم ہوجاتا ہے۔ بکری کا دودھ اور شہداس سلسلہ میں عمرہ ہیں۔ پھیچرد التجھی طرح مرطوب ہوجائے گاتو درداور شخص ہلکا ہوجائے گا، مادہ کے اخراج میں آسانی ہوگی۔ جو مریض کمزور اور دیلے ہوں انجیس دھوپ، ہوا، خمکین اشیاء، نفخ شکم، دھواں، چکنائی اور شکم سیری سے بچائیں۔ ان باتوں کی خلاف ورزی کے ہوا، خمکین اشیاء، نفخ شکم، دھواں، چکنائی اور شکم سیری سے بچائیں۔ ان باتوں کی خلاف ورزی کے

نتیجہ میں مریض بیاری کی جانب دوبارہ عود کر آیا تو مر جائے گا۔ جماع اور تکان سے بھی پر جیز کرائیں۔
مادہ رک جائے، درد اور تنفس تیز ہوجائے تو زنجار ایک چیچہ، شہد، هینگ اور گل طریفان یا فلفل کے عدد، حلتیت ۵ اگر ام، شہد، سر کہ اور نیم گرم پانی کے ہمراہ دیں، اس سے تڑپ میں سکون ہوگا۔ یہ دوائیں نہار منہ اور جسوفت در تیز ہواس وقت دیں۔ زنجار اسوقت دیں جب مادہ رک جائے۔ مادہ کی رکاوٹ اس حد تک ہوجائے کہ مریض میں کھر در این اور خر خراہٹ کی آواز پیدا ہوجائے تو زنجار ۵ اگر ام، اسی قدر نظر ون مشوی، تین انگلیوں کی برداشت بھر۔ زوفاء لیس اور اسپر شہد پانی اور تھوڑا زیون ڈالیس اور مریض کو چٹائیس تاکہ اختناقی کیفیت پیدانہ ہونے پائے۔ مریض کھنکھارنہ سکے تو نورے نورے ذوفاء لیس اور مریض کو چٹائیس تاکہ اختناقی کیفیت پیدانہ ہونے پائے۔ مریض کھنکھارنہ سکے تو نورے نورے دوسرے نورے کی کر ام کر کے دیں۔ دوسرے دن سر کہ اور شہد میں ابال کرزوفادیں۔ یہی عمل ہر اس مریض کے ساتھ کریں جو خر خراہٹ میں جو نو خر اہٹ میں جو نور خراہٹ میں حرف، پانی اور شہد میں ابال کر زوفادیں۔ یہی عمل ہر اس مریض کے ساتھ کریں جو خر خراہٹ میں جو نور ابنا اور شہد میں ابال کر نوفادیں۔ می عمل ہر اس مریض کے ساتھ کریں جو خر خراہٹ میں جو نور ابنا اور شہد میں ابال کر صاف کریں۔ مریض کوزردی بیضہ مرغ دیں۔ شوصہ کے لئے ابقدر حاء جنوں اور شہد میں ابالکر صاف کریں۔ مریض کوزردی بیضہ مرغ دیں۔ شوصہ کے لئے ابقدر حاء بیا اور شہد میں ابالکر صاف کریں۔ مریض کوزردی بیضہ مرغ دیں۔ شوصہ کے لئے ابقدر حاء بیا جو ہے۔ (بقر اط)

شربت بنفشه ،اورشربت نیلوفر، ذات الجنب اور شوصه میں جلاب نیادہ بہتر ہے۔ (مؤلف) عصارہ خبطیانا کے گرام ذات الجنب میں مفید ہے۔ (ابن ماسوبیہ)

جاوُشیر ، ذات الجنب میں مفید ہے۔ مخم گذر جنگلی کا مشروب شوصہ کے لئے موافق ہے پید خزیر خاکستریا چونہ میں ملا کر صاد کرنا شوصہ میں مفید ہے۔ آرد جو ناخونہ اور پوست خشخاش کا صاد شوصہ میں مفید ہے۔(دیاسقوریدوس)

ند کورہ بالا بیان قلمبند کرنے کا مقصود ہیہ ہے کہ شوصہ کے شروع میں سے مفید ہے۔ (دیاسقوریدوس)

بھٹا(ذرہ) تجاب کوعارض ہونے والے شگانوں میں مستعمل ہے۔ (بولس)
شوصہ میں درد بہتلی ہے متصل ہو تا ہو تو فصد کے ذریعہ اور پسلیوں کے سر ول ہے متصل
ہوتو اسہال اور فصد باسلین کے ذریعہ استفراغ کریں۔ بیاری میں مسبلات وہی دیں جن کے اندر
حرارت ہونہ کھر دراین پیدا کرنے کی بات ہو۔ مثلاً لبلاب، آب فواکہ ، خیار شغر ، ترتجبین۔ پہلو میں
درد شدید ہوتو آرد جو، بنفشہ ، گلرخ، صندل وغیر ہاور موم مصفی وروغن بنفشہ کا ضادر کھیں۔ درد ہلکا
ہوتو تھید کریں۔ جعلی کی ایک تھیلی کے اندر گرم پانی یاگر می پیدا کرنے والاروغن رکھی تھید کریں۔
شروع میں ماء الشعیر با قلی اور شکر سے تیار کردہ پتلے حساء کے ہمراہ دیں۔ پختہ ہوجانے پر زوفا کا

جو شاندہ پلائیں۔ سینہ کے اندر مجتمع شے کااخراج مشکل ہو جائے اور بخار میں سکون ہو تو زو فا کے جو شاندہ کے ہمراہ ایر سادیں۔(اسحاق)

شوصہ کے اندرورم کے دل سے قریب ہونے کی صورت میں بخار اور چیجن ہوتی ہے چیجن اس لئے کہ ورم حجاب کے اندر ہو تا ہے اس کے علاوہ کھانسی بھی آتی ہے کیونکہ ورم آلات تنفس میں ہو تا ہے۔ حنگی تنفس بھی ہوتی ہے۔ (طبیب نامعلوم)

ذات الجنب، پسلیول کے اوپر موجود عضلہ کے اندرورم کانام ہے۔ بیہ عضلہ بد کثرت اعصاب ر کھتا ہے ای لئے در د بھی زیادہ ہو تا ہے۔ بھی ورم پیچھے کی پسلیوں تک جاپہو پختا ہے، اس سے ختک کھانسی آتی ہے۔ بھی نادر اُشر وع میں مسلسل بخار جورات میں تیز ہو جاتا ہے اور تنگی شنس ہوتی ہے۔ مریض ماؤف پہلو کے بل سو تاہے اور تقریباً دوسر اپہلو نہیں بدلتا۔ زیادہ تر ورم بائیں پہلو اور کم تر دائے پہلومیں ہو تاہے۔اخراج کے ذریعہ کوئی زرد شے باہر آئے توبیدردی اور سرخ وسفید آئے تو محفوظ کیفیت ہوتی ہے۔زر دے زیادہ خراب سیاہ مادہ ہو تاہے۔ کوئی چیز خارج نہ ہو، بخار میں سکون نہ مو، تنكي تنفس بيحد شديد مو، بلند خرخرامث مو، نيز بخار مين شدت اور التهابي كيفيت موجود مو تو مریض جلد ہلاک ہوجائے گا۔ شروع مرض میں مادہ خارج ہونے لگے تو بحران تیزی ہے آتا ہے، برعس کیفیت برعکس انجام پیش کرتی ہے۔ بیاری بالعموم موسم خریف اور سرمامیں پیش آتی ہے گرما میں کم واقع ہوتی ہے۔ بالعموم مسلسل شالی ہواؤں میں مرض لاحق ہو تاہے، جنوبی ہواؤں میں کم عارض ہوتا ہے۔ ورم پیٹ جاتا ہے تو در دمیں سکون ہوجاتا ہے۔ سب سے عمدہ حالت بیہ ہے کہ مادہ به آسانی خارج مور مامو۔ کیفیت ملکی معلوم مو، مریض آرام محسوس کرتا مو۔ حاملہ عور تول کو لاحق ہو جائے تو تیزی سے مہلک ہے۔شراب خالص پینے اور تئے سے بھی یہ بھاری عارض ہو جاتی ہے۔ بالخصوص جبكه مد موشى كے عالم ميں كثرت سے دست آنے لكيس-باتھ پير محمندے موجاتے ہيں، سینہ اور گردن پر پسینہ آتاہ، بالخصوص حالت خواب میں۔ بخار دن کے نصف حصہ میں تیز ہو جاتا ہ،جس مریض کے اعراض طاقتور ہوتے ہیں اس کا بحران بھی تیزی ہے آتا ہے۔ (روفس) ذات الجنب کے ہمراہ تیز در د ہو تاہے جو ہنلی کی تمام ہڈی اور شانے پر محیط ہو تاہے۔ بخار تیز، تنتکی تنفس، شروع میں خٹک کھانمی، پھر جھاگ دار مادہ خارج ہو تاہے۔اس کے بعد خون آلو د مادہ باہر آتا ہے۔ مریض ماؤف پہلو کے بل لیٹنا ہے۔ جاگنار ہتا ہے۔ زبان خٹک اور کھر دری ہو جاتی ہے۔ان اعراض کے اندر سکون، ہاتھ پیر میصنڈے ،اور شکم چلنے لگے ،ر خساراور آئکھیں سرخ ہو جائیں ، نبض کثیف وسر بیج اور شفس عالی ہو جائے تواس کا مطلب سے کہ مریض ذات الرئد کی جانب منتقل ہو گیا

ہے۔لہذاابوہ گدی کے بل سوئے گا۔(جالینوس)

زات الجنب کے مریض کو تنگی تنفن، عریض کا در دہوتا ہے، کیونکہ عضو بیار جعلی کی ساخت کا ہوتا ہے۔ کیونکہ عضو بیار جعلی کی ساخت کا ہوتا ہے۔ عسر تنفس اور کھانی اس لئے ہوتی ہے کہ آفت آلات تنفس میں ہوتی ہے۔ نبض منشاری ہوتی ہے کیونکہ بیاری سخت عضو کے اندر ہوتی ہے۔علاوہ ازیں ورم اس میں کچھ پختہ اور کچھ نا پختہ ہوتا ہے، اس لئے شریان کے اجزاء، مختلف النبض ہوجاتے ہیں، ساتھ میں تیز بخار ہوتا ہے کیونکہ متورم عضودل سے قریب ہوتا ہے۔

ذات الجنب، ذات الرئے ہیں درد ہو جائے۔ ذات الجنب میں درد چیمن کا ہوتا ہے کیو تکہ ورم جھلی کے اندر ہوتا ہے۔ ذات الرئے میں درد ہو جھل ہوتا ہے کیونکہ بیاری غیر حساس عضو کے اندر ہوتی ہے۔ ذات الرئے میں نبض موجی نہیں ہوتی۔ ذات الجنب میں منشاری اور صلب ہوتی ہے کیونکہ آفت سخت اور بیاب المادة جھلی کے اندر ہوتی ہے۔ مادہ خون کا ہوتا ہے تو خارج ہونے والا مادہ سرخ، بلغی ہوتا ہے تو سفید صفر اوی ہوتا ہے تو زر داور سوداوی ہوتا ہے تو سیاہ ہوتا ہے۔ ذات الجنب میں جس مادہ ہوتا ہے وہ بالعموم صفر اوی قسم کا ہوتا ہے کیونکہ اپنی کثافت کے باعث جھلی عام حالات میں صرف لطیف مادہ ہی کو قبول کرتی ہے۔ پھیپھر ہے کے اندر جس مادہ ہے ورم ہوتا ہو وہ بالعموم غلیظ بالعموم غلیظ ہونے کی وجہ سے پھیپھر ابالعموم غلیظ بالعموم بالعموم غلیظ ہوتا کی وجہ سے پھیپھر ابالعموم غلیظ جاتا ہے۔ ذات الجنب اور در د جگر کا باجمی فرق باب التحید سے تعلق رکھتا ہے۔

، ذات الجنب میں ورم جب پسلیوں پر استر کرنے والی جعلی کے بالا کی اجزاء میں ہو فصد اور نیجے کی جانب ہو تومسہل دیں۔

پہلو کادر د چارتم کا ہوتا ہے:

ا۔ پسلیوں پر استر کرنے والی جھلی میں ورم ہو جائے اسے ذات الجنب کہتے ہیں۔ اس میں تیز بخار، چھن کادرد، نبض منشاری وصلب، کھانسی مادہ خارج کئے بغیر ہوتی ہے۔ داخلی عضلہ متورم ہوتا ہے توسانس اندرداخل کرتے وفت در دہو تاہے۔ اس سے خارجی عضلہ جو سینہ کو پھیلا تاہے کے ورم کا اندازہ چاتا ہے۔ سانس باہر نکالنے کے وفت در دہو تو اس سے عضلہ قابض صدر کے ورم کا پت چاتا ہے۔

، ۲۔ ظاہری عضلہ کے ساتھ جلد بھی متورم ہوجائے۔ یہ چھو کرمعلوم کیاجا سکتا ہے بشرطیکہ پہلیوں پر استر کرنے والی جھلی کے اندرورم ہو۔مادہ خارج ہورہاہو تواس کے رنگ سے خلط موجب کا پتہ چلے

گا۔ مادہ خارج نہ ہور ماہو تو ذات الجنب بلامادہ ہو گا۔لبذاور م داخلی اور خارجی کے در میان فرق اس بات ے کریں کہ داخلی میں در دزیادہ تیز ہوگا۔خارجی ورم کاایک سر بھی ہو گاجو باہرے محسوس ہوگا۔ اس کے ساتھ مریض ایک چیز خارج کرتاہے جو بھی زرد، سفید، سرخیاسیاہ ہوتی ہے۔ دراصل یہ متورم مقام کی پیپ ہوتی ہے جے یہ مقام صبط نہیں کریاتا، بلکہ ترشح کے ساتھ اے خارج کردیتا ہے۔سیاہ شروع ہی ہے نہ ہوگی بلکہ پیشتر بالعموم زرد چیز خارج ہوتی ہے۔

خارج ہونے والا مادہ سرخ ہو گاتو دورہ اے غائب کردے گا۔ بے خوابی ، فساد ذہن ، بھوک میں کی اور شدت کی پیاس ذات الجنب میں زیادہ ہوگی تو ذات الجنب بھی برا ہوگا۔ بے خوابی اور ذھنی فساد جو ذات الجنب کے آخر میں لاحق ہو تاہے وہ دائمی نہیں ہوا کر تا۔عمدہ تنفس اور پختگی کا ظاہر ہو جانا ذات الجنب میں المجھی علامت ہے۔ برعکس حالت برنکس حکم رکھتی ہے۔خالص مادہ پختگی کی علامت ہے۔ سفیدلیسدار مادہ اور وہ مادہ جو ماکل بہ زر دی ہو تاہے نیز جس میں خون شامل رہتاہے وہ پختگی کے

زیادہ ہونے کی علامت ہے۔

تھوک جس کے اندر سرخی اور زر دی سیر شدہ اور آتشی قتم کامادہ خطرہ کی علامت ہے۔ سیاہ مادہ کے ہمراہ بدیو ہو تو موت کی سب سے مؤثر علامت ہے۔ بدیونہ ہو تو کم ردی ہو تا ہے۔ عسرتنفس اور ای طرح شدت کادر در دی علامت ہے۔ برعکس کیفیت بیکس ہوتی ہے۔ تا پختہ مادہ نہایت سرخ ہواور آتشی مادہ نہایت براہے۔نفث کے ذریعہ نکلنے والامادہ تھوڑااور پختہ ہواور پھر بھی اعراض موجود ہول تومر ض میں اضافہ ہونے کی علامت ہے۔ اعراض میں سکون ہو توانحطاط حالات کی علامت ہے۔ یہ آلات تنفس کے در دوں اور ذات الجنب میں خصوصیت ہے دیکھا جاتا ہے۔ مثلاً بخار زدول کے اندر پیٹاب ذات الجنب اور ذات الرئه کی بیاریوں میں جب کوئی خارج ہونے والی چیز اوپر نہ چڑھے تو یہ کیفیت بخار زدول میں بول مائی کی صورت ہوگی اور چڑھے مگر رقیق اور نا پختہ ہو تو یہ کیفیت بخار زدول میں اس بول مائی کے مانند ہو گی جو گاڑھا خارج کیا گیا ہو اور اپنے حال پر باقی ہو۔ پختہ سفید "بزاق" خارج ہو مگر تھوڑا ہواور غیر متصل ہو تواس کا مطلب یہ ہے کہ مریض ابتدا کی حدے آگے بڑھ چکا ہے اور اب بڑھناشر وع ہو گیا ہے۔ یہ کیفیت اس بول کے مانند ہوگی جس میں سرخ بادل یا سرخ ریشے یاسرخ رسوب ہوتے ہیں۔نفث جب سفید، پخته ،زیادہ اور متصل ہو تو چڑھنااس کا آسان ہوگا۔ حالت تزید ختم ہو چکی ہوگی اور انتفائے مرض شروع ہوچکا ہوگا۔ یہ کیفیت اس بول کی صورت ہو گی جس میں سفید، چکنے اور مستوی قتم کے رسوب ہوتے ہیں۔ مریض کوئی چیز خارج نہ كرے یا خارج كرے مكر نا پختہ اور رقیق ہو تو دونوں حالتیں اس بات كى علامت ہیں كہ بمارى ابتدائى

حالت میں ہے۔

ذات الجنب اور ذات الرئه میں بیاری کی بڑی علامات میں سیاہ، سخت سرخ، جھاگ دار، سخت بد بو دار ،اخراج میں د شوار ، شدید در داور سوء شفس داخل ہیں۔

ذات الجنب بوڑھوں کے لئے مہلک ہے۔ اخراج مادہ میں نقد یم و تاخیر کے مطابق ذات الجنب کا خاتمہ ہوگا۔ ذات الجنب کے شروع او قات میں فصد کھول دینا ضروری ہے۔ اس بیاری میں سب سے زیادہ موزوں ماء الشعیر ہے جس کے اندر تھوڑا اصل السوس، چند دانے عناب، سکر طبر زد، اور روغن بادام شیریں شامل کر دیا گیا ہو۔ کھانے میں بھوا، ماش کا شور با، زردی بیضہ فیم شت دیں۔ آر دجو، بنفشہ، بابونہ اور منظمی وغیرہ کا پہلو پر ضبیصہ رکھیں۔ جس سے تطفیہ حرارت کے ساتھ درد میں سکون ہوئے۔ (یہودی)

سوء تنفس، کھانسی اور ر تکین تھوک کے علاوہ تیز بخار ذات الرئد اور ذات الجنب میں عام طور پر ہو تا ہے۔ان اعراض کے ساتھ پہلو میں چیمن کا در د، صلابت نبض، تواتر نبض بھی ہو تو یہ ذات الجنب کی بیاری ہوگی اور اگر مذکورہ اعراض کے ہمراہ نبض کے صلابت نہ ہو تو مریض کو اختامی کیفیت محسوس ہو تو یہ ذات الرئد ہوگا۔ (جالینوس)

در دپہلو کے ساتھ نفث الدم ہو تو چودہ دنوں کے اندر صحت نہ ہونے پر پھیپر اے کے اندر پیپ جمع ہوجائے گا اور مریض سل میں مبتلا ہو کر انقال کرجائے گا۔ جن مریضوں میں تجاب کے اوپر درم ہو اور بلا کسی معروف سبب کے اچانک پوشیدہ ہوجائے تو ورم پھیپر اول کی جانب منتقل ہوجائے گا اور یہ لوگ ساتویں دن یااس کے بعد انقال کرجائیں گے۔ ذات الرئے اور ذات الجنب کے ساتھ شکم بھی چلنے گئے تو بہت براہ کیونکہ اس سے طبیعی قوت کی موت کا پنہ چلتا ہے۔ ذات الجنب اور ذات الرئے کے ساتھ کر از ، الغرض تمام ہی اور ام موت کا پنہ دیتے ہیں۔ (جالینوس)

نفث الدم مزمن ہو اور پھر پیپ میں تبدیل ہوجائے، خون اچانک رک جائے تو مریض اچانک فوت کرجائے گا۔ کو دنا پھاندنا، جم کر بیشنا، ورم حجاب، ورم ر<sub>ئد</sub>یا پسلیوں کے عضلات کے ورم کی علامت ہے۔ (جالینوس)

بارہا ایسے مریض نظر آتے ہیں جن کے پھیچروے کے اندر پیپ جمع ہوئی، چنانچہ انہوں نے اے پیشاب یاپائنانہ کے ذریعہ خارج کردیا تو صاف ہوگئے۔لہذا یہ یادر کھنا چاہئے کہ پیپ کا ایک عضو سے دوسرے عضو کی جانب اخراج ،یااخلاط کا منتقل ہوتا، فقط اعضاء مجو فہ کے ذریعہ ہی نہیں ہوتا بلکہ جمع کے تمام اعضاء کے ذریعہ ہوا کرتاہے حتی کہ ہڈیوں اور او تار (Tenlens) کے ذریعہ بھی

ہو تا ہے۔ کلانی طحال میں زیادہ ورم کی وجہ ہے در دپیدا ہو تا ہے حتی کہ وہ بائیں ہنسلی اور مونڈ ھے تک جاپہو پختا ہے لہذا ضروری ہے کہ اس کی جبتو کی جائے تا کہ غلطی نہ ہو سکے۔ (جالینوس)

تیز بخار مسلسل شدید در دیبلوے شروع ہو کر بہنی اور شانوں تک بہو پختا ہے۔ شدید چھن ہوتی ہوتی ہے تی تخش اور شروع میں خشک کھانی آتی ہے۔ اس نے بعد مریض جھاگ دار تھوک خارج کر تا ہے۔ اس کے بعد خونی یاصفر اوی تھوک آتا ہے۔ مریض ہمیشہ ماؤف پہلو کے بل سوتا ہے۔ به خوابی، زبان میں خشکی اور کھر درا پن ہو تا ہے اعراض میں اضافہ ہو جائے اور انتہا پر بہو پخ جا کیں تو ہاتھ پیر شفندے ہو جائے اور انتہا پر بہو پخ جا کیں تو ہاتھ پیر شفندے ہو جاتے ہیں۔ رخمار اور آتکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ پیٹ چلنے لگتا ہے، نبض پوشیدہ اور تیز ہو جاتی ہے۔ اس طرح تنفس بھی تیز ہو جاتا ہے۔ ٹوٹ ٹوٹ کر پینے آتا ہے۔ اخراج مادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بھی آسان بھی ہوتا ہے۔ بھی سیاہ سرخ ، اور زر دہوتا ہے، بھی گلابی یاسز ہوتا ہے۔ بھی سیاہ مرخ ، اور زر دہوتا ہے، بھی گلابی یاسز ہوتا ہے۔ بھی سیاہ میں در دبا کیں پہلو کے مقابلہ میں زیادہ شخت ہوتا ہے کو نکہ پیورا آقریب تر ہوتا ہے۔ بعض اطباء فرماتے ہیں کہ با کیں پہلو کا در دریادہ تیز ہوتا ہے کو نکہ یہ دل سے قریب تر ہوتا ہے۔ نہ کورہ اعراض میں افاقہ ہو اور مریض ہمیشہ گدی کے بل سوے، باتھ پیرگرم نہ ہوں، رخمار کی ہٹریاں سرخ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرض ذات الرئے کی جانب منتقل ہوگیا ہے۔ (جالینوس)

ذات الجنب میں بخار کی باریاں بالعموم ناغہ دیر آتی ہیں چھن کا در دذات الجنب میں ہوتا ہے کوئلہ ورم جھلی کے اندر ہوتا ہے۔ ہی حال حساس تھلیوں کے اندر پیداشدہ در دوں کا ہواکر تا ہے۔ چو نکہ یہ جھلی بعض آلات تنفس کا ایک جزء ہوتی ہے اس لئے تنفس میں تبدیلی بھی ضرور واقع ہوتی ہے۔ پھر چو نکہ یہ دل ہے قریب بھی ہوتی ہے اس لئے تنفس میں تبدیلی بھی ضرور واقع ہوتی ہے۔ پھر چو نکہ یہ دل ہے قریب بھی ہوتی ہے اس لئے نہ کورہ التھاب کی آٹج دل کو بہو شخے ہے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ پھیپھرٹ کی ساخت، سخت اور تخلیل ہوتی ہے اس لئے پھیپھرٹ سے قریب ہونے کی وجہ سے ورم حارہ پیداشدہ پیپ پھیپھرٹ کے اندر بھی بہو پختی ہے اس طرح کھانی بھی لا حق ہو جاتی ہے کو تکہ یہ پیپ کو خارج کرنے کے لئے پھیپھرٹ کو حرکت دیتی ہے۔ شروع میں ہی اخراج مادہ زیادہ مادہ کی تخریح ہو جاتا ہے جب مادہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے۔ ورم میں جس قدر صلابت ہوگی اور ترشح کم ہوگا اس قدر اخراج مادہ نیادہ میں تا خیر ہوگی۔

کیونکہ پھیپھڑے کے اندر داخل ہونے والی چیز ترشح نہیں پاتی مادہ تیزی ہے نرم ہو کر پختہ ہو گا تواخراج بھی تیز ہوگا۔ کیونکہ اس سے بہت سارامادہ بہہ کر ٹکلٹا ہے ورم کی خلط کس قتم کی ہے اس کا

بہلو کے اندر ورم بڑی حد تک گہر اہو تو سیلان مواد کے منقطع ہو جانے کے بعد پہند لگانا مفید ہے کیونکہ پینہ مواد کو اندرے جذب کر کے باہر لے آتا ہے اس وقت ورم کا محلیل ہونا ممکن ہوجاتا ہے۔خارج ہونے والا مادہ ذات الجنب میں صفر اوی ہو تو مادہ د موی کے مقابلہ میں اے فصد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مؤخر الذ کر زیادہ محفوظ اور مقدم الذکر زیادہ خراب ہو تاہے سینہ اور پہلو کے درد کے ساتھ جے کھانی نہ آتی ہواہے ورم نہیں ہوتا۔ نہ ہی کوئی پھوڑا ہوتاہے کیونکہ ورم ے کی چیز کا بہنالازم ہے۔اس سے کھانسی اور اخلاط میں تحریک ہوگی۔خارج ہونے والا مادہ سرخ ہو تو بیاری فلغمونی ہوگ۔ شوخ سرخ ہو تو بیاری حمرہ، جھاگ دار ہو تو بلغم سے ملاجلاخون اور سیاہ، ورم کے سوداوی کی علامت ہے۔ چیمن سے زیادہ تناؤ تو کشرت اخلاط کی دلیل ہے، چیمن سے اخلاط کی کیفیت کاعلم ہو تا ہے۔ بیاری سفدر ہے اس کا ندازہ بخار اور در دکی مقدار ہے کریں اور خارج ہونے والاماده کی خرابی اور تاخیر اور اخراج ماده کے اندر د شواری کا ہونا خراب ہے کیونکہ مادہ کے اندر تاخیر کا نہ ہونا اور بہ سہولت خارج ہونا عمدہ ہوتا ہے یہی حال بھوک کے زائل ہوجانے ظاہری بھے کی کی، عدم بھے، تنفس، بے خوابی، فساد عقل اور مرض کومریض کا کم بر داشت کرنے کا بھی ہے۔ فرض کرلیں کہ اس بیاری کے اندر بخار، بے خوابی اور فساد عقل زیادہ ہے، مگر خارج ہونے والامادہ خالص سرخے اور سیاہ نہیں، شروع بیاری سرخ، زردیا جھاگ دار رہاہے پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد تبدیل ہو کر پختلی کی جانب آگیا ہو توالی حالت میں بخار اور دیگر اعراض کی شدت سے تھبرانا مناسب نہیں ہے یہ ساری باتیں اس لئے پیش آتی ہیں کہ ورم پیپ جمع کررہا ہوتا ہے۔ پیپ جمع

کرنے کے وقت اعراض بڑے اور سخت ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مریض کثرت سے مادہ خارج کرنے لگتا ہے، مقدم الذکر تمام اعراض اور سینہ اور پھیپھروے کے تمام امراض کے مقابلہ میں اخراج مادہ کے اندر تیزی لا تا ہے۔ مادہ خارج کرنے والے مریض کے اندر پختگی کا ظاہر ہونا تمام مہلک مادہ کے اندر تیزی لا تا ہے۔ عضلات تنفس کی مدد بھی ہو تو مریض لا محالہ نجات پا جائے گا۔ (جالینوس) اخراج مادہ مناسب ہور ہا ہو، مریض کو حقنہ یادواء مسہل کی ضرورت نہ ہو تو جو کے دلیہ کے بانی کا حقنہ دیں کیونکہ فصد، اسہال اور حقنہ کی ضرورت نہ ہو تو مناسب ہے کہ بیپانی دیا جائے۔ (جالینوس) کا کا حقنہ دیں کیونکہ فصد، اسہال اور حقنہ کی ضرورت نہ ہو تو مناسب ہے کہ بیپانی دیا جائے۔ (جالینوس)

ان حالات کے بعد ماء الشعیر پلانے ہے بہت زیادہ فوا کد حاصل ہوں گے۔ اس ہے اخراج مادہ میں آسانی ، معدہ کو قوت اور آلات تنفس کا عقیہ ہوتا ہے۔ قابض اشیاء ہے مریض پر ہیز کرے کو کہ افراج مادہ کی راہ میں یہ چیزیں رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں اور مریض پر اختتاقی کیفیت طاری ہوجاتی ہے اس کا تجربہ کیا جاچکا ہے مریض نے ماء الشعیر بیا او السل ماء السعیر بی کا کام کرتا ہے البتہ ماء الشعیر کی طرح یہ قوت نہیں بہونچا تالہذا اس کے ساتھ مریض کو چٹانی مجھلی عرق کراث وشیث اور نمک و زیتون میں ابال کرایک معتدل مقدار میں دیں۔ البتہ اعصابی یار حی بیاری ہو توا ہے دریں اصل السوسی افراسیون ماء العسل کے ساتھ پینے ہے سینہ کے فضلات اچھی طرح پختہ ہوتے نہیں اور افراج میں سہولت ہوتی ہے۔ اس بیاری کے اندر جو لوگ بسر عت اختتاتی کیفیت لاحق ہو جانے ہیں ان کے پہلو پر کیا معلوم ہوگا جسے چوٹ پڑی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں آنے ہو جانے ہے مرجاتے ہیں ان کے پہلو پر کیا معلوم ہوگا جسے چوٹ پڑی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں آنے والاخون جو ورم کا سبب بنتا ہے قوت حیوانی کی طرح مرجاتا ہے تو خارج ہے اس جگہ کو سبز کر دیتا ہے۔ والاخون جو ورم کا سبب بنتا ہے قوت حیوانی کی طرح مرجاتا ہے تو خارج ہے اس جگہ کو سبز کر دیتا ہے۔ (جالینوس)

تہمید ہے ذات الجب کادرد خشک ہوجاتا ہے کیونکہ پہمید جلد کو سخت اور خون کے ایک حصہ کو سخلیل کر دیتی ہے البتہ جسم کے اندرامتلائی کیفیت ہو تو پہمید تحلیل ہے زیادہ یہاں مواد تھینج لائے گا اوراس جگہ میں بخاری کیفیت پیدا کرے گی چنانچہ اس مقام میں تناؤپیدا ہوگا جس ہے درد میں اضافہ ہوگا۔ پہمید کے ذریعہ جسم کا انچھی طرح ہوگا۔ پہمید کے ذریعہ جسم کا انچھی طرح استفراغ کر دیں۔ باب التہمید کا مطالعہ کریں تاکہ پہمید کی کیفیت کا علم رہے دردینچے ہورہا ہو تو پہمید کا استفراغ کر دیں۔ باب التہمید کا مطالعہ کریں تاکہ پہمید کی کیفیت کا علم رہے دردینچے ہورہا ہو تو پہمید کا اسپر اثر ہوگا اوراگر ہنلی کی ہڈیوں تک جارہا ہو تو فصد ہی اے تحلیل کرے گی۔ نیچے درد میں فصد کرنا کم مفید ہے۔ تہمید ہو تو زیادتی نہ کریں بلکہ استفراغ کی جانب توجہ دیں کیونکہ پہمید سے پہیچرداختگ ہو تا ہے اور پیپ جمع ہونے گئی ہے۔ درد ہنلی تک پہونچ تو فور آہی یہاں یا چھاتی کی سے پہیچرداختگ ہو تا ہے اور پیپ جمع ہونے گئی ہے۔ درد ہنلی تک پہونچ تو فور آہی یہاں یا چھاتی کی

طرف یا پورے تجاب کے اوپر تفل محسوس ہوگا۔ باسلین کی فصد کھول کافی مقدار میں خون خارج کردیں حتی کہ خارج ہونے والے خون کارنگ بدل جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ورم پسلیوں پر استر کرنے والی جعلی کے بالائی اجزاء میں ہو تا ہے، ورم جب اس گوشہ میں ہو تا ہے تو در دمیں ہسلی اور باز و بھی شریک ہو جا تا ہے۔ در د پسلیوں کے سروں کی جانب متوجہ ہو تومسہل ادویات کے ذریعہ استفر اغ کریں کیو نکہ فصد باسلین اس گوشہ سے خون کو جذب کر تا ہے مگر سرعت سے نہیں۔ اس لئے بہ سرعت فائدہ نہیں پہو پختا۔ سینہ کا نچلا گوشہ ایسی رگوں سے غذایا تا ہے جو دل تک پہو نچنے سے پہلے گہری رگ (عرق عمیق) سے نکلی ہیں۔ خون کا تغیر سے بتائے گا کہ ورم کا خون بیشتر نکل چکا ہے اور اب رگوں کا خون غشیم فائدہ کا حال رگوں کا خون خارج ہونے لگا ہے افراج خون سے توت گر جاتی ہے گواس کا افراج عظیم فائدہ کا حال سے۔ گر حفظان قوت کی بات نگا ہوں میں زیادہ رہنی چا ہے۔ (جالینوس)

درداس مقام پر جہونے جو پسلیوں کے سروں کے نیجے ہوتو مسہل استعال کریں۔ (بقراط)

شوصہ کے ہمراہ زور کا بخار ہوتو مسہل ہے اجتناب کریں، فصد کھولیں کیو نکہ اس حالت کے

اندر فصد کھولٹا ذات الجنب ہے محفوظ رکھتا ہے۔ مراہ وہ درد ہے جو نچلے حصوں میں ہوتا ہے۔ گواس کا

فاکدہ ویبا نہیں ہے جیبا کہ اوپری حصہ میں ہونے والے درد میں ہوتا ہے گر پھر بھی بے خطرہ ہے۔

مسہل بچد خطر ناک ہے۔ بالخضوص جب کہ مریض کا مزاج معلوم نہ ہو۔ اور نہ بی دیتے جانے والے

مسہل کی مقدار معلوم ہو۔ اس ہے بڑے نقصانات لاحق ہوتے ہیں۔ مریض کو بخار ہوگیا توابیا یا

ہواہوگا۔ دوا کم کردیں گے تو نقصان اور بڑھ جائےگا۔ البتہ مریض کا مزاج انچی طرح معلوم ہو، دوا

ہواہوگا۔ دوا کم کردیں گے تو نقصان اور بڑھ جائےگا۔ البتہ مریض کا مزاج انچی طرح معلوم ہو، دوا

کی مناسب مقدار بھی معلوم ہوتو مسہل دیں۔ ایسے مریضوں کے لئے بہترین مسہل ایار ہے ہے۔

لیارج کے اندر خربق ہوتو ہے سقونیا ہے بہتر ہے۔ اسہال رک جائے تو مریض کو ماء الشعیر دیں۔ یہ

مریض کے مزاج کی تعدیل اور جسم ہے باتی ماندہ ادہ کو خارج کردیتا ہے۔ ماء الشعیر کی مقدار اس دن

عام معمول ہے کم ہونی چاہئے۔ اس کے بعد حسب عمول دیں۔ درد میں سکون ہوجائے تو مزید طاب نہ وگا۔ اور مغید ثابت ہوگا

کردیں۔ مادہ پک جانے کے بعد جمام کرائیں ایسی صورت میں جمام بیحد مددگار اور مغید ثابت ہوگا

کردیں۔ مادہ پک جانے کے بعد جمام کرائیں ایسی صورت میں جمام بیحد مددگار اور مغید ثابت ہوگا

کو تکہ اخراج اضاط میں آسانی پیدا کرے گا۔ (جالینویں)

تجاب میں پیداشدہ ورم کے بعد چیمن کا در دغیثی زیادہ ہو تو تشنج اور نبض صلب منشاری ہو جاتی ہے۔ ذات الجنب کے اندر بنفل کی مشاریت تھوڑی ہو تو ورم آسانی سے پختہ ہو تا ہے اور تیزی سے بحر ان آ جاتا ہے لیکن اگر بیحد طاقتور عظیم اور واضح ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ ورم ردی ہے اور

مشکل سے پختہ ہوگا۔ بایں ہمہ مریض طاقتور ہو توانجام یہ ہے کہ پیپ پڑے گی، سل ہو گااور مریض دبلا ہو جائے گا، کمزور ہو گاتو مر جائے گا۔ تواتر نبض شدید ہو تو ذات الرئہ یا غشی لاحق ہو گی۔ تواتر کم ہو مریض کو نیند آ جائے گیا پھر اعصاب کے اندر کوئی آفت آنے والی ہو گی۔

فلغمونی نام کاورم حار پسلیوں پر استر کرنے والی جعلی میں ہو تو یہی ذات الجنب ہے۔ یہ ورم مجتمع ہو کر پیپ پیدا کر کے اور پھٹ جائے تو اجتماع پیپ کہا جائے گا۔ اس قتم کا ورم پھیپھڑے کے اندر ہو تو ذات الرئداور پیپ پڑنے کے بعد پھٹ جائے تو سل کہلائے گا۔ (جالینوس)

پھیپر سادہ ہو۔ جو سہل الخروج ہونے والا سب سے عمدہ مادہ وہ ہجو سہل الخروج اور تیز ہو۔ تیز سے مرادیہ ہے کہ بیاری کی ابتدا سے تھوڑے ہی وقت کے بعد خارج ہونا شروع ہوجائے۔ یہ بیاری کے ہم ہونے اور قریب الحتم ہونے کی دلیل ہے۔ سہل الخروج سے مرادیہ ہے کہ خلط گاڑھی ہونہ رقیق کیونکہ گاڑھی خلط مشقت ہی ہے تکلتی ہے۔ اسے نگلنے کے لئے سخت طاقت در کار ہوتی ہوتی ہے۔ رقیق خلط دباؤ پر پھسل کر نیچے چلی جاتی ہے اور مکڑے مکڑے ہو کر منتشر ہوجاتی ہے۔ لہذا اس کا ٹکلنا دشوار ہوجاتا ہے۔ خارج ہونے والا عمد مادہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر سرخی سفیدی ہیں ملی جلی نظر آتی ہے۔ لی جلی نہ ہو تویہ صفراء خالص کی علامت ہے۔ بیاری کے ابتدائی مرحلہ سے خارج ہونے والا مادہ ہو تو

خالص سرخ مادہ جب کہ بلغم ہے ملا جلانہ ہو خطرہ کی علامت ہے۔ سفید لیسد ار گول مادہ غیر مفید ہے۔ خالص سرخ خطرہ کی علامت اس لئے ہے کہ بہ کثرت خالص صفراء کی دلیل ہو تا ہے۔ سفید لیسد ار گول مادہ سوختہ بلغم ہے بنا ہے۔ پسلیوں کے اندرورم کے سب بید دونوں پیدا ہوں تو عمدہ نہیں ہوتے۔ سبز اور جھاگ دارردی میں کیو نکہ ایک اس بات کی علامت ہے کہ ورم کا سبب تیز صفراء ہو دوسرا اس بات کی علامت ہے کہ ریاح غلظ رطوبتوں میں پھنس گئے ہے جس کا نکلنا مشکل ہے یا پھر اس بات کی علامت ہے کہ آتی حرارت موجود ہے جو خارج ہونے والے جھاگ کے مطابق ہے۔ مادہ بیاہ ہے تو فد کورہ بالا دونوں مادوں ہے زیادہ خراب ہے کیونکہ یہ ورم کا سبب مرہ سوداء کو خالج کر تا ہے یہ سب ہے کہ اس بی حرات ہو جانے پھر طاق میں امتلاء موجود ہو تو حتی کہ اس میں طاہر کرتا ہے یہ سب ہے کہ اس میں خواہ بیار ہو جائے تو یہ ردی ہے۔ زکام اور عطاس سینہ کی تمام بیاریوں میں دونوں دی جھینک بیں، خواہ بیاری سے بیلے لاحق ہوں یا بعد میں۔ زکام سے سینہ کی جانب اخلاط ہہ کر آتے ہیں۔ چھینک ہیں، خواہ بیاری سے بیلے لاحق ہوں یا بعد میں۔ زکام سے سینہ کی جانب اخلاط ہہ کر آتے ہیں۔ چھینک

تح یک بیدا کر کے سینہ کو ہلا دیتی ہے۔ مرض یہ عرصہ گزرنے کے بعدیہ عارض ہوں تو پھیپھرے کے اندر بہاری کے درازاور بڑھی ہوئی ہونے کی خبر دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ سر کو نقصال پہونچ گیا ہے۔ تھوک کے اندر کچھ خون شامل ہو مگر زیادہ نہ ہو اور سرخ ہو۔ بیاری ذات الرید کی ہو تو اگر بیاری کے شروع میں ہے تو ہے حد سلامتی کی علامت ہے۔سات دن یااس سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی علیٰ حالہ باقی ہوتومریض کے بیخے کی امید کم رکھیں کیونکہ اعضاء کے اندر پیداشدہ اورام کی وجہ سے ورم پیدا کرنے والی خلط کے جنس کی پیپ بہتی ہے۔ یہ خلط صفراوی ہو تو خارج ہونے والا مادہ زرد، سرخ ہو توخون شوخ سرخ ہو توصفر اءاور خون سے ملاجلااور سرخ ہو توورم پیدا کرنے والی شئے خون ہو گی جو محمود علامات میں سے ایک ہے۔اس کے بعد پھیپھرم سے کی کسی رگ کے بھٹنے کے در میان فرق بیہ ہے کہ اس میں خارج ہونے والا مادہ خالص خون ہو گااور زیادہ مقدار میں ہو گا مگر دوسرے میں خالص خون نہ ہو گا بلکہ رطوبتوں ہے ملاجلا ہو گا اور زیادہ مقدار میں نہ ہو گا۔ خارج ہونے والا مادہ بالعموم چوتھے دن سے لیکر ساتویں دن تک پختہ ہوجاتا ہے۔ای لئے تبدیل ہوجاتا ہے۔ بحالہ باتی نہیں رھتا۔ پختہ نہ ہوسکے، ساتویں دن بھی مادہ علی حالہ باتی رہے تو طول مرض کی آگاہی دیتا ہے کیونکہ اس کا پختہ ہوناد شوار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس طول مدت میں طاقت گرے بغیر نہیں رہتی یامریض پر جنون طاری ہوجا تا ہے۔لہذا طبیعت کو طاقت پہونچانا لازم ہے۔خارج ہونے والے ہر مادہ میں درد کے اندر سکون نہ ہوتو یہ ردی ہے۔ سیاہ سب سے زیادہ ردی ہے۔ مگر سسی بھی صورت در دبیں سکون ہو جاتا ہو تو یہ سب سے عمدہ ہے۔الا بیہ کہ مریض کی عقل فاسد ہو گئی ہولہذاور د کا احساس نہ کرسکے۔ سرخ اور زر د مادہ سب سے کم خطرناک ہے سیاہ سخت خطرناک ہے۔ لازم ہے کہ رنگ، مادہ کے بہ آسانی خارج ہونے، طاقت، خارج ہونے والے مادہ کے ذریعہ مریض کو فائدہ یا نقصان پہونچنے، طاقت کی مقدار، اور پختہ ہونے کے زمانہ سب کی علامات کو پیش نظر ر تھیں۔ پھر تھم لگائیں۔ اخراج مادہ، اسہال، فصد اور تکمید، کی تدبیر سے بھی در د کے اندرسکون نہ ہو تواس کا مطلب سے کہ بیاری پیپ کی طرف بردھ رہی ہے۔اس کے ساتھ سلامتی کی علامات موجود نہ ہوں تو مریض موت کی جانب قدم بردھار ہا ہو گا۔ وجہ یہ ہے کہ جس کیفیت میں سلامتی کی علامت موجود ہول مگر علاج سے درد کے اندر سکون نہ پیدا ہو تا ہو وہ سہل اور مہلک امراض کے مابین مقام رکھتی ہے۔ پہیپ پڑ جانے اور صفراء کے بعد تھوک اس پر غالب ہو تو یہ ردی ہے۔ خواہ کسی طرح خارج ہو۔ یعنی بھی زر دمادہ خارج ہو، بھی پیپ، یا بھی دونوں ملے جلے کیونکہ جواورام جم کے بالائی حصول میں پیپ پیدا کرتے ہیں، پھر ان میں کچھ پیپ زدہ ہوں اور بچھ پیپ زدہ نہ ہول۔ای کے

ساتھ کوئی ردی علامت بھی موجو دہو تواس کی خرابی بیجد سخت ہوگ۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ طبیعت خلط کو پختہ کرنے کاارادہ کیا مگر خلط نے اے قبول نہیں کیا۔ (جالینوس) تمام اخلاط نے قبول نہیں کیا۔ (مؤلف)

بالخصوص وہ مریض جس میں پیپ پڑی ہواور بیاری پر سات دن کاعر صد گذر چکا ہو۔اس طرح کامادہ جو مریض خارج کر رہا ہو چو د ہویں دن اس کی موت کے منتظر رہیں۔الا بیہ کہ خارج ہونے والامادہ محمود اور عمدہ ہو۔

فرض کرلیں کہ ایک مریض طافت اور عمر میں متوسط الحال ہو۔ اس نے ساتویں دن، غیر خالص پیپ خارج کی ہو۔ پیپ صفر اوی رطوبت سے ملی جلی ہو تاکہ اس باب میں بھی وہ متوسط الحال رہے۔
ایسے مریض کے حق میں کوئی عمدہ علامت ظاہر ہو تو بھی اس کی موت چود ہویں دن سے بڑھ کر آگے ہوگی اور کوئی علامت ظاہر نہ تو تو یہ گفیت ردی ہوگی اور کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو اس کی موت اس میں ہوگی کے وقع کے ہم اور دوسر اس بیاری کا ہے جو کم ردی ہے۔ لہذا الازم ہے کہ ردی اور جید بیاری کا ہے جو کم ردی ہے۔ لہذا الازم ہے کہ ردی اور جید علامات کو تول کر مرتب کرلیں۔ مہلک تھوک کے ہم اہ بعض خراب علامات اور پہلا درجہ ظاہر ہو تو مریض اگیار ہول کی اس کے بھی کم مدت میں مریض اگیار ہول کے ہم اہ بعض خراب علامات اور پہلا درجہ ظاہر ہو تو میں مریض المیار ہو وہ کی گار اس کے میں مریض بلاک ہو جائے گابشر طیکہ ایک علامت سے زیادہ علامتیں ظاہر کی ہو جا کی گر اس کے میں مریض عمدہ وہ وہ وں تو بیاری تیسر سے ہفتہ تک خاتمہ پر ہوگی۔ علامت موجود ہوں تو بیاری تیسر سے ہفتہ تک خاتمہ پر ہوگی۔ علامتیں طاہر مول کے خل میں کہ وہ کی مریض کے حق میں اور مریض کے خالف دلیل خوت میں اور مریض کے خواب میں ہوں تو گھر اس پر وفت کا قیاس کرلیں۔ مریض کی قوت مز اج اور وفت بھی مریض کے حق میں اور مریض کے خالف دلیل خوت ہیں۔

پہلے مرحلہ میں پیپ ساتویں دن پڑجاتی ہے حتی کہ خلط بیجد گرم ہو جاتی ہے بالعموم دسویں دن کے لیکر چالیسویں اور ساتھویں دن تک پڑتی ہے۔ پیپ پڑنے کی علامت یہ ہے کہ جوڑی ہوگی۔ اس کے بعد بخار آئے گاکیونکہ پیپ اعضاء شریفہ کے اندر سوزش پیدا کر کے انہیں فاسد کرے گی توای سے وہی کیفیت پیدا ہوگی جوز خمول کے اندر تیز دوائیس پیدا کرتی ہیں۔ جوڑی کے بعد سخت بخار آئے گا۔ مریف کو بوجھ محسوس ہوگاکیونکہ خلط ایک ہی جگہ مجتمع ہوگی۔ اس دن سے لیکر بیسویں، چالیسویں اور ساتھویں دن تک پھوڑے کے سے نظار کریں۔

پیپ پڑنے کے خالص اعراض یہ ہیں کہ خلط تین مرحلوں سے گذرے گا۔ ا۔جوڑی، ۲۔ ثقل، ۳۔ سخت بخار۔ شوصہ کی بیاری سے بھی زیادہ۔ پیپ سینہ کی دونوں تجویفوں میں سے آخری تجویف

میں جمع ہوگ۔ پھیپرواکھل گیا ہو تو ممکن ہے کہ کبھی دونوں طرف جمع ہو اور صرف ایک جانب۔
پیپ کس جانب مجتمع ہوئی ہے اس کا پتہ اس جانب شدت حرارت ثقل سے چلے گا۔ مریض کو کسی
ایک پہلوسلا نمیں۔اگر اس نے بالائی جانب میں ثقل محسوس کیا تو پیپ اس جانب ہوگ۔ پیپ پڑنے
کی ابتداکا اندازہ انہی علامات ہے کریں جنہیں ہم نے بیان کیا ہے۔ یعنی جوڑی پہلے سے زیادہ شدید
بخار، اور ثقل۔ باتی جن مریضوں کے اندر مرض معظم ہو چکا ہو تو اس کا معاملہ بالکل روشن ہوگا۔
علامات زور دار ہوں گی جو حسب ذیل ہوں گی۔ مسلسل بخار۔ دن میں چھپا ہو ابار یک مگر دات میں تیز
تر۔ بیجد پسینہ کا آنا۔ کھانسی سے آرام محسوس کرنا۔ کوئی قابل اعتباج نے خارج نہ کرنا۔ آنکھوں کا دھنسا،
مرخسار کاسر خ ہو جانا۔اٹگیوں سے ناخونوں کا ٹیڑ ھا ہو جانا۔اٹگیوں کا گرم ہونا بالحضوص ان کے کناروں
کاگرم ہونا۔ پیروں میں ورم آ جانا کھانے کی خواہش کازائل ہونا۔ جسم میں آبلوں کا پڑنا۔

جن کے پھیپروں میں، یاسینوں کی آخری فضامیں یا دونوں میں یا پہلیوں پر استر کرنے والی جھلیوں کے اندر پیپ جمع ہو جاتی ہے اطباء انہیں اور "مقیمین" کہتے ہیں۔ اس پیپ کا بہ سہولت اور بہ سر عت اخراج نہ ہو تو انجام سل ہو تا ہے۔ سل ہو جاتی ہے تو دائی بخار ہے لگتا ہے جورات میں تیز ہو جاتا ہے۔ حمی دق میں جو لوگ بہتلا ہوتے ہیں ان سب کی کیفیت بہی ہوتی ہے۔ رات میں حمی دق کے اضافہ کی وجہ بیہ ہے کہ اعضاء اصلی زیادہ گرم ہو جاتے ہیں غذا اور نیند کے وقت یہ مرطوب موتے ہیں تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ اعضاء اصلی زیادہ گرم ہو جاتے ہیں غذا اور نیند کے وقت یہ مرطوب ہوتے ہیں تو اس طرح کھول اٹھتے ہیں جس طرح پانی کے اندر پڑنے پر چونا کھول اے بیند ضعف توت کی وجہ سے آتا ہے کیونکہ غذا جسمول سے تحلیل ہو جاتی ہے۔ مریض کے اندر کھانے کا اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے۔ سینہ کے اندر پیپ رکی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک طرح کی امتلائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سینہ کے اندر پیپ رکی ہوتی ہو اس کی وجہ سے ایک طرح کی امتلائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

مریض قابل اعتباء شے کا اخراج اس لئے نہیں کرتے کہ اگر ایسا ہو تو راحت پا جا ئیں۔ مادہ کا گاڑھا پن اور پھیپروے کو گھیر نے والی جعلی کی گافت اور ضعف قوت سب اخراج کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ پیپ کامریض بچتا ہے یاسل میں مبتلا ہو جاتا ہے اسکی سب سے بڑی علامت یہ قرار دیں کہ مریض کے اندر طاقت کیا ہے۔ اگر طاقت موجود ہے تو ممکن ہے کہ تمام پیپ کو خارج کر دے۔ کبھی بذریعہ پیشاب کو وہ خارج کر دیتا ہے۔ پیپ شروع میں کسی نالی کے اندر نہیں بہتی بلکہ اعضاء کی تجویف تحلیل ہوتی ہے تواس کا بہاؤ ہونے لگتا ہے۔ ایک شخص کو جس کے سینہ کے اندر پیپ پڑچکی تحقی میں نے خودد یکھا کہ وہ پیپ کا پیشاب اور پائٹانہ کر رہا تھا۔ اس طرح وہ ہلکا ہوگیا۔ اس کا پھوڑا پھٹ کر سینہ کی تجویف میں جمع ہوگیا تھا۔

آ تکھوں کا اندردھنس جانا، یہ تمام حمیات مز منہ بالحضوص اس بخار کا جس کی یوست شدید ہوتی ہے لازمہ ہے۔ رخیار کی سرخی پھپھوڑے کے اندر پیداشدہ حرارت کا نتیجہ ہوتی ہے نیز کھانی بھی یہ کیفیت پیداکردیتی ہیں۔ یہ دونوں باتیں ملکر چبرے اور پورے سر کو سرخ کردیتی ہیں سرکی جانب پھپھوڑے کے اندر موجود مواد ہے ابخرات اٹھتے ہیں اس لئے وہ سرخ ہوجاتا ہے ناخن فیڑھے ہوجانے کا سبب یہ ہے کہ ناخن کاوہ گوشت گل جاتا ہے جواسے دونوں طرف سے اپنی جگہ پر مضبوط رکھتا ہے۔ انگلیال گوتمام بخاروں ہیں سر دہوجاتی ہیں گر دتی بخاروں ہیں گرم رہتی ہیں کیونکہ یہ بخار اعضاء اسلیہ کے اندر ہوتے ہیں۔ گرمی ہیرون سے زیادہ انگلیوں کے اندرونی حصول ہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں رطوبت ہوتی ہے۔ پیراس لئے متورم ہوجاتے ہیں کہ اعضاء کی موت یہیں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ دل سے یہ دور ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی خواہش اور قوت غاذیہ بھی مرجاتی ہے۔ جم کے اندر چھالے اکال یہ دور ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی خواہش اور قوت غاذیہ بھی مرجاتی ہے۔ جم کے اندر چھالے اکال یہ دور ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی خواہش اور قوت غاذیہ بھی مرجاتی ہے۔ جم کے اندر چھالے اکال یہ دور ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی خواہش اور قوت غاذیہ بھی مرجاتی ہے۔ جسم کے اندر چھالے اکال یہ دور ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی خواہش اور قوت غاذیہ بھی مرجاتی ہے۔ جسم کے اندر چھالے اکال یہ دور ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی خواہش اور قوت غاذیہ بھی مرجاتی ہے۔ جسم کے اندر چھالے اکال

پھوڑے جلد پھٹے گایا دیر میں اس کا اندازہ در د، سوء تنفس، اور کھانسی ہے ہوگا۔ چنانچہ در د، سوء تنفس اور کھانسی جلد شروع ہو گئی ہے تو پھوڑا پیپ پڑے کے بعد تقریباً ہیں دن میں پھٹ جائے گا۔ یہ اعراض دیرے رونما ہول گے تواس مدت کے بعد ہی پھٹے گا۔ پھٹنے سے پہلے در د، سوء تنفس اور اخراج مادہ میں اضافہ ہوگا۔ (جالینوس)

پھوڑاجلد پھٹے گایاد ہرینیں؟اس کاانحصار در د ،عسر تنفس اور کھانسی پر ہے تفصیل ہیہ ہے کہ اگر بیہ ہاتمیں مسلسل اور زور دار ہول.....( جالینوس)

تو پیپ پڑنے کے بعدیہ خبر دیں گی کہ پھوڑاجلد پھٹے گا۔ورنہ تاخیر ہو گی(مؤلف) پیپ پڑنے سے پہلے اگریہ ہاتیں مسلسل اور زور دار ہیں تو پھوڑاجلد پھٹے گا۔ برعکس حالت برعکس انجام پیش کرے گی۔(مؤلف)

مادہ پھٹے گا تو لاز مامتصل حصہ جسم میں فساد پیدا کرے گا،اس سے سوزش، بیش در د،اور در د کے زیادہ ہونے کی وجہ سے عشر نفس بھی بڑھا ہو گا۔ کھانسی اس پتلی پیپ کی وجہ سے بڑھ جائے گی جو پیپ زدہ مقام سے خارج ہوگی۔(جالینوس)

پیپ زدہ مریضوں میں سب سے محفوظ وہ مریض ہوتا جس کا پھوڑا پھٹتے ہی تیزی سے بخار غائب ہوجائے اور بھوک لکنے لگے۔ جے ذات الرئد کی بیاری ہواور تدبیر علاج کے وقت نچلے مقامات پر پھوڑے نکل آئیں توان میں پیپ پڑجاتی ہے اور یہ ناصور ہوجاتے ہیں، اس کی وجہ سے مریض نج

جاتا ہے۔اس طرح کے پھوڑے جو بیر ونی جانب پھٹتے ہیں ان او گوں میں متوقع ہوتے ہیں جن کی یہی حالت ہوتی ہے۔ یعنی بخار لگار ہتا ہے (بقر اط)

بخار لگاندر ہے توخلط کے اندرستی ہو گیاورد ریا لگے گی۔ (مؤلف)

جن مریضوں کے درد میں سکون نہیں ہو تا ہے وہ اس لئے کہ اگر درد میں سکون ہو جائے تو بیاری پر سکون ہو گی۔ طبیعت پھوڑ اپیدا کر کے بیاری کااز الدنہ کرسکے گی۔اس کے لئے مسلسل محلیل ے اے کام لینا پڑے گا۔ بیشاب کی مقدار زیادہ ہو گی نہ اس میں کثرت ہے رسوب ملیں گے کیونکہ یہ بات ایک ایسے بھے کی علامت ہے جس کے باعث طبیعت پھوڑا بنانے سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ تھوک کا اخراج بھی مناسب نہ ہو گا کیو نکہ مناسب ہو تو پھوڑا بنانے کی ضرورت بھی نہ ہو۔ نیز شکم ہے ڈھلک کر آنے والی چیزیر غالب، خالص صفراء نہ ہو گا کیو نکہ اس طرح کی بیاریاں گرم ہوا کرتی ہیں۔ بحران بھی اس کی وجہ ہے پھوڑے کے ذریعہ نہیں بلکہ اسہال وغیرہ کے ذریعہ ہوگا۔ یہ تمام باتیں مذکورہ بیان کے مطابق اور دیگر علامات سے سلامتی کی خبر دے رہی ہوں تو پھوڑے بننے کی توقع کریں کیونکہ ایسی صورت میں طبیعت اس بات ہے بے نیاز نبہ ہوگی کہ کوئی محسوس طرح کے ازالہ کی توقع کرے۔وہ اس لئے کہ بیاری بالکل سکون میں نہیں ہوتی،لہذانہ سختی کے ساتھ ازالہ کر سکے گی، نہ ہی اتنی گری ہوئی اور کمزور ہو گی کہ ازالہ بالکل نہ کر سکے۔ بلکہ حالت متوسط ہو گی،لبذا ازالہ بھی متوسط ہو گا۔ یہ پھوڑے کہال پیدا ہول گے ، کیا چھا تیول کے یاس ؟ سینہ کے نیچے۔ نیچے انہی مریضوں میں پیدا ہوتے ہیں جو پہلیوں کے سروں کے نیچے التھابی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ جن مریضوں کی پسلیوں کے سرول کے بنچے نہ در دہو، نمسلسل غلظت، اور پھر سوء تنفس عارض ہو تو ان میں کسی طرح کی پیپ نہیں ہوتی۔التھابی کیفیت بغیر کسی ظاہری سبب کے پر سکون ہوجائے تواس کا مطلب سے ہے کہ پھوڑے چھاتیوں کے اوپر مائل ہورہ ہیں، ذات الرئہ کی بیاریوں میں جو پھوڑے بڑے، خطرناک اور زور دار نکلتے ہیں وہ سب کے سب سفید ہیں۔ سب سے افضل پھوڑاوہ ہے کہ جو اخراج مادہ کے بعد نکلے۔اس کے اندر تغیر نمایاں ہو تا ہے اور حمرہ ہے' لیجے'' (پیپ پڑنے) کی جانب منتقل ہو چکا ہو تاہے۔(بقراط)

سرخ ہویازر دیا کسی رنگ کا بہر حال پہلی حالت سے منتقل ہو جانا ضروری ہے۔ (مؤلف) کیونکہ یہ علامات غایت درجہ سلامتی کی ہیں۔ پھوڑا بہت جلد زائل ہو جائے گااگریہ بات نہ ہو، نہ ہی پیشاب گاڑھااور اس کے اندر عمدہ رسوب ہول تو گومریض صحتیاب ہو جائے مگر پھوڑا اس

جوڑ کو .....(۱) کئے بغیر نہیں رہ سکتا جس کے اندر وہ پیدا ہوا ہو تا۔ اس طرح کے پھوڑوں میں شدید سرخی اس لئے ہوتی ہے کہ مقام مرض ہے وہ ددر ہوتے ہیں۔ پیٹاب اور تھوک کے تغیر کے بعدیہ پھوڑے بہتر اس لئے ہوتے ہیں کہ بچھے دور ہوجاتے ہیں (بقراط)

یہ پچوڑے جس جگہ پیدا ہوتے ہیں وہاں کم مفزاس کئے ہوتے ہیں کہ ناپختہ ہونے کے مقابلہ میں پختہ ہونے کی صورت میں کم برے ہوتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ناپختہ حالت میں ان کا انصباب ہو تا ہے توزخم خراب ہوتے ہیں۔ یہ پچوڑے اور بصاق (تھوک) کے ذریعہ مناسب اخراج مادہ کی راہ میں روکاوٹ بنیں، پھر بخار بھی لاز مار ہتا ہے اس لئے یہ کیفیت ردی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں مریض کا فاسد العقل ہو جانا اور موت کے گھاٹ از جانا لازم ہے کیونکہ اس حالت کے ندر پھوڑوں کا اندر دھنسا ہوا ہو تا یہ خبر دیتا ہے کہ اخلاط جسم کی گہر ائی میں چلے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان مریضوں کے اندر سے پیچیوڑے کی جانب پلیس گے۔ پچوڑے اندر کسی خبر کے تحت دھنس گئے ہیں تو بخار میں سکون ہو جائے گا۔ یہ کیفیت اخراج مادہ کے ذریعہ شفیہ کے بعد ہوگ۔ تا ہم اے دھنسا نہیں بلکہ شخلیل اور صحتیاتی کہیں گے۔ (بقر اط)

یہ اخلاط دوبارہ پھیپھڑے کی جانب پلٹیں گے توان کازخم کمزوری کی وجہ سے زیادہ سخت ہوگا۔ سوء تنفس شدید تر ہوگا۔ تجاب پر شدت کازخم پہونچنے سے عقل فاسد ہو جائے گی (مؤلف) ذات الرئہ کی وجہ سے پیدا ہونے والا پھوڑا نوجوانوں کے مقابلہ میں بوڑھوں کے لئے زیادہ مہلک ہے۔ باتی دیگر پھوڑے۔(بقراط)

مرادذات الجنب اوران گوشول کے اندر پیدا ہونے والے پھوڑے۔ یہ نوجوانوں کوزیادہ ہلاک کرتے ہیں۔ ذات الرئے ہے نجات تواس کئے حاصل ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مادہ کا اخراج ہویہ اخراج سخت طاقت کا طالب ہے۔ نوجوان طاقتور ہوتے ہیں اس کئے وہ زیادہ تراس سے نجات پاجاتے ہیں کیونکہ اپنی طاقت کی وجہ ہے وہ مادہ کا اخراج بہ سرعت کردیتے ہیں۔ ذات الجنب کی بیماری نوجوانوں میں شدت کی ہوتی ہے۔ اس میں اان کے مزاجوں کا دخل ہوتا ہے۔ اس کئے امراض بڑھ جاتے ہیں، بوڑھے حضرات اپنے مزاج کے سبب زیادہ پر سکون ہوتے ہیں اس کئے وہ اس بیماری کے اندر زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔ (مؤلف)

ذات الرئد كے اندر تمام تر سہار ااس بات پر ہو تا ہے كہ پھپچر سے اندر جو پچھ موجو دہ وہ نكل جائے كيونكه ماده در اصل اى پھپچرات ميں ہو تا ہے اور ابتداور م حارے ہوتی ہے كيونكه ذات

<sup>(</sup>۱)عبارت واضح تبين ب

الرئة كہتے ہى اس حالت كو ہيں جس ميں ورم حار خود پھيپھڑے كے اندر پيدا ہو اور اى ميں پيپ پڑتی پرجائے۔ ذات الجنب ميں ورم كى ابتدا پسليوں كو ڈہا كئے والی جعلی ہے ہوتی ہے اور اس ميں پيپ پڑتی ہے۔ لہذا مناسب سے ہے كہ سلامتی كی علامات زيادہ تر اخراج مادہ كى آسانی كے پیش نظر ماخوذ ہوں۔ ذات الجنب كے اندر جيسا كہ ہم ذكر كر يچكے ہیں سلامتی كی علامات ورم كے ساكن ہونے اور مادہ ورم ہے خارج ہونے کے پیش نظر اخذ كی جائيں۔ (مؤلف)

مثلاً کی مریض میں کوئی پھوڑا پیپ بننے کے بعد چالیسویں دن پھٹے اور مریض کی حالت پر غور کرنے کے بعد معلوم ہو کہ اس کا ورم حرارت اور برودت کے در میان معتدل خلط ہے اور معتدل وقت یا عمر میں بنا ہے۔ ایک دوسرے مریض میں ساٹھ دن کے اندر پھٹتا ہواد یکھیں اور یہ معلوم ہو کہ اس کا ورم خلط بارد، جلکے بخار، رطوبت، اور سوء مزاج بارد، کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح کسی کا ہیں دن کے اندر اور بر عکس ازیں پائیں تو یہ اسی اصول کے مطابق ہوگا۔ جس مریض کا پھوڑا تمیں اور پچاس دن وغیرہ میں جس کو بیان کیا جا چکا ہے اس کے تمام حالات پر غور کرنے سے حقیقت پوشیدہ نہ دے گی۔ اس عضو کو بھی معلوم کیا جا سکتا ہے جس میں بیپ وغیرہ بنی ہے۔

ا خراج مادہ ذات الجنب میں کسی دن رو نما ہو جائے تو کمی مدت کی علامت ہے۔ بر عکس حالت

برعکس انجام پیش کرے گی۔

کیس نامی ایک شخص کو ذات الجنب کی بیاری ہوگئی آٹھویں دن تک اس نے کوئی چیز خارج مہیں کی۔البتہ خٹک کھانسی کھانسیارہا۔ چونتیہ ویں دن بحر ان آیا حالا نکہ اس کے مرض کا بحر ان بالعوم چودھویں آ جاتا ہے۔ آگے بڑھاتو بیسویں دن آگر رہتا ہے۔ تین دن سے پہلے اس مریض نے پچھادہ خارج کیا ہو تا تو بحر ان ساتویں یانویں دن آتا۔ زیادہ سے زیادہ اگیار ہول دن آتا۔ تیمرے دن اخراج مادہ کی ابتدا ہوگئی ہوتی تو بیاری چودہ دن سے آگے نہیں بڑھتی۔ وجہ یہ ہے کہ جن اعضاء کے اوپر کثیف سطح نہیں ہوتی مثلاً جسم پر ظاہری جلد کا ہونا۔ ان کے اندر پیدا ہونے والے اورام حارہ داخلی اعضاء کے اندر پیدا ہونے والے اورام حارہ داخلی اعضاء کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو ابتداء میں پٹی پیپ کارٹر خج ہوتا ہے، پھر وہ گاڑھی ہوجاتی ہے۔ ظاہری اعضاء میں پیدا ہونے والا ورم جب جلد کے اندر ہوتا ہے تو یہ رقیق شے گاڑھی ہوجاتی ہے۔ ظاہری اعضاء میں میدا ہو خاتا ہے تو یہ رقیق شے گاڑھی ہوجاتی ہے۔ کہور تی گاڑھی ہو تا ہے۔ یہی معاملہ داخلی ورم کا بھی ہو تا ہے۔ مریض جب کوئی چیز خارج نہیں کر تا تو اس کامر یض بیعد کے بادر جو تا ہے کیونکہ اس کی مثال اس خارجی ورم کی ہے جس سے کسی چیز کار شح نہیں ہوتا۔ خارج ہونے ہونے کیا ہوتی ہوتا۔ خارج ہونے ہونے کی بیکونکہ اس کی مثال اس خارجی ورم کی ہے جس سے کسی چیز کار شح نہیں ہوتا۔ خارج ہونے ہونے کیا ہونے ہوتا۔ خارج ہونے ہونے کیا ہونے ہوتا۔ خارج ہونے کوئی ہونے کیا ہونے ہوتا۔ خارج ہونے ہونے کیا ہونے ہوتا۔ خارج ہونے کوئی ہونے کیا ہونے ہوتا۔ خارج ہونے کیا ہونے ہوتا۔ خارج ہونے کوئی ہونے کارٹر خواتا کیا کہ خارج ہونے کیا ہونے ہوتا۔ خارج ہونے کیا ہونے کوئی ہونے کیا ہونے کوئی ہونے ہونے کی کین کی کی کوئی ہونے کارٹرے نہیں کر خارج نے خارج ہونے کار خواتا ہونے کیا ہونے کوئی ہونے کار جانے کوئی ہونے کارٹرے کوئی ہونے کارٹرے کوئی ہونے کیا ہونے کوئی ہونے کیا ہونے کوئی ہونے کیا ہونے کوئی ہونے کارٹرے کوئی ہونے کیا ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کیا ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کیا ہونے کوئی ہونے کیا ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کیا ہونے کوئی ہونے کیا ہونے کوئی ہونے کی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کوئی کی کوئی کی کوئی کو

والا مادہ اگر رقیق ہوگا تو عدم پختگی کے دوسرے درجہ میں، اور پہلے سے زیادہ گاڑھا ہوگا تو تیسر سے درجہ میں ہوگا۔ خارج ہونے والا مادہ اگر غلیظ اور گاڑھا ہوگا تواسے پختہ کہیں گے۔ یہی حال اس وقت ہوتا ہے جب مریض مساوی الا جزاء اور سفید تھوک خارج کر تا ہے اور اس حالت کے اندر اپنی بیاری کے تمام ایام میں پتلے بین اور گاڑھے بن کے در میان رھتا ہے، یہی بھی کامل ہوتا ہے۔ اس طرح مادہ کا رک جانا ایک ایسی علامت ہے جو اصلا بھی خبر نہیں دیتی۔ مریض جب رقیق شے خارج کرنے لگتا ہے تو کمزور بھی ہوتا ہے خارج ہونے والے مادہ کارنگ شوخ سرخ، یاسیر شدہ زر دہو تو یہ محمود نہیں ہوتا خاستری، زنجاری یا سیاہ ہو تو ہلاکت کی سب سے بردی علامت ہے۔

استنقاء کے ہمراہ بخار ویباہی ہے جیسے نفث الدم کے ہمراہ ذات الجنب کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے برنکس ہیں ،نفث الدم کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ داخل طور پر اخلاط کو روکا جائے اور ذات الجنب اس بات کا مختاج ہوتا ہے کہ اخلاط کو خارج کیا جائے اور مادہ کو آسان اور بسر عت نکل جائے گیراہ پیدا کی جائے۔ (جالینوس)

سینہ کی فضا کے اندر پیپ جب زیادہ مقدار میں یکبارگی داخل ہو جاتی ہے تواختناتی کیفیت پیدا کردیتی ہے۔ذات الجنب کی بیاری چودہ دنوں کے اندر صاف نہ ہو جائے تو انجام کار پیپ بنے لگتی ہے۔ایسی صورت کے اندر پھوڑا بھٹنے کے بعد چالیس دنوں میں مریض کا تنقیہ ہو جائے تو بیاری ختم ہو جاتی ہے ورنہ مریض سل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔(جالینوس)

پیلیوں پر استر کرنے والی جھلی کے اندر بنے والا پھوڑ ااخراج مواد کے ذریعہ صاف ہو جائے تو پیپ نہیں بنتی، مریض صحت ہے ہو جاتا ہے۔ صاف نہ ہو پیپ بنتی ہے اور پھننے کے بعد مریض پیپ خارج کرتا ہے۔ چالیس دنوں کے اندر پیپ صاف ہو جائے تو مریض نیج جاتا ہے۔ ورنہ پیپ سے پھیپیرٹے کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔

درد کے بیش ہونے سے علامت حاصل کی جاستی ہے پہلیوں کے اندر بیش در دہو تو پہلی بات سے ہوگی کہ بیماری پہلیوں پر استر کرنے والی جعلی کے اندر ہوگی اور خطرہ سے دور نہ ہوگی۔اس کے لئے بیاری کے مطابق طاقتور علاج کی ضرورت ہوگی۔ در دکا حال ہے ہو کہ بنسلی تک پہونچ رہا ہو تو فصد کی ضرورت ہوگی، نیچے، پہلیوں کے سرول کے نیچے ہور ہا ہو تو مسہل دینا ضروری ہے۔ در دتھوڑا ہو اور اس حد تک محسوس نہ ہور ہا ہو کہ اس کا اثر بنسلی تک پہونچ نہ پہلیوں کے سرول کے نیچ تو ممکن ہونے نہ پہلیوں کے سرول کے نیچ تو ممکن ہورا ہو۔ اس لئے بے خطر ہے۔ کسی بڑے علاج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ (مؤلف)

درد میں چین اس لئے ہوتی ہے کہ وہ پسلیوں پر استر کرنے والی جھلی کے اندر ہوتا ہے او پر اور نیچے بھی جاسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ذات الجنب اور ذات الرئہ کے مریض کو دست آنے لگتا ہے تو یہ خراب کیفیت ہوتی ہے۔ (مؤلف)

دست جب ذات الجنب اور ذات الرئد میں آتے ہیں اور کم آتے ہیں تو پیشتر ہضم کی علامات موجود ہونے کی صورت میں مفید ہے۔ بر عکس ازیں بیار کے ضعف و نقابت کے وقت آخر میں آرہے ہو تو شرکت کے طور پر ضعف بحد کی وجہ ہے ہو تا ہے۔ ایسی صورت میں بید چلنے لگتاہے جو ردی علامت ہے۔

پیپ زدہ مریضوں کو کی اور آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے بشر طیکہ سینہ کی فضا پیپ سے پر ہو چکی ہو۔ایسے مریضوں کو سخت منگل شفس لاحت ہوتی ہے۔ عشفس کے سبب بھی انہیں داغنے کی ضرورت ہواکرتی ہے۔ کشھی ڈکاروالوں کوذات الجنب تقریباً نہیں ہوتا۔

ہم یہ بات کہ چے ہیں کہ ذات الجنب، پہلیوں پر استر کرنے والی جھلی کے ورم کانام ہے۔ نیز یہ خارج ہونے والے مادہ کے رنگ ہے ورم پیدا کرنے والی خلط معلوم کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ مادہ جھاگ دار ہوگا تو خلط بلغی، ماکل بہ سیابی ہوگا تو خلط سوداوی، سرخ، زر دیاما کل بہ زر دی وسرخی ہوگا تو خلط صفراوی، اور سیر شدہ سرخ ہوگا تو خلط د موی ہوگا۔ مؤ خر الذکر مادہ خود خون پیدا کر تا ہے۔ یا پھر پہلیوں کو ڈہا گئے والی جھلی سخت اور کثیف ہوتی لہذاوہ صرف لطیف صفراوی خلط بی قبول کرتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ جن کے مزاج پر بلغمیت غالب ہوتی ہے اٹھیں ذات الجنب کی بیاری شاذ و مادر بی ہوا کرتی ہے اٹھیں ذات الجنب کی بیاری شاذ و مادر بی ہوا کرتی ہوا کرتی ہے اٹھیں ذات الجنب کی بیاری شاف و مادر بی ہوا کرتی ہوا کرتی ہے۔ کہ جن کامز ان خرم ہوتا ہے۔ جس شخص کو کشی کو کاریں آتی ہیں اس پر غالب بلغم ہوتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ جن کامز ان خرم ہوتا ہے انہیں شوصہ کی بیاری کم بی لاحق ہوتی ہے۔ ابھیہ تمام امر اس جو ذات الرک کی وجہ ہے لاحق ہوتے ہیں وہ خراب بیاری کم بی لاحق ہوتی ہے۔ ابھیہ تمام امر اس جو ذات الرک کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں وہ خراب بیل کہ درم برااور خلط زیادہ ہے۔ پیپ زدہ مریضوں کو داغنے کے بیت بعد صاف سفید پیپ نکلے تو محفوظ رہتا ہے۔ گرم بد بو دار پیپ نکلے تو ہلاک ہوجاتا ہے۔ قدماء پیپ بعد صاف سفید پیپ نکلے تو محفوظ رہتا ہے۔ گرم بد بو دار پیپ نکلے تو ہلاک ہوجاتا ہے۔ قدماء پیپ زدہ مریضوں کو داغا کرتے ہے تا کہ سینہ اور پھیچوٹ کے در میان جن شدہ پیپ خارج ہوجائے۔ فدماء پیپ

کرنب سوختہ کرکے اس کی راکھ پیپہ خریس شامل کریں اور ماؤف پہلوپر صاد کریں تواس سے در دمیں فوری سکون ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)

ذات الجنب كامرض طاقتور ہوتا ہے تو در د بالعموم مراق شكم كے ينچے سے بنلى كى بڑيوں تك

پہو پنچتا ہے اور پہلو میں منتقل ہو کر بیار پسلیوں میں پھیلتا ہواان پسلیوں تک پہو پنچتا ہے جو بیار نہیں ہو تیں ۔ذات الجنب کے بعد بالعموم صفراوی مادہ خارج ہو تاہے گر ذات الرئه کے بعد بلغمی مادہ کا اخراج ہو تاہے۔(اغلوقن)

ورم حاربیلیوں پر استرکرنے والی جھلی کے اندر ہے یا پھیپر وے کے اندر، اس کا امتیاز نبض کے ذریعہ ہوگا۔ ورم جھلی کے اندر ہے تو نبض صلب اور بیحد تن ہوئی ہوگی۔ ورم رئے میں ایبا نہیں ہوتا۔ پیپ زدہ مریض کھانسی کے ذریعہ دن میں چھیا آٹھ کمیال یعنی قوطولی جو نواہ قیہ کا ہوتا ہے بیپ خارج کرتا ہے کبھی اس سے زیادہ بھی خارج کرتا ہے۔ پیپ کا داخلہ قصبة الرئے کے شعبوں میں کیسے ہوتا ہے۔ یہ اس کا تذکرہ ہم نے طبیعی مباحث کے اندر کیا ہے یہ طب کا موضوع نہیں ہے۔ ذات الجنب میں جو با تیں لاز ما موجو در ہتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

گرم بخار، در د، جس میں مریض تناؤیا چیجن محسوس کر تاہے۔تنف صغیر متواتر، نبض صلب بالعموم نگدے نہ سمجھ بھی ہ

رنگین کھانسی بھی یہ خٹک ہوتی ہے۔

جس ذات الجنب میں کوئی مادہ خارج نہیں ہو تا اے ذات الجنب خٹک کہتے ہیں، اس توعیت کا ذات الجنب دیگر ذات الجنب جس میں مادہ خارج ہو تا ہے کے مقابلہ میں زیادہ دیرے تحلیل ہو تا ہے، یا پھر اے علاج کی خرورت ہوتی ہے۔ اس کے اندر درد بھی ایک بار بہنی کی ہڑیوں اور دوسر کی بار پہنی کی خروں اور دوسر کی بار پہنی کی خروں تا ہے پہلیوں کے اندر دیگر توعیت پہلیوں کے سروں تک پہو پختا ہے۔ تنفس لا محالہ صغیر متواتر ہوتا ہے پہلیوں کے اندر دیگر توعیت کے درد بھی ہوتے ہیں جن کے منابہ ہوتے ہیں دونوں کے در میان امتیاز کوئی چیز قطعاً خارج نہیں ہوتی۔ یہ درد ذات الجنب ختک کے مشابہ ہوتے ہیں دونوں کے در میان امتیاز کریا آسان ہے۔ مؤ خرالذ کریس کھانی بالکل نہیں ہوتی گر ذات الجنب میں کھانی کا آتا لازم ہے۔ کھانی کے ساتھ یا تو مادہ خارج ہوگیا وہ خٹک ہوگا۔ نبض میں نہ تناؤ ہوگا نہ صلابت۔ نہ ہی حرارت کھانی کے ساتھ یا تو مادہ خارج ہوگیا وہ خٹک ہوگا۔ نبض میں نہ تناؤ ہوگا نہ صلابت۔ نہ ہی حرارت باہر سے مقام تکلیف پر دباؤڈالیں گے تو در دہوگا۔ کوئی مادہ خارج نہ ہوگا کہ تنظیہ ہوسکے کیو نکہ درم پیدا کرنے والی خلط میں ترقیح ہوتا ہے۔ نہ وہ پھٹی ہے کہ پھٹ کر سینہ کی فصامیں موادا کھا ہو باہر کی جانب باہر سے مقام تکلیف پر دباؤڈالیں گے تو در دہوگا۔ کوئی مادہ خارج نہ ہوگا کہ تعظیہ ہو سے کیو تکہ ور ہوگا۔ کوئی مادہ خارج نہ ہوگا کے مقابل ہو جائےگا۔ ربائیوس

یے گفتگوان پھوڑوں کے سلسلہ میں ہے جن کا میلان خارج کی طرف ہو تاہے۔ یہ بھی ذات الجنب کی ایک فتم ہے۔ اس کے اور اس ذات الجنب کے در میان امتیاز کریں جس کا میلان اندر کی جانب

ہو تا ہے۔ یہی ذات الجنب حقیقی ہو تا ہے۔ (مؤلف)

بر با ہے۔ ہی و سال کی تاک پتلی، اس کاسر اتیز، کنپٹیاں چیٹی، آ تکھیں دھنسی ہوئی، شانے اور بازو لئکے ہوئے، کیا معلوم ہوں گے جیسے پر ہوں۔ (جالینوس)

ذات الجنب کے مریض کو تکمید ، فصد مسہل ، ماء العسل ، شراب ، جو کا دلید ، کی ضرورت ہوتی ہے۔ گر ان اشیاء کو دینے کے لئے مختلف او قات اور اسباب ہوتے ہیں تکمید کی ضرورت اس وقت ہوتی جب در دیسلیوں کے اندر محسوس ہو کیو نکہ اسوفت یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بیار کی ذات الجنب کی ہیار کی ذات الجنب کی ہیا کوئی اور ہے۔ تکمید سے تجربہ کیا جاتا ہے۔

ذات الجنب کی بیاری نہ ہوگی تو تھمید نے جاتی رہے گی تھمید سے نہ جائے، اپنی جگہ ثابت رہے اور در دکے اندراضافہ ہورہا ہو تو پھر دیگر بیاری پر غور کریں گے۔ بید دیکھیں کہ دوا کھانے سے پیشتریا اس کے بعد ، یادست آنے کے بعد ، یادست آنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیگر چیزیں جن کا تذکرہ ہم نے کتاب ماءالشعیر میں کیا ہے وہاں ہم نے نقل کر دیا ہے۔ بعنی کے فصد کی ، کے مسہل کی ، کے ماءالعسل کی ، کے ماءالعسل کی ، کے ماءالتعمر اور کے جمام کی ضرورت ہواکرتی ہے

شوصہ کے مریضوں کے لئے خربق کے ساتھ بقراط نے جس مسہل گولی کا تذکرہ کتاب الامراض الحادہ کے اندر کیا ہے وہ حسب النیل ہے۔ادویہ مسہلہ کے پہلے مقالہ کے اندر ہم نے اے پڑھا ہے۔(جالینوس)

جس پھوڑے کی وجہ سے پیپ سینہ کے اندر اکٹھا ہوتی ہے وہ تجاب یا پسلیوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ سکون کی حالت میں بخار، تمدی (تناؤ) التھابی کیفیت، اور سکی تنفس اور پھوڑا پھٹنے کے وقت جوڑی، اور کھانسی آتی ہے۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے انگلیاں گرم ہو جاتی ہیں۔ پھوڑے کم ہوں اور طاقت زیادہ تو مریض انہیں خارج کر دیتا ہے زیادہ ہوں تو خارج ہو سکیں گے۔ بھی بول و براز کے راستہ خارج ہو جی ، بھی تجاب کو خراب کر دیتے ہیں اور اختناقی کیفیت پیدا کرکے موت طاری کر دیتے ہیں۔ پھوڑے کس پہلو میں اس کا پنہ بو جھ اور مقام ماؤف پر اضطرابی کیفیت سے چلے گا۔ جو غیر ماؤف پہلو کے ہی سونے پر پیدا ہوگا۔ آواز کے اندر اضطراب ہوگا تکلیف دونوں پہلوؤں کے اندر ہو تو سام ماؤٹ ہوگا تکلیف دونوں پہلوؤں کے اندر ہو تو سام سے دونوں کے اندر ہو تو

علاج:

جن مریفول کے سینول کے پھوڑے تحلیل ہوتے نظرنہ آئیں ان کے پھوڑول کو صاد تین

جیسے ضادول سے پختہ کریں۔ ماء العسل ماء الیتن، اور زوفائے خشک کاجوشاندہ دیں۔ پختہ ہونے کے بعد پیپ لانا مقصود ہو تو طاقتور قاطع اشیاء دیں۔ بوقت خواب حب فاوانیادیں۔ طلق کے اندر کسی نکل کے ذریعہ لبنی کا بخور کریں۔ میرے خیال میں تئے آور دوانہ دیں کیونکہ اس سے بھی بہت بڑا شگاف ہوجاتا ہے جس سے بہ کشرت مادہ بہہ کر اختناتی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ بیپ او پر چڑھنا شروع ہو تو ملطفات کے ذریعہ اس کی مدد کریں۔ ہضم کامل شروع ہوجائے اور بیاری انحطاط پر ہو تو پیپ کے سطفات کے ذریعہ اس کی مدد کریں۔ ہضم کامل شروع ہوجائے اور بیاری انحطاط پر ہو تو پیپ کے سفتیہ کے لئے مثر ودیطوس اور آیاتی افاعی سے عمرہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ بخار نہ ہونہ جسم کمزور ہواور بیپ اس قدر زیادہ ہو کہ خارج نہ ہوسکے تو سینہ کے اندر لوہے کی مکواۃ سے سوراخ کرکے خارج کریں، پھر علاج کردیں۔ (ابن سر ایوں)

میرے خیال میں جو ل ہی پہلو کے اندر پھوڑے کا اثر رو نما ہو مقابل کے ہاتھ کی فصد کھولدی
جائے اور ایک دن میں تین بار تھوڑا تھوڑا کر کے خون نکالا جائے اس طرح دوسرے اور تیسرے دن
بھی کی بار نکالا جائے۔ رکیس بھی کھول دی جائیں۔ اس کے بعد ماؤف پہلو کے نچلے پیر کی فصد کھولی
جائے اور اس پر مچند لگایا جائے۔ بعد از ال ماؤف پہلو کے ہاتھ کی فصد کھولی جائے یہ ساری تدبیر یں
مفید ثابت نہ ہول تو پہلو پر گرم محلل ادویات رکھی جائیں اور پیچنے لگائے جائیں تاکہ پھوڑا باہر کی
جانب تھینچ اٹھے۔ پھوڑے کا میلان بیر ونی جانب ہے تو بہت بہتر ہے، میلان اندرونی جانب ہے تو

ایک ذات الجنب صحیح ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں ورم پسلیوں پر استر کرنے والی جملی کے اندر داخلی طور پر ہوتا ہے۔ علامت یہ ہے کہ مادہ کا اخراج ہوگا۔ دہانے پر پسلیوں کے باہر سے درد کا احساس نہ ہوگا۔ ہیر ونی جانب پیپ بے گی یاورم تحلیل ہو جائے گا۔ اس سے ساتھ اول سے آخر تک مادہ کا اخراج ہوگا۔ ذات الجنب صحیح کے اندر در دہنسلی تک پہونچے تواس کا مطلب یہ ہے کہ ورم حجاب کے بالائی حصہ میں ہے، ہر عکس حالت ہر عکس انجام پیش کرے گی۔ سب سے طویل المدة ورم وہ ہم جس میں اخراج مادہ تو ہو جس میں اخراج مادہ تو ہو گر رقیق ہو۔ اس میں فصد کھولیں گے، ملین اشیال کے ذریعہ طبیعت کو زم کریں گے۔ ملین تھے استعال کریں گے۔ ملین اشیال کے ذریعہ طبیعت کو زم کریں گے۔ ملین حقے استعال کریں گے۔ ملین گا

میرے خیال میں بیاری کے شروع میں فصد مخالف جانب ہی کھولی جائے۔ فراغت کے بعد موافق جانب کی کھولی جائے۔ فراغت کے بعد موافق جانب کی کھولی جائے۔ ملین اشیاءاور ماءالشعیر کے ذریعہ شکم کونرم کریں اس سے کھانسی کے اندر سکون اور اخراج مادہ کے اندر آسانی ہوگی۔شروع میں سینہ پر موم مصفی،روغن بنفشہ کچھ لعابوں

اور کتیر اکااور آخر میں، بابونہ، آرد جو، نیخ خطمی، اصل السوس، اور روغن حل کا صادر کھیں۔ غذامیں ہمیشہ ان چیزوں کی آبیات استعمال کریں جن کے اندر رطوبت اور جلاء کی تاثیر ہو تاکہ پیپ کے اخراج میں آسانی ہو مثلا سبوس گندم اور فائیذ کا خیساندہ روغن بادام کے ہمراہ بخار اور پیاس نہ ہو تو ماء العسل ورنہ شربت بنفخه اور جلاب دیں۔ (ابن سر ابیون)

چکنااور بے بو کا تھوک اس بات کی علامت ہے کہ پھوڑا صاف ہے،اور مندمل ہو ناشر وع ہو گیاہے۔بالخصوص جبکہ اس کے بعد اعراض کے اندر سکون پایا جا تا ہو۔

ذات الجنب اس ورم کانام ہے جو پسلیوں کے اوپر موجود عضلہ کے اندر ہوتا ہے۔ یہ عضلہ بیحد حیاس ہو تاہے اس کادر دشانہ اور بسلی تک پہو پنجتا ہے اور بھی پسلیوں کے بنیچے اتر آتا ہے۔ اس کے ساتھ خشک کھانسی اور بخار جو رات میں تیز ہو جاتا ہے رہتا ہے۔ بھی ہذیانی کیفیت اور سخی تنفس بھی ہو جاتا ہے۔ مریفی ہنیانی کیفیت اور سخی تنفس بھی ہو جاتا ہے۔ مریفی ہوائ کی بلاوی جانب پلٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ بلغی براق، خارج ہو رہا ہو تو مریض کو محفوظ سمجھیں۔ دموی براق کم خطر باک مگر صفر اوی ردی ہوتی ہوائ ہو اور اس کے بھی ردی سوداوی ہوتا ہے۔ بہ کشرت تھوک اور مادہ خارج ہونے کے بعد در داور بخار میں سکون ہوتو عدہ ہے۔ برکس حالت کا انجام برکس ہے۔ مریض پچھ بھی مادہ خارج نہ کرے، سنگی تنفس مسلسل ہو، خر خراہٹ اٹھ رہی ہو، بخار کی جلن تیز ہوتو اس کا مطلب سے ہے کہ موت قریب ہے۔ مسلسل ہو، خر خراہٹ اٹھ رہی ہو، بخار کی جلن تیز ہوتو اس کا مطلب سے ہے کہ موت قریب ہے۔ مسلسل ہو نے تھے دن تک مادہ خارج نہ کرے تو بیاری طول پکڑے گی۔ چوتھے دن سے پہلے مادہ خارج ہونے کا وجلد صحت ہوگی۔ اخراج مادہ کے ذریعہ مریف کا سطیے نہیں ہوتا تو سل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (روفس)

ذات الجنب ایک ورم حار ہوتا ہے بھی پیپ اکٹھا ہوئے بغیر تحلیل ہوجاتا ہے۔اس کے ہمراہ مادہ کا اخراج رقیق پیپ کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس ورم کے اندر پیپ پڑجاتی ........... تو مریض مادہ خارج کرتا ہے۔ای کوسل کہتے ہیں۔(مؤلف)

ذات الجنب زیادہ تر موسم خریف اور موسم سر ما میں عارض ہو تاہے، اور تمام عمروں میں عارض ہو تاہے، اور تمام عمروں میں عارض ہو سکتا ہے۔ عور تول کو تم ہی عارض ہو تاہے؛ بالخصوص ان عور تول کو جن کا حیض مسلسل آتا رہتا ہے زیادہ تربیہ بیاری اس وقت عارض ہوتی ہے جب باد شالی چلتی ہے۔ (مؤلف)

## شوصہ کے لئے عمرہ ضاد کانسخہ:

بشر طیکه شدیدالتهاب اور حرارت موجودنه به عصاره کرنب، آر دحلبه، مخم کتال، محظمی، با بونه

کی شاخیں، آرد حوری سب کو عصار ہ کرنب اور تھوڑے روغن حل میں گوندہ لیں۔اور ماؤف مقام پر رکھیں۔اس ہو ورم منتشر ہو جائے گااور در دمیں سکون ہوگا۔ورم کویہ ڈھیلا کر دےگا۔ (اُھرن)

شوصہ کے مریفنوں میں نبض بیحد متواتر ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بیاری جلد پھیپر وے کی جانب مائل ہوگی۔ حتی کہ ذات الرئے پیدا ہو جائے گایا پھر عثی طاری ہوگا اس بیاری کے اندر قلیل التواتر نبض میں خاص تواتر ہے کم تواتر ہوا کر تا ہے کیونکہ اگر خاص تواتر موجود ہو سبات یا اعصاب کے اندر کسی آفت کے پیدا ہونے کی پیش خبر ک دے گی۔ بیاری کے اندر مختلف مغتاری نبض دیگر اور ام کے مقابلہ میں ذیادہ خصوصیت رکھتی ہے۔اختلاف کم ہو تو پسلیوں پر استر کرنے والی جملی کے اندر تیزی ہے نگے پیدا نہ ہوگا۔اختلاف شدید ہوگا تو یہ مرض کے مشکل اور عمیر النفخ ہونے کی علامت ہوگا۔شوصہ کی یہ حالت ہواور ساتھ میں طاقت بھی زیادہ ہو تو نج میں کافی دیر گے گیا پھر انہا م کار پیپ کا اجتماع ہوگا۔ انتقاف شدید ہوگا۔ پیپ کے مشکل ہونے دبل ہوتا جائے گا۔ بر عکس طاقت کمزور ہوگی تو فوری موت کا باعث ہوگی۔ پیپ کے مشکم ہونے کے بعد نبض کا بنتی جو بی جاتار ہے گااور نبض میں بیپ کے اجتماع کی علامت ملے گی۔ حالت مریض کے دبلے ہونے کی شر وع ہوجائے تو نبض وہ ہوجائے گا۔ والت مریض کے دالت مریض کے دبلے ہونے کی شر وع ہوجائے تو نبض وہ ہوجائے گی۔والت دبول میں ہوتی ہوگا۔ والت مریض کے دبلے ہونے کی شر وع ہوجائے تو نبض وہ ہوجائے گی۔والت دبول میں ہوتی ہے۔

شوصہ ایک ورم حار ہوتا ہے جو پسلیوں کوڈ ہا تکنے والی جھلی کے اندر داخلی طور پرپیدا ہوتا ہے۔

اے پسلیوں پر استر کرنے والی جھلی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد بخار ہوتا ہے کیو تکہ درم دل

عرب ہوتا ہے۔ چو نکہ بخار گرم ہوتا ہے اس لئے نبض سریع ہوجاتی ہے اور چو تکہ متورم عضو
عصبی ساخت کا ہوتا ہے اس لئے نبض واضح مقدار کے ساتھ صلب ہوجاتی ہے۔ صلابت کی وجہ سے
بخار کی ضرورت کے مقابلہ میں نبض زیادہ صغیر ہوجاتی ہے۔ تواتر کے ذریعہ برھے ہوئے انبساط کی
بخار کی ضرورت کے مقابلہ میں نبض زیادہ صغیر ہوجاتی ہے۔ تواتر کے ذریعہ برھے ہوئے انبساط کی
اندر تواتر کیاں نبیں ہوتا کیو تکہ ورم کے وقت جوخلط پیدا ہوتی ہے اتفاق سے صفراوی ہوتو بخار زیادہ
تیز اور بالقوۃ زیادہ ہلکا ہوگا۔ بلغمی ہوتو زیادہ سکون ہوگا اور ہنیائی کیفیت اور بے خوابی کی حالت پیدا ہوتے کے مقابلہ میں سبات کا پیدا ہونا قریب تر ہوتا ہے۔

اس جملی کی بیاری میں دماغ کی شرکت بمیشہ رہتی ہے، کیونکہ جواخلاط اس ورم کوپیدا کرتے ہیں ان کے ابخرات دماغ تک جاتے ہیں ، خلط صفر اوی ہوتی ہے تو دماغ کی جانب ابخرات گرم لطیف دھو کیں کے مانند چڑھتے ہیں۔ اس سے فساد عقل اور بیجان لاحق ہوتا ہے۔ خلط بلغی ہوتی ہے تو گدے کہرے کے مانند بخارات اٹھتے ہیں۔ یہ بدلی کے مانند ہوتے ہیں۔ دماغ تک مجبو نج کریہ اے

مر طوب کردیے ہیں جس سے ثقل اور سبات لاحق ہوجاتا ہے۔ کبھی شدید متواتر نبض غثی کی خبر
دیتی ہے یاور م کھولتی ہوئی خلط حارکی وجہ سے پیدا ہوا ہو توانجام کار میں ذات الرئہ ہو جاتا ہے۔ اس
سے قوی کو نقصان بہو پختا ہے، جس سے غثی طاری ہوتی ہے۔ ورم رئے سے نبض کے اندر تواتر پیدا
ہوجاتا ہے کیونکہ ضرورت بڑھ جاتی ہے اور انبساط کم ہوجاتا ہے۔ ورم کثیر التواتر ہوجاتا ہے تو
پیپیوٹر سے کی جانب ماکل ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یا پھر اس کے اندر شدید حرارت پیدا ہوجاتی ہے اور
شدت کی وجہ سے کھولنے لگتا ہے۔ یہ طاقت کو بیحد خشک کردیتا ہے۔ چنانچہ غثی طاری ہوجاتی ہے
قلت تواتر سے سباب یا عصبی آفت اس لئے لاحق ہوتی ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ورم
پیدا کرنے والی خلط بلغم ہے اور جوابخر ات اس سے اٹھ کر دماغ تک بہو پخ رہے ہیں وہ شخنڈے ہیں
دماغ میں الن ابخر ات کی کثرت ہوجاتی ہے تو دوصور تیں ہوتی ہیں۔ اگر دماغ طاقتور ہے توانہیں دفع
دماغ میں الن ابخر ات کی کثرت ہوجاتی ہے تو دوصور تیں ہوتی ہیں۔ اگر دماغ طاقتور ہے توانہیں دفع
کر کے بعض متصلہ مقامات کی جانب روانہ کر دیتا ہے اس سے عصبی آفت لاحق ہوجاتی ہے اور اگر دفع
کر ناس کے لئے ممکن نہیں ہوتا توسبات پیدا کر تا ہے۔ (جالینوس)

سینہ کے اندر پیپ کا جماع اور دیلے ہونے کی بات کا جہال تک تعلق ہے اس کا تذکرہ ہم نبض کے بیان میں کریں گے۔ یہال جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ اس لئے کیا کہ اس بیاری پر جو گفتگو ہور ہی ہے اس کی جانب کچھ اشارہ ہو جائے (مؤلف)

سینہ اور تجاب کے اندر بلغی اورام پیدا نہیں ہوتے البتہ غلیظ بلغم یہ حالت پیدا کردیتے ہیں کو تکہ بلغی اورام پیدانہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ اعضاء کثیف ہوتے ہیں اور ان اخلاط کو قبول نہیں کرتے۔اورام خلط صفر اوی یا بیحد لطیف خون ہے لاحق ہوا کرتے ہیں تجاب کے اندر ورم ہوجا تا ہے۔ مریض فساد عقل میں جتلا ہوجا تا ہے۔ نبض بیحد صلب، صغیر اور متواتر ہوجاتی ہے۔ ورم تجاب کے بعد شر وع میں بخار نہیں ہوتا فقط در داور حقی تنفس ہوتی ہے بعد از آل فضلات کے اندر جب تعفن پیدا ہوجا تا ہے تو بخار آتا ہے۔ پسلیوں پر استر کرنے والی جعلی کے اندر ورم کی صورت میں نبض صلب، پیدا ہوجا تا ہے تو بخار آتا ہے۔ پسلیوں پر استر کرنے والی جعلی کے اندر ورم کی صورت میں نبض صلب، صغیر اور بیحد متواتر ہو تو مریض حضومیت سے نجات نہ پائے گا گو بیحد صلب ہوالبتہ ذات الجنب کے مریضوں میں عقلی فساد ورم تجاب کے مریضوں کے مقابلہ میں کم ہو تا ہے کیونکہ تجاب کے جو چیز متصل ہوتی ہے وہ درماغ سے قریب تر ہوتی ہے۔ (جالینوس)

# فهرست مطبوعات سینٹرل کونسل فار ریسرچان یو نانی میڈیسن 110058ء انسٹی ٹیوھنل امریا، جنگ پوری، نئی دہلی۔110058

قيت	زبان	ナンプト	نبر
19/00	انگریزی	اے بینڈ بک آف کامن رسمیڈیزان یونانی سٹم آف میڈین	- 1
19/00	U. 385.	اے بیٹ بک آف کامن رسمیڈیزان اون کی سٹم آف میڈین	r
44/00	3,5	اے بیٹ بک آف کامن رسمیڈیزان یونانی سٹم آف میڈین	۳
44/00	تجراتي	اے بینڈ بک آف کامن رسمیڈیزان یونانی سٹم آف میڈین	٣
34/00	اڑیے	اے بینڈ بک آف کامن رسمیڈ بران ہونائی سٹم آف میڈین	۵
34/00	كثر	اے بیٹذ بک آف کامن رسمیڈیزان یونانی سٹم آف میڈین	4
8/00	تىل	اے ہنڈ بک آف کامن رسمیڈیزان ہونانی سٹم آف میڈین	4
9/00	حياتو	اے ہنڈ بک آف کا من رسمیڈ بران ہونانی سٹم آف میڈین	٨
6/00	ہندی	اے ہنڈ بک آف کامن رحمیڈیزان ہونانی سٹم آف میڈین	9
16/00	ويخالي	اے ہند بک آف کامن رسمیڈیزان یونانی سٹم آف میڈین	1-
13/00	اردو	اے ہنڈ بک آف کامن رسمیڈیزان ہونانی سٹم آف میڈین	- 11
7/00	lice	آئینه سرگزشت۔ ابن مینا	ır
26/00	اردو	ر ساله جودیه _ابن مینا(معالجات برایک مخضر مقاله)	11
131/00	اردو	عيوان الانبافي طبقات الاطباء _ ابن الي اصبيعه (جلد اول)	10"
143/00	اردو	عيوان الانبافي طبقات الاطباء ابن الي اصبيعه (جلد دوم)	10
71/00	اردو	كتاب الكليات _ ابن رشد	14
107/00	3,5	كتاب الكليات _ ابن رشد	14
71/00	اردو	كتاب الجامع كمفردات الادومية والاغذبيه _ابن بيطار (جلداة ل)	IA
86/00	اردو	كتاب الجامع كمفردات الادوبيه والاغذبيه _ابن بيطار (جلد دوم)	19
	اردو	كتاب الجامع كمفردات الادويه والاغذييه - ابن بيطار (جلدسوم)	r.
57/00	اردو	كتاب العمده في الجراحت ابن القف المسجى (جلداة ل)	rı
93/00	اردو	كتاب العمده في الجراحت ابن القن المسحى (جلددوم)	rr
169/00	1,00	كتاب المصورى _ زكريارازى	rr
13/00	10.00	كتاب الابدال_زكريارازى (بدل ادويه كے موضوعي)	rr
50/00	اردد	كتاب التيسير في المداوات والتدايير - ابن زهر	ro

11/00	انكريزى	كنرى يوشن نودى ميذيسنل پلانش آف عليكزه (يويي)	ry
143/00	انكريزى	كنرى يوش نودى يومانى ميديسل بلانش فرام ماقص آركوث دُسرُك تمل مادو	14
26/00	انكريزى	ميديستل يلائش آف كواليار فارسث دويران	rA
43/00	انكريزى	فزيكو كيميكل اشيندروس آف يوناني فار موليشنس (يارث_ا)	19
50/00	اگریزی	فزيكوكيميكل اشيندروس آف يوناني فار موليشنس (يارث_١١)	۳.
107/00	انكريزى	فزيكو كيميكل اشيندروس آف يوناني فار موليشنس (يارث_ااا)	11
86/00	انكريزى	اسْيندْردْائيذيشْن آف سنكل دُر من آف يوناني ميذيس (يارث-١)	rr
129/00	انكريزى	اسْيندْردْائيذيش آف سنكل دُرس آف يوناني ميذين (يارث ١١)	
188/00	اتكريزى	اسْيندْردْائيذيشْ آف سنگل دُر من آف يوناني ميذين (يارث ١١١)	44
4/00	انكريزى	كليكل استذيز آف وجع المفاصل	20
5/50	انكريزى	كلينكل استذيز آف ضيق الننس	24
57/00	انكريزى	عيم اجمل خال ا عدر سائل جنيس (مجلد 71/00)	14
131/00	انكريزى	كنسيك آف يرتحد كنشرول النابوناني ميذين	MA
340/00	اعريزى	كيسفرى آف ميڈيسنل يلانش -1	19
205/00	اردو	امراض قلب	۴.
150/00	اردو	امراض ربي	۳١
360/00	اردو	المعالجات البقراطيه (جلداةل)	~~
270/00	اردو	المعالجات البقراطيه (جلدوم)	~~
240/00	اردو	المعالجات البقراطيه (جلدسوم)	MM
195/00	اردو	كتاب الحاوى (جلداة ل)	2
190/00	اردو	كتاب الحاوى (جلددوم)	MA
180/00	اردو	كتاب الحاوى (جلدسوم)	12
143/00	اردو	كتاب الحاوى (جلد چيارم)	MA
	1,00	کتاب الحاوی (جلد چیم)	4

ڈاک سے کتابیں منگوانے کے لئے اپنے آرڈر کے ساتھ کتابوں کی قیت بذریعہ
بیک ڈرافٹ،جوڈائر کیٹر، ی، ی آر،یو،ایم، نی دہلی کے نام بناہو پیشگی روانہ فرمائیں۔
میک ڈرافٹ،جوڈائر کیٹر، ی، ی کتابوں پر محصول ڈاک بذمہ خریدار ہوگا۔
کتابیں مندرجہ ذیل پہتا ہے حاصل جا تکی ہے۔
سینٹرل کونسل فار ریسرج ان یو نافی میڈیسن

61/65 الستى ئيو هنل ايريا، جنك پورى، نئى دېلى \_61/65 فدون: 5614970-72,5611982